RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) 2016

Tableaux

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Dakar, Sénégal

The DHS Program
ICF
Rockville, Maryland, USA

Septembre 2017













Ce rapport présente les résultats de la troisième année de l'Enquête Démographique et de Santé Continue au Sénégal (EDS-Continue 2016) (Tableaux), exécutée de Marcs à Novembre 2016 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). L'EDS-Continue 2016 a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Sénégal, de l'USAID, de l'UNICEF, de l'UNFPA et de Micronutrient Initiative. Elle a bénéficié de l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (*Demographic and Health Surveys – The DHS Program*) de ICF dont l'objectif est de collecter, d'analyser et de diffuser des données démographiques et de santé portant, en particulier, sur la fécondité, la mortalité, la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, la nutrition, le paludisme et le VIH.

Le Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop a apporté son expertise à la réalisation de cette opération.

Pour tous renseignements concernant l'EDS-Continue 2016, contacter :
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Rocade Fann Bel-air Cerf-volant B.P. 116 ; Dakar RP (Sénégal)
Téléphone : (221) 33 869 21 39 / 33 869 21 60
Fax : (221) 33 824 36 15
E-mail : statsenegal@ansd.sn / statsenegal@yahoo.fr
Site web : www.ansd.sn

Concernant *The DHS Program*, des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
ICF
530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850 USA
Téléphone : (301) 407-6500
Fax : (301) 407-6501
E-mail : info@dhsprogram.com
Site web : www.dhsprogram.com

Citation recommandée :
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) [Sénégal], et ICF. 2017.
Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue 2016) : Tableaux. Rockville, Maryland, USA : ANSD et ICF International.

TABLE DE MATIERES

LISTE DES TABLEAUX

REMERCIEMENTS

Pour assurer un meilleur suivi des indicateurs des programmes nationaux de santé et des objectifs internationaux de développement, le Sénégal à réaliser en 2016, la quatrième phase de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue). Cette dernière, conformément au programme qui couvre la période 2012-2017, entre dans le cadre du programme d'activités du Schéma Directeur de la Statistique 2008-2013 et de la Stratégie nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 2014-2019. Elle permet de répondre aux besoins permanents en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population. Elle reste également un cadre idéal pour le renforcement de capacités au sein de nos institutions, en collecte, traitement, analyse et diffusion de données.

L'Enquête Démographique et de Santé Continue qui est constitué d'un volet ménage et d'un volet établissements de santé, est une nouvelle illustration de la politique de rationalisation des ressources aussi bien financières que techniques, par l'harmonisation et la mutualisation des moyens. Elle a nécessité la mobilisation d'importantes ressources financières, de la disponibilité et de la compétence de plusieurs personnes ressources. Je voudrais donc, à l'occasion de la publication du présent rapport, adresser mes sincères remerciements au Gouvernement du Sénégal et à ses partenaires au développement, notamment l'USAID, la Banque Mondiale, l'UNICEF, l'UNFPA, à ICF International et à Micronutrient Initiative qui ont appuyé l'ANSD tout le long de cette opération.

À travers cette enquête, l'ANSD réaffirme son ancrage dans les nouvelles technologies en ayant encore recours aux ordinateurs portables pour la collecte et la saisie directe des données sur le terrain. L'ANSD s'inscrit ainsi résolument dans la collecte de données d'enquêtes sans questionnaires papiers. Une telle option à succès consolide son leadership et confirme la nécessité de faire confiance à l'expertise nationale. J'exprime donc mes félicitations aux experts de l'ANSD.

Je voudrais aussi remercier le personnel technique et administratif du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, au niveau central comme au niveau périphérique pour leur précieuse collaboration ; les membres des Comités de pilotage et technique pour leur compétence et leur disponibilité ainsi que le personnel du laboratoire de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop pour leur efficacité dans l'exploitation des analyses biologiques.

Je voudrais également témoigner ma profonde gratitude et ma reconnaissance à l'égard des autorités administratives, locales, coutumières et religieuses, et aux populations des localités enquêtées pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé au personnel de terrain.

J'adresse toutes mes félicitations au personnel de terrain superviseurs, chefs d'équipe, chauffeurs, enquêteurs, techniciens de santé pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur endurance qui ont été déterminants pour la réussite de l'enquête.

Enfin, je salue le concours des collègues de l'ensemble des services techniques, administratifs, logistiques et financiers de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie qui se sont tous mobilisés pour assurer un succès éclatant à cette enquête cruciale.

Aboubacar Sédikh BEYE

Directeur Général de l'ANSD

PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE : OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 1

Tableau 1.1 Résultats des interviews Ménages et Individuelles

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse par milieu de résidence (non pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2016

	Résidence		
Résultat	Urbain	Rural	Total
Interviews ménages			
Ménages sélectionnés	1 848	2 860	4 708
Ménages occupés	1 758	2 742	4 500
Ménages interviewés	1 728	2 709	4 437
Taux de réponse des ménages[1]	98,3	98,8	98,6
Interviews des femmes de 15-49 ans			
Effectif de femmes éligibles	3 440	5 804	9 244
Effectif de femmes éligibles interviewées	3 287	5 578	8 865
Taux de réponse des femmes éligibles[2]	95,6	96,1	95,9
Interviews des hommes de 15-59			
Effectif d'hommes éligibles	1 507	2 330	3 837
Effectif d'hommes éligibles interviewés	1 368	2 159	3 527
Taux de réponse des hommes éligibles[2]	90,8	92,7	91,9

[1] Ménages enquêtés/ménages identifiés
[2] Enquêtés interviewés/enquêtés éligibles

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES ENQUÊTÉS 2

Tableau 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par la provenance de l'eau pour boire, le temps pour s'approvisionner en eau et par le moyen utilisé pour traiter l'eau, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Ménages			Enquêtés		
Caractéristique	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Source d'approvisionnement en eau de boisson						
Source améliorée	91,7	70,6	81,8	90,8	71,0	80,0
Robinet dans logement/concession	69,6	34,8	53,3	73,2	38,9	54,5
Robinet public/fontaine	6,1	20,2	12,7	5,2	18,3	12,4
Robinet chez les voisins	7,7	4,1	6,0	6,6	3,1	4,7
Puits à pompe/ forage	0,3	5,7	2,8	0,2	5,5	3,1
Puits creusé protégé	2,7	5,0	3,8	3,1	4,5	3,9
Source d'eau protégée	0,1	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1
Eau de pluie	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2	0,1
Eau en bouteille	5,2	0,4	3,0	2,5	0,2	1,3
Source non améliorée	7,8	29,3	17,9	8,8	29,0	19,8
Puits creusé non protégé	5,7	21,9	13,3	6,0	21,6	14,5
Source d'eau non protégée	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Camion-citerne/charrette avec petite citerne	2,1	5,6	3,7	2,8	5,7	4,4
Eau de surface	0,1	1,7	0,8	0,1	1,6	0,9
Autre	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson						
Eau sur place	85,3	49,4	68,5	86,0	53,0	68,0
Moins de 30 minutes	5,9	20,4	12,7	6,2	19,3	13,3
30 minutes ou plus	1,8	12,9	7,0	2,1	12,2	7,6
NSP/manquant	7,0	17,3	11,8	5,7	15,4	11,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Moyen de traitement de l'eau[1]						
Ébullition	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
Ajout d'eau de Javel/chlore	9,2	12,5	10,7	9,3	12,0	10,8
Passée à travers un linge	7,8	28,1	17,3	8,6	27,6	18,9
Céramique, sable ou autre filtre	1,6	0,5	1,1	1,2	0,4	0,7
Autre	0,9	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0
Aucun traitement	84,4	64,7	75,2	84,4	65,2	73,9
Pourcentage utilisant une méthode de traitement approprié[2]	10,9	12,9	11,9	10,6	12,3	11,5
Effectif	2 359	2 078	4 437	16 775	20 076	36 852

[1] Les enquêtés pouvant déclarer plusieurs types de traitement, la somme des pourcentages peut excéder 100 %.
[2] Les méthodes appropriées pour le traitement de l'eau comprennent l'ébullition, l'ajout de chlore, le filtrage et la désinfection solaire.

Tableau 2.2 Type de toilettes utilisées par les ménages

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par type de toilettes/latrines, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Ménages			Enquêtés		
Type de toilettes/latrines	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Toilettes améliorées, non partagées						
Chasse d'eau/chasse manuelle connectée à un système d'égout	9,3	0,2	5,0	9,0	0,1	4,2
Chasse d'eau/chasse manuelle reliée à une fosse septique	21,7	11,1	16,8	26,2	11,9	18,4
Fosse d'aisances améliorée auto-aérée	1,4	4,0	2,6	2,0	4,1	3,2
Fosses d'aisances avec dalle	20,5	18,6	19,6	28,3	21,8	24,8
Latrines à chasse manuelle	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,8
Total	53,7	34,5	44,7	66,5	38,7	51,3
Toilettes partagées[1]						
Chasse d'eau/chasse manuelle connectée à un système d'égout	4,9	0,0	2,6	2,5	0,0	1,1
Chasse d'eau/chasse manuelle reliée à une fosse septique	12,1	2,7	7,7	7,9	1,9	4,6
Fosse d'aisances améliorée auto-aérée	1,8	0,7	1,3	1,1	0,5	0,8
Fosse d'aisances avec dalle	17,8	4,2	11,4	12,6	3,8	7,8
Latrines à chasse manuelle	0,6	0,0	0,3	0,7	0,0	0,3
Total	37,1	7,7	23,3	24,8	6,2	14,7
Toilettes non améliorées						
Latrines traditionnelles	6,6	28,2	16,7	7,1	30,8	20,0
Pas de toilettes/nature	2,1	29,1	14,7	1,4	24,0	13,7
Autre	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3
Total	9,2	57,8	31,9	8,8	55,1	34,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	2 359	2 078	4 437	16 775	20 076	36 852

[1] Toilettes partagées qui seraient considérées comme « améliorées » si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

Tableau 2.3 Lavage des mains

Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit utilisé le plus souvent pour se laver les mains a été observé et, parmi ces ménages, répartition (en %) par disponibilité de l'eau, de savon et d'autres produits nettoyants, EDS-Continue, Sénégal 2016

			Parmi les ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage avec :								
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé	Effectif de ménages	Savon et eau[1]	Eau et produit nettoyant[2] autre que le savon seulement	Eau seulement	Savon mais pas d'eau[3]	Produits nettoyants autres que le savon seulement[2]	Pas d'eau, ni savon, ni autre produit nettoyant	Manquant	Total	Effectif de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé
Résidence											
Urbain	22,9	2 359	66,1	0,0	25,8	1,2	0,0	6,8	0,0	100,0	540
Rural	6,5	2 078	72,5	0,0	15,0	1,9	0,0	10,6	0,0	100,0	135
Grande région											
Nord	4,0	741	(39,8)	(0,0)	(25,9)	(0,0)	(0,0)	(34,3)	(0,0)	100,0	29
Ouest	22,9	2 001	64,2	0,0	28,1	1,6	0,0	6,1	0,0	100,0	458
Centre	6,7	1 014	76,9	0,0	16,3	0,0	0,0	6,7	0,0	100,0	68
Sud	17,6	682	81,0	0,0	10,3	1,5	0,0	7,3	0,0	100,0	120
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	4,5	767	70,3	0,0	16,7	2,6	0,0	10,4	0,0	100,0	34
Second	7,4	806	69,0	0,0	13,9	0,0	0,0	17,1	0,0	100,0	59
Moyen	6,9	844	71,8	0,0	18,4	1,5	0,0	8,3	0,0	100,0	58
Quatrième	13,0	1 086	59,4	0,0	23,4	0,9	0,0	16,3	0,0	100,0	142
Le plus élevé	40,8	935	69,2	0,0	26,7	1,6	0,0	2,5	0,0	100,0	382
Ensemble	15,2	4 437	67,4	0,0	23,7	1,4	0,0	7,6	0,0	100,0	675

[1] Par "savon", on entend ici le savon ou un détergent en morceau, sous forme liquide, en poudre ou sous forme de pâte. Cette colonne inclut les ménages possédant du savon et de l'eau seulement ainsi que ceux qui possèdent du savon et de l'eau et un autre détergent.
[2] Les produits nettoyants autres que le savon incluent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou du sable.
[3] Y compris les ménages disposant de savon seulement ainsi que ceux qui disposent de savon et d'autres produits nettoyants.

Tableau 2.4 Caractéristiques du logement

Répartition (en %) des ménages en fonction de certaines caractéristiques du logement et pourcentage utilisant du combustible solide pour cuisiner ; répartition (en %) des ménages en fonction de la fréquence à laquelle on fume dans le logement, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Résidence		
Caractéristique du logement	Urbain	Rural	Ensemble
Électricité			
Oui	87,7	38,3	64,5
Non	12,3	61,7	35,5
Total	100,0	100,0	100,0
Matériau de revêtement du sol			
Terre, sable	4,5	32,2	17,4
Bouse	0,3	6,8	3,4
Planches en bois	0,0	0,0	0,0
Palmes/bambou	0,0	0,0	0,0
Parquet ou bois ciré	0,0	0,2	0,1
Bandes de vinyle ou asphalte	14,0	10,3	12,3
Carrelage	44,3	10,6	28,5
Ciment	31,3	38,6	34,7
Moquette	1,5	0,3	0,9
Autre	4,1	1,1	2,7
Total	100,0	100,0	100,0
Pièces utilisées pour dormir			
Une	31,3	10,4	21,5
Deux	19,0	20,9	19,9
Trois ou plus	49,7	68,5	58,5
Manquant	0,0	0,1	0,1
Total	100,0	100,0	100,0
Endroit pour cuisiner			
Dans la maison	67,6	58,4	63,3
Dans un bâtiment séparé	16,0	36,0	25,4
A l'extérieur	9,5	4,2	7,0
Autre	6,8	1,4	4,3
Total	100,0	100,0	100,0
Combustible utilisé pour cuisiner			
Électricité	0,7	0,5	0,6
GPL/gaz naturel/biogaz	49,5	5,8	29,0
Charbon de bois	24,1	10,5	17,7
Paille/branchages/herbes	15,3	77,9	44,6
Bouse	0,0	3,2	1,5
Autre	10,5	2,2	6,6
Total	100,0	100,0	100,0
Pourcentage utilisant un combustible solide pour cuisiner[1]	39,3	91,5	63,8
Effectif	2 359	2 078	4 437

GPL = Gaz propane liquéfié.
[1] Inclut Charbon/lignite, Charbon de bois, Bois, Paille/branchages/herbes, Résidus agricoles et Bouse [la liste des catégories est incluse dans le questionnaire du pays].

Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2016

Possession	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
Biens possédés par le ménage			
Radio	62,7	64,8	63,7
Télévision	80,4	32,7	58,1
Téléphone portable	97,7	89,9	94,1
Téléphone fixe	7,1	1,5	4,5
Réfrigérateur	39,3	10,7	25,9
Moyens de transport			
Bicyclette	8,5	15,4	11,7
Charrette tirée par un animal	4,2	45,9	23,7
Motocyclette/scooter	11,1	9,0	10,1
Voiture/camion	13,7	5,3	9,8
Possession de terres agricoles	8,1	69,9	37,0
Possession d'animaux de ferme[1]	36,4	81,5	57,5
Effectif	2 359	2 078	4 437

[1] Bétail, vaches, taureaux, chevaux, ânes, chèvres, moutons ou poulets.

Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon le milieu de résidence et la région, EDS-Continue, Sénégal 2016

Milieu de résidence/région	Quintiles de bien-être économique					Total	Effectif d'enquêtés	Coefficient de Gini
	Le plus bas	Second	Moyen	Quatrième	Le plus élevé			
Résidence								
Urbain	1,1	6,7	19,3	34,1	38,9	100,0	16 775	0,12
Rural	35,8	31,1	20,7	8,1	4,3	100,0	20 076	0,37
Grande région								
Nord	27,5	25,4	27,6	11,4	8,1	100,0	6 329	0,28
Ouest	0,9	7,1	20,0	30,5	41,5	100,0	14 018	0,15
Centre	26,6	29,0	17,5	17,9	9,0	100,0	10 264	0,38
Sud	44,3	28,8	16,7	8,1	2,1	100,0	6 240	0,46
Ensemble	20,0	20,0	20,0	19,9	20,0	100,0	36 852	0,33

Tableau 2.7 Population des ménages par âge, selon le sexe et le milieu de résidence

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par groupe d'âges quinquennal, selon le sexe et le milieu de résidence EDS-Continue, Sénégal 2016

	Urbain			Rural					
Groupe d'âges	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
<5	14,1	12,2	13,1	20,9	16,9	18,7	17,7	14,8	16,2
5-9	13,8	12,5	13,1	19,3	15,9	17,5	16,8	14,4	15,5
10-14	11,7	11,3	11,5	14,3	13,8	14,1	13,1	12,7	12,9
15-19	10,2	10,5	10,4	10,1	9,8	9,9	10,1	10,1	10,1
20-24	9,3	9,5	9,4	6,1	7,7	7,0	7,6	8,5	8,1
25-29	8,5	7,7	8,1	4,3	7,4	6,0	6,2	7,5	6,9
30-34	7,1	7,4	7,3	4,2	5,8	5,1	5,6	6,5	6,1
35-39	5,6	5,8	5,7	3,8	4,4	4,1	4,6	5,0	4,9
40-44	4,6	4,5	4,6	3,2	3,4	3,3	3,9	3,9	3,9
45-49	3,2	3,4	3,3	2,4	2,2	2,3	2,8	2,8	2,8
50-54	3,2	5,0	4,1	2,3	4,0	3,2	2,7	4,4	3,6
55-59	2,4	3,3	2,8	1,7	2,6	2,2	2,0	2,9	2,5
60-64	2,2	2,4	2,3	2,6	2,0	2,3	2,4	2,2	2,3
65-69	1,6	1,4	1,5	1,7	1,5	1,6	1,7	1,4	1,5
70-74	1,2	1,4	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
75-79	0,7	0,8	0,8	0,8	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
80 +	0,6	0,8	0,7	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	8 022	8 862	16 885	9 272	10 975	20 247	17 295	19 837	37 132

Tableau 2.8 Composition des ménages

Répartition (en %) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; taille moyenne du ménage ; pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Résidence		
Caractéristique	Urbain	Rural	Ensemble
Chef de ménage			
Homme	64,6	74,8	69,4
Femme	35,4	25,2	30,6
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de membres habituels			
0	0,0	0,0	0,0
1	12,9	3,2	8,4
2	8,1	2,4	5,4
3	8,4	4,4	6,5
4	8,3	6,1	7,3
5	8,9	7,3	8,2
6	9,9	9,1	9,5
7	6,1	9,1	7,5
8	6,3	9,6	7,8
9+	31,0	48,8	39,3
Total	100,0	100,0	100,0
Taille moyenne du ménage	7,1	9,7	8,3
Pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents			
Enfants vivant sans leurs parents[1]	28,1	41,7	34,5
Orphelin double	1,2	2,0	1,6
Orphelin simple[2]	9,8	14,9	12,2
Enfant orphelin et/ou vivant sans leurs parents	31,9	45,7	38,4
Effectif de ménages	2 359	2 078	4 437

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.
[1] Les enfants vivant sans leurs parents sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur père, ni leur mère.
[2] Comprend les enfants dont l'un des parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu.

Tableau 2.9.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges										
6-9	51,1	48,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	100,0	2 362	0,0
10-14	32,2	56,3	1,5	8,9	0,0	0,0	1,1	100,0	2 522	2,1
15-19	29,9	16,3	2,5	49,9	0,0	0,6	0,8	100,0	2 002	5,5
20-24	42,2	17,7	1,5	32,6	1,2	3,8	1,0	100,0	1 685	3,8
25-29	55,1	17,8	2,6	15,2	1,2	6,8	1,3	100,0	1 494	0,0
30-34	58,2	21,2	2,2	11,6	0,4	4,2	2,1	100,0	1 296	0,0
35-39	60,5	23,5	1,2	7,6	0,8	4,5	1,9	100,0	1 001	0,0
40-44	68,1	15,9	1,4	7,7	0,7	4,6	1,6	100,0	777	0,0
45-49	67,0	14,9	0,7	9,6	2,2	3,5	2,1	100,0	550	0,0
50-54	75,8	10,2	1,2	8,8	0,7	1,9	1,4	100,0	874	0,0
55-59	79,6	9,4	1,2	5,5	1,1	2,3	1,0	100,0	577	0,0
60-64	83,3	5,1	2,2	5,4	0,8	3,0	0,2	100,0	433	0,0
65+	94,8	0,8	0,2	2,7	0,3	1,0	0,1	100,0	822	0,0
Résidence										
Urbain	36,1	32,3	1,7	22,7	1,0	4,7	1,6	100,0	7 586	2,4
Rural	67,4	21,5	1,2	8,8	0,1	0,3	0,7	100,0	8 811	0,0
Grande région										
Nord	63,7	20,4	2,8	11,9	0,3	0,5	0,4	100,0	2 899	0,0
Ouest	38,2	32,3	0,9	20,7	0,9	5,2	1,8	100,0	6 269	2,0
Centre	65,5	21,4	1,2	10,4	0,3	0,5	0,7	100,0	4 644	0,0
Sud	53,9	28,4	1,7	14,3	0,4	0,5	0,8	100,0	2 585	0,0
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	75,4	18,9	0,7	4,4	0,0	0,0	0,6	100,0	3 047	0,0
Second	65,1	23,2	1,4	9,6	0,1	0,2	0,4	100,0	3 204	0,0
Moyen	51,9	28,9	1,9	15,5	0,4	0,6	0,8	100,0	3 259	0,0
Quatrième	45,3	30,6	2,1	18,7	0,3	1,5	1,6	100,0	3 452	0,1
Le plus élevé	30,2	29,9	1,1	26,3	1,8	8,9	1,9	100,0	3 436	4,1
Ensemble	52,9	26,5	1,4	15,2	0,5	2,3	1,1	100,0	16 397	0,0

[1] A achevé avec succès les 6 classes du niveau primaire.
[2] A achevé avec succès les 7 classes du niveau secondaire (4 classes du niveau moyen et les 3 classes du niveau secondaire).

Tableau 2.9.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges										
6-9	54,5	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	2 345	0,0
10-14	30,2	56,6	1,4	11,4	0,0	0,0	0,4	100,0	2 268	2,0
15-19	28,9	17,4	1,7	48,8	0,0	0,8	2,2	100,0	1 751	5,3
20-24	32,6	15,3	2,6	38,5	1,5	6,9	2,6	100,0	1 312	5,2
25-29	39,6	18,2	2,4	22,1	1,1	14,5	2,2	100,0	1 078	4,2
30-34	44,1	22,7	2,9	14,3	1,6	7,0	7,4	100,0	965	2,3
35-39	46,2	20,3	4,7	12,6	1,9	7,2	7,1	100,0	802	0,4
40-44	51,6	14,5	3,7	15,3	1,7	6,6	6,8	100,0	668	0,0
45-49	53,7	13,5	3,7	11,4	2,4	7,0	8,3	100,0	478	0,0
50-54	61,9	9,7	2,8	7,7	0,3	9,6	8,0	100,0	465	0,0
55-59	55,9	9,2	3,5	15,3	0,6	6,5	8,9	100,0	351	0,0
60-64	69,1	7,4	1,8	7,9	1,9	5,2	6,7	100,0	420	0,0
65+	80,5	4,9	2,9	3,5	0,4	2,5	5,4	100,0	771	0,0
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	100,0	4	*
Résidence										
Urbain	27,9	30,9	2,9	24,5	1,1	7,4	5,4	100,0	6 673	3,8
Rural	60,8	24,0	1,3	11,0	0,4	1,2	1,4	100,0	7 006	0,0
Grande région										
Nord	59,7	23,3	3,0	10,8	0,6	1,3	1,3	100,0	2 206	0,0
Ouest	30,0	30,3	2,1	22,7	1,0	8,0	6,0	100,0	5 627	3,3
Centre	61,2	22,1	1,3	12,2	0,4	1,5	1,4	100,0	3 474	0,0
Sud	41,5	31,7	2,3	19,7	0,7	2,0	2,0	100,0	2 372	0,6
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	71,8	20,4	0,7	5,8	0,0	0,2	1,2	100,0	2 608	0,0
Second	54,9	27,8	1,7	13,4	0,2	0,8	1,1	100,0	2 619	0,0
Moyen	43,7	31,6	2,4	17,3	1,0	1,6	2,3	100,0	2 806	0,3
Quatrième	35,8	29,9	3,1	21,5	0,8	3,8	5,1	100,0	2 762	2,1
Le plus élevé	20,4	26,6	2,4	28,6	1,5	13,8	6,7	100,0	2 885	5,0
Ensemble	44,7	27,3	2,1	17,6	0,7	4,2	3,4	100,0	13 679	0,0

[1] A achevé avec succès les 6 classes du niveau primaire.
[2] A achevé avec succès les 7 classes du niveau secondaire (4 classes du niveau moyen et les 3 classes du niveau secondaire).

Tableau 2.10 Taux de fréquentation scolaire

Taux net de fréquentation scolaire (TNF) et taux brut de fréquentation scolaire (TBF) de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Taux net de fréquentation scolaire[1]				Taux brut de fréquentation scolaire[2]			
	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres[3]	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres[3]
NIVEAU PRIMAIRE								
Résidence								
Urbain	64,9	68,3	66,7	1,05	91,9	96,5	94,3	1,05
Rural	38,6	39,6	39,1	1,03	62,2	62,7	62,4	1,01
Grande région								
Nord	35,1	36,8	36,0	1,05	57,5	58,8	58,2	1,02
Ouest	62,3	67,4	64,9	1,08	88,7	94,1	91,5	1,06
Centre	35,0	39,2	37,1	1,12	57,6	62,5	60,1	1,09
Sud	59,7	54,8	57,3	0,92	88,1	83,2	85,7	0,94
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	31,2	35,0	33,2	1,12	52,2	53,8	53,1	1,03
Second	45,1	41,3	43,2	0,91	71,5	66,6	69,1	0,93
Moyen	52,0	55,7	53,8	1,07	79,9	85,9	82,7	1,08
Quatrième	53,4	61,2	57,6	1,15	81,1	88,2	85,0	1,09
Le plus élevé	71,4	70,4	70,8	0,99	92,5	95,8	94,2	1,04
Ensemble	48,7	50,9	49,8	1,05	73,6	76,0	74,8	1,03
NIVEAU SECONDAIRE								
Résidence								
Urbain	43,2	39,3	41,2	0,91	100,3	102,4	101,4	1,02
Rural	15,6	15,3	15,4	0,98	44,3	40,6	42,3	0,92
Grande région								
Nord	17,8	20,3	19,1	1,14	41,9	56,7	49,7	1,35
Ouest	40,0	36,0	38,0	0,90	86,1	90,3	88,2	1,05
Centre	16,3	17,5	17,0	1,07	55,5	48,5	51,7	0,87
Sud	26,5	22,4	24,4	0,84	73,9	58,9	66,2	0,80
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	8,8	8,5	8,6	0,96	22,9	21,2	22,0	0,93
Second	19,2	17,6	18,4	0,91	56,2	45,0	50,4	0,80
Moyen	25,3	29,7	27,5	1,18	74,2	75,6	74,9	1,02
Quatrième	32,8	27,8	30,1	0,85	79,4	85,9	82,9	1,08
Le plus élevé	58,5	45,1	51,1	0,77	121,1	109,9	114,9	0,91
Ensemble	27,1	25,2	26,1	0,93	67,5	66,3	66,9	0,98

[1] Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge de fréquentation du niveau secondaire (12-18 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut excéder 100 %.
[2] Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.
[3] L'indice de parité entre les genres pour le primaire est le ratio du TNF (TBF) au niveau primaire des filles sur le TNF (TBF) des garçons. L'indice de parité entre les genres pour le secondaire est le ratio du TNF (TBF) au niveau secondaire des filles sur le TNF (TBF) des garçons.

CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES ET DES HOMMES ENQUÊTÉS 3

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Groupe d'âges						
15-19	22,5	1 998	2 096	24,1	760	871
20-24	18,8	1 664	1 700	18,4	581	608
25-29	17,2	1 524	1 541	16,5	521	460
30-34	14,9	1 318	1 294	12,7	402	380
35-39	11,3	998	959	11,1	350	327
40-44	9,1	806	733	9,0	285	277
45-49	6,3	557	542	8,2	260	241
Religion						
Musulman	96,2	8 530	8 519	95,7	3 023	3 019
Chrétien	3,4	304	302	4,2	132	139
Animiste	0,3	30	44	0,1	4	6
Ethnie						
Wolof	42,3	3 750	3 104	39,5	1 247	1 010
Poular	28,0	2 484	2 873	28,5	899	1 021
Serer	15,6	1 379	1 170	14,5	458	433
Mandingue	5,2	462	785	5,9	186	306
Diola	3,1	272	322	4,1	131	158
Soninké	0,7	64	83	1,2	37	35
Autre/non sénégalais	5,1	454	528	6,4	201	201
État matrimonial						
Célibataire	28,8	2 555	2 339	60,2	1 903	1 913
Marié	65,6	5 818	6 107	38,5	1 215	1 218
Vivant ensemble	0,7	65	40	0,3	11	5
Divorcé/séparé	4,1	367	297	0,8	26	22
Veuf	0,7	60	82	0,2	6	6
Résidence						
Urbain	49,1	4 351	3 287	53,7	1 696	1 227
Rural	50,9	4 514	5 578	46,3	1 464	1 937
Grande Région						
Nord	17,3	1 537	1 914	15,4	486	633
Ouest	40,2	3 559	1 431	44,5	1 405	531
Centre	27,7	2 460	2 916	23,0	725	934
Sud	14,8	1 309	2 604	17,2	543	1 066
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	48,6	4 310	4 794	36,4	1 149	1 269
Primaire	22,2	1 967	1 778	22,3	704	684
Moyen/secondaire ou plus	29,2	2 588	2 293	41,3	1 306	1 211
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	16,6	1 475	2 115	16,9	535	788
Second	18,1	1 603	2 338	18,4	581	863
Moyen	19,7	1 749	1 978	18,5	583	675
Quatrième	22,5	1 991	1 405	22,2	700	508
Le plus élevé	23,1	2 046	1 029	24,0	759	330
Ensemble 15-49	100,0	8 865	8 865	100,0	3 159	3 164
50-59	na	na	na	na	368	363
Ensemble 15-59	na	na	na	na	3 527	3 527

Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.
na = Non applicable

Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif de femmes
	Sans instruction	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur			
Groupe d'âges									
15-24	33,9	17,9	2,0	43,3	0,6	2,2	100,0	4,8	3 662
15-19	28,8	17,1	2,6	50,8	0,1	0,6	100,0	5,6	1 998
20-24	40,1	18,9	1,3	34,3	1,1	4,2	100,0	4,1	1 664
25-29	53,3	22,1	2,2	15,5	0,9	6,0	100,0	-	1 524
30-34	57,1	24,5	1,7	11,0	1,2	4,5	100,0	-	1 318
35-39	60,0	25,7	1,4	8,2	0,7	3,9	100,0	-	998
40-44	66,0	16,5	1,3	9,9	0,1	6,2	100,0	-	806
45-49	67,0	17,4	1,6	9,5	0,2	4,3	100,0	-	557
Résidence									
Urbain	29,9	26,1	1,7	33,9	1,1	7,2	100,0	4,6	4 351
Rural	66,7	14,8	1,9	15,6	0,2	0,7	100,0	-	4 514
Grande Région									
Nord	60,7	13,6	3,7	20,3	0,6	1,1	100,0	-	1 537
Ouest	32,1	27,5	0,7	30,7	0,9	8,2	100,0	4,4	3 559
Centre	63,3	15,7	1,7	18,0	0,5	1,0	100,0	-	2 460
Sud	52,0	17,6	2,9	25,7	0,7	1,1	100,0	-	1 309
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	79,7	10,4	1,6	8,1	0,0	0,0	100,0	-	1 475
Second	64,1	15,7	1,9	17,8	0,2	0,3	100,0	-	1 603
Moyen	47,5	20,8	2,7	27,1	0,6	1,3	100,0	1,7	1 749
Quatrième	39,6	26,5	1,6	29,4	0,7	2,3	100,0	3,6	1 991
Le plus élevé	23,8	24,9	1,4	35,1	1,5	13,3	100,0	5,4	2 046
Ensemble	48,6	20,3	1,8	24,6	0,7	3,9	100,0	1,2	8 865

[1] A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.
[2] A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Sans instruction	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur			
Groupe d'âges									
15-24	24,5	18,2	1,5	51,5	1,3	3,0	100,0	5,8	1 341
15-19	24,8	17,7	1,0	56,5	0,0	0,0	100,0	5,6	760
20-24	24,1	18,8	2,1	45,1	3,0	7,0	100,0	6,6	581
25-29	36,6	20,9	0,7	25,5	2,0	14,4	100,0	4,2	521
30-34	49,7	21,1	2,9	18,7	2,1	5,5	100,0	-	402
35-39	53,4	28,0	0,9	11,6	1,4	4,6	100,0	-	350
40-44	47,0	16,2	3,7	21,8	1,9	9,5	100,0	3,4	285
45-49	42,1	23,9	4,4	19,0	1,3	9,4	100,0	3,3	260
Résidence									
Urbain	22,6	22,3	2,6	40,1	2,0	10,3	100,0	5,8	1 696
Rural	52,3	18,1	1,1	25,4	1,0	2,1	100,0	-	1 464
Grande Région									
Nord	49,2	17,6	4,6	24,0	2,0	2,7	100,0	0,5	486
Ouest	23,6	23,3	1,9	37,9	2,2	11,0	100,0	5,5	1 405
Centre	51,1	16,2	1,3	28,3	0,8	2,3	100,0	-	725
Sud	38,3	20,8	0,1	36,2	0,5	4,0	100,0	4,2	543
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	68,5	17,2	0,2	13,8	0,0	0,3	100,0	-	535
Second	48,4	18,5	1,1	29,5	0,4	2,2	100,0	0,6	581
Moyen	36,3	19,7	4,5	34,6	2,1	2,7	100,0	4,4	583
Quatrième	23,3	28,2	2,6	37,9	1,7	6,3	100,0	4,9	700
Le plus élevé	16,6	17,4	1,1	44,6	3,0	17,4	100,0	7,6	759
Ensemble 15-49	36,4	20,4	1,9	33,3	1,6	6,5	100,0	4,4	3 159
50-59	63,1	10,5	1,9	19,7	0,0	4,8	100,0	-	368
Ensemble 15-59	39,2	19,3	1,9	31,9	1,4	6,3	100,0	4,2	3 527

[1] A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.
[2] A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

		Pas d'instruction ou niveau primaire							
Caractéristique sociodémographique	Secondaire ou supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de la phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquête	Aveugle/ malvoyant	Total	Pourcentage alphabétisé[1]	Effectif de femmes
Groupe d'âges									
15-24	46,1	7,1	6,6	39,4	0,7	0,0	100,0	59,8	3 662
15-19	51,5	7,5	5,6	34,5	0,8	0,0	100,0	64,7	1 998
20-24	39,7	6,7	7,7	45,3	0,6	0,1	100,0	54,0	1 664
25-29	22,4	7,2	10,0	59,6	0,8	0,0	100,0	39,6	1 524
30-34	16,7	8,5	11,1	63,4	0,2	0,0	100,0	36,3	1 318
35-39	12,8	10,0	7,9	69,1	0,1	0,0	100,0	30,7	998
40-44	16,2	7,3	7,4	68,9	0,2	0,0	100,0	31,0	806
45-49	14,0	8,8	4,7	72,4	0,2	0,0	100,0	27,4	557
Résidence									
Urbain	42,3	10,4	9,2	37,7	0,4	0,0	100,0	61,9	4 351
Rural	16,5	5,3	6,8	70,8	0,6	0,0	100,0	28,6	4 514
Grande Région									
Nord	22,0	5,7	6,2	66,1	0,0	0,1	100,0	33,8	1 537
Ouest	39,7	10,6	9,4	39,4	1,0	0,0	100,0	59,7	3 559
Centre	19,4	5,5	7,8	66,9	0,4	0,0	100,0	32,7	2 460
Sud	27,5	6,9	6,4	59,1	0,1	0,0	100,0	40,8	1 309
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	8,2	3,5	5,3	82,8	0,1	0,1	100,0	17,0	1 475
Second	18,3	6,3	6,5	67,9	1,1	0,0	100,0	31,1	1 603
Moyen	29,0	8,0	7,7	54,7	0,6	0,0	100,0	44,6	1 749
Quatrième	32,4	9,2	9,8	48,4	0,2	0,0	100,0	51,3	1 991
Le plus élevé	49,9	10,5	9,5	29,5	0,6	0,0	100,0	69,9	2 046
Ensemble	29,2	7,8	7,9	54,5	0,5	0,0	100,0	44,9	8 865

[1] C'est-à-dire les femmes qui ont, au moins, fréquenté l'école secondaire et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage d'hommes alphabétisés selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

		Pas d'instruction ou niveau primaire						
Caractéristique sociodémographique	Secondaire ou supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de la phrase	Ne peut pas lire	Aveugle/ malvoyant	Total	Pourcentage alphabétisé[1]	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-24	55,9	7,2	7,1	29,5	0,4	100,0	70,2	1 341
15-19	56,5	7,4	6,6	28,8	0,6	100,0	70,5	760
20-24	55,1	6,8	7,8	30,3	0,0	100,0	69,7	581
25-29	41,8	9,7	7,7	40,1	0,6	100,0	59,2	521
30-34	26,3	13,2	16,5	42,6	1,4	100,0	56,0	402
35-39	17,6	19,2	7,2	55,1	1,0	100,0	44,0	350
40-44	33,2	15,9	9,3	41,3	0,3	100,0	58,4	285
45-49	29,7	14,8	14,7	40,1	0,7	100,0	59,2	260
Résidence								
Urbain	52,4	12,1	10,1	25,2	0,1	100,0	74,7	1 696
Rural	28,5	9,9	8,2	52,1	1,3	100,0	46,6	1 464
Grande Région								
Nord	28,7	14,5	10,3	45,2	1,3	100,0	53,5	486
Ouest	51,1	12,0	11,1	25,8	0,0	100,0	74,2	1 405
Centre	31,4	7,7	8,7	50,3	1,9	100,0	47,8	725
Sud	40,8	10,2	4,3	44,8	0,0	100,0	55,2	543
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	14,1	5,7	8,5	71,0	0,7	100,0	28,3	535
Second	32,0	9,3	6,6	51,4	0,6	100,0	48,0	581
Moyen	39,5	18,0	8,4	33,2	1,0	100,0	65,9	583
Quatrième	45,9	12,4	13,1	28,1	0,6	100,0	71,3	700
Le plus élevé	65,0	9,7	8,9	16,0	0,4	100,0	83,6	759
Ensemble 15-49	41,3	11,1	9,2	37,7	0,6	100,0	61,7	3 159
50-59	24,5	12,1	4,6	58,4	0,4	100,0	41,1	368
Ensemble 15-59	39,6	11,2	8,8	39,8	0,6	100,0	59,5	3 527

[1] C'est-à-dire les hommes qui ont, au moins, fréquenté l'école secondaire et qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, habituellement, lisent un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la radio, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au mois, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
Groupe d'âges						
15-19	16,3	67,2	47,0	9,6	20,5	1 998
20-24	19,8	67,5	58,2	13,8	18,3	1 664
25-29	12,2	62,7	57,0	8,9	21,6	1 524
30-34	12,4	66,6	61,8	10,7	19,4	1 318
35-39	9,3	63,8	63,3	8,4	20,3	998
40-44	10,8	66,2	62,0	8,5	19,0	806
45-49	9,1	65,9	63,1	8,4	18,9	557
Résidence						
Urbain	23,5	87,8	65,0	17,6	6,6	4 351
Rural	4,7	44,6	49,7	2,9	32,6	4 514
Grande Région						
Nord	6,2	49,7	43,1	2,9	31,6	1 537
Ouest	25,6	91,2	70,7	19,8	2,9	3 559
Centre	6,8	55,6	52,0	4,6	26,6	2 460
Sud	4,7	35,0	47,2	2,6	39,6	1 309
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	0,4	50,1	53,4	0,3	29,6	4 310
Primaire	9,0	77,8	60,0	7,0	12,7	1 967
Moyen/secondaire ou plus	40,2	82,9	61,5	28,9	9,0	2 588
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,9	9,5	43,7	0,1	53,3	1 475
Second	2,5	35,6	49,1	1,2	36,4	1 603
Moyen	8,0	77,6	56,9	5,7	12,6	1 749
Quatrième	16,1	91,8	62,6	11,4	6,1	1 991
Le plus élevé	35,4	94,8	68,4	26,9	2,4	2 046
Ensemble	13,9	65,8	57,2	10,1	19,9	8 865

Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui, habituellement, lisent un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la radio, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au mois, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-19	3,3	54,6	17,7	1,2	38,5	760
20-24	9,3	57,8	30,6	3,9	32,2	581
25-29	12,3	55,3	46,0	4,7	24,4	521
30-34	5,5	58,1	53,6	1,7	21,0	402
35-39	8,5	54,5	48,4	5,3	25,4	350
40-44	14,6	53,5	60,5	8,6	17,9	285
45-49	13,3	61,3	61,4	10,3	17,2	260
Résidence						
Urbain	14,0	74,7	38,9	6,5	15,0	1 696
Rural	2,3	34,7	41,6	1,6	42,4	1 464
Grande Région						
Nord	5,3	69,7	72,2	3,8	10,1	486
Ouest	14,0	70,1	31,3	6,1	18,7	1 405
Centre	5,7	35,8	42,9	3,4	41,4	725
Sud	1,4	35,2	30,8	0,7	48,4	543
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	0,9	37,1	47,0	0,4	35,5	1 149
Primaire	4,6	63,5	44,0	2,3	25,4	704
Moyen/secondaire ou plus	17,4	69,0	32,1	8,6	22,1	1 306
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,2	10,7	40,4	0,0	54,8	535
Second	0,8	29,6	38,0	0,3	48,3	581
Moyen	4,1	67,0	49,7	2,5	21,8	583
Quatrième	8,4	81,3	47,6	7,0	10,8	700
Le plus élevé	24,0	77,3	27,5	8,9	13,0	759
Ensemble 15-49	8,6	56,2	40,2	4,2	27,7	3 159
50-59	7,6	50,6	58,4	2,8	22,6	368
Ensemble 15-59	8,5	55,6	42,1	4,1	27,2	3 527

Tableau 3.5.1 Emploi : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif de femmes
	Travaille actuellement[1]	Ne travaille pas actuellement			
Groupe d'âges					
15-19	20,9	10,2	68,8	100,0	1 998
20-24	29,0	9,4	61,6	100,0	1 664
25-29	43,6	11,9	44,5	100,0	1 524
30-34	50,0	11,9	38,1	100,0	1 318
35-39	59,3	10,4	30,4	100,0	998
40-44	58,6	12,7	28,7	100,0	806
45-49	67,6	7,5	25,0	100,0	557
État matrimonial					
Célibataire	29,0	9,4	61,5	100,0	2 555
Marié ou vivant ensemble	45,1	11,6	43,3	100,0	5 883
Divorcée/séparée/ veuve	63,4	5,2	31,5	100,0	426
Nombre d'enfants vivants					
0	30,9	9,9	59,2	100,0	3 310
1-2	42,0	9,0	49,0	100,0	2 237
3-4	47,2	12,2	40,7	100,0	1 757
5+	55,9	13,1	31,0	100,0	1 562
Résidence					
Urbain	44,4	5,6	50,0	100,0	4 351
Rural	38,4	15,6	46,1	100,0	4 514
Grande Région					
Nord	26,2	8,0	65,8	100,0	1 537
Ouest	46,5	6,4	47,1	100,0	3 559
Centre	43,2	15,0	41,8	100,0	2 460
Sud	41,7	17,4	40,9	100,0	1 309
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	46,0	12,9	41,0	100,0	4 310
Primaire	49,1	9,0	41,9	100,0	1 967
Moyen/secondaire ou plus	27,7	8,1	64,2	100,0	2 588
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	36,3	24,2	39,5	100,0	1 475
Second	40,2	15,5	44,2	100,0	1 603
Moyen	40,8	7,2	52,0	100,0	1 749
Quatrième	44,0	6,5	49,5	100,0	1 991
Le plus élevé	43,8	4,1	52,1	100,0	2 046
Ensemble	41,4	10,7	48,0	100,0	8 865

[1] « Travaille actuellement » concerne les femmes qui ont travaillé au cours des sept derniers jours, y compris celles qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons.

Tableau 3.5.2 Emploi : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Manquant/ Ne sait pas	Total	Effectif d'hommes
	Travaille actuellement[1]	Ne travaille pas actuellement				
Groupe d'âges						
15-19	52,4	23,4	24,2	0,0	100,0	760
20-24	68,9	14,9	16,2	0,0	100,0	581
25-29	82,0	9,0	9,0	0,0	100,0	521
30-34	92,4	3,8	3,8	0,0	100,0	402
35-39	97,7	1,2	1,1	0,0	100,0	350
40-44	91,7	3,7	4,6	0,0	100,0	285
45-49	92,9	5,1	2,0	0,0	100,0	260
État matrimonial						
Célibataire	65,4	16,5	18,1	0,0	100,0	1 903
Marié ou vivant ensemble	96,0	3,2	0,8	0,0	100,0	1 225
Divorcé/séparé/veuf	(65,9)	(4,4)	(29,6)	(0,0)	100,0	32
Nombre d'enfants vivants						
0	67,9	15,2	17,0	0,0	100,0	2 059
1-2	94,1	4,1	1,8	0,0	100,0	478
3-4	96,4	2,6	1,0	0,0	100,0	343
5+	94,6	4,9	0,5	0,0	100,0	280
Résidence						
Urbain	73,1	9,1	17,8	0,0	100,0	1 696
Rural	82,2	13,7	4,2	0,0	100,0	1 464
Grande Région						
Nord	84,8	9,4	5,8	0,0	100,0	486
Ouest	74,1	9,5	16,4	0,0	100,0	1 405
Centre	76,5	14,1	9,4	0,0	100,0	725
Sud	79,9	13,5	6,6	0,0	100,0	543
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	93,6	4,2	2,2	0,0	100,0	1 149
Primaire	89,7	7,0	3,3	0,0	100,0	704
Moyen/secondaire ou plus	56,3	19,7	24,1	0,0	100,0	1 306
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	85,4	13,8	0,8	0,0	100,0	535
Second	84,8	12,1	3,1	0,0	100,0	581
Moyen	79,4	12,9	7,7	0,0	100,0	583
Quatrième	74,1	8,6	17,3	0,0	100,0	700
Le plus élevé	67,3	9,9	22,9	0,0	100,0	759
Ensemble 15-49	77,3	11,2	11,5	0,0	100,0	3 159
50-59	89,4	6,2	4,4	0,0	100,0	368
Ensemble 15-59	78,6	10,7	10,7	0,0	100,0	3 527

[1] « Travaille actuellement » concerne les hommes qui ont travaillé au cours des sept derniers jours, y compris ceux qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons.
Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 3.6.1 Occupation : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Cadre/ technicienne/ direction	Ventes et services	Manuel qualifié	Manuel non qualifié	Employée de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif de femmes
Groupe d'âges									
15-19	6,5	13,3	14,4	2,5	24,4	38,7	0,2	100,0	623
20-24	7,1	25,8	17,8	0,8	16,5	31,3	0,6	100,0	640
25-29	11,0	36,6	14,5	2,7	7,1	27,9	0,1	100,0	846
30-34	11,8	41,9	12,4	2,9	5,5	25,3	0,2	100,0	816
35-39	8,4	51,6	6,9	3,5	3,8	25,4	0,4	100,0	695
40-44	10,9	56,6	5,2	2,4	2,4	21,9	0,7	100,0	575
45-49	6,4	64,0	6,0	5,1	1,2	17,2	0,1	100,0	418
État matrimonial									
Célibataire	12,9	25,1	17,4	1,4	25,6	16,9	0,7	100,0	983
Mariée ou vivant ensemble	7,5	43,3	10,0	3,3	3,6	32,1	0,3	100,0	3 337
Divorcée/séparée/ veuve	14,9	54,2	8,7	1,7	12,6	7,7	0,1	100,0	292
Nombre d'enfants vivants									
0	13,1	25,4	18,6	1,5	20,8	20,1	0,5	100,0	1 350
1-2	14,1	37,4	13,5	1,7	7,2	25,9	0,3	100,0	1 141
3-4	6,4	52,5	6,6	4,4	2,8	27,0	0,2	100,0	1 042
5+	1,6	49,5	5,2	3,9	1,5	38,0	0,3	100,0	1 078
Résidence									
Urbain	15,3	55,2	14,8	2,0	10,9	1,4	0,3	100,0	2 177
Rural	3,7	26,7	8,5	3,4	7,0	50,4	0,3	100,0	2 435
Grande Région									
Nord	6,1	44,6	14,2	2,6	7,8	24,3	0,4	100,0	526
Ouest	16,2	53,7	13,3	2,7	12,3	1,6	0,2	100,0	1 881
Centre	3,9	29,1	12,0	2,8	7,8	43,9	0,6	100,0	1 431
Sud	3,8	24,5	4,2	3,1	3,1	61,1	0,1	100,0	773
Niveau d'instruction									
Pas d'instruction	2,2	39,4	8,7	3,8	7,1	38,5	0,2	100,0	2 541
Primaire	7,9	46,3	19,6	1,9	9,3	15,0	0,0	100,0	1 143
Moyen/secondaire ou plus	30,0	34,4	9,1	0,9	13,0	11,5	1,1	100,0	927
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	1,0	11,2	1,9	1,7	5,3	78,9	0,1	100,0	892
Second	5,0	26,3	3,6	4,3	8,4	52,0	0,4	100,0	894
Moyen	6,8	52,9	14,8	4,5	10,9	9,5	0,6	100,0	840
Quatrième	8,7	57,3	18,1	2,6	12,4	0,9	0,0	100,0	1 005
Le plus élevé	22,9	50,5	17,7	1,0	7,1	0,1	0,6	100,0	980
Ensemble	9,2	40,1	11,5	2,8	8,8	27,3	0,3	100,0	4 612

Tableau 3.6.2 Occupation : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Cadre/ technicien/ direction	Employé	Ventes et services	Manuel qualifié	Manuel non qualifié	Employé de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif d'hommes
Groupe d'âges										
15-19	0,2	0,0	5,6	22,4	6,2	0,0	64,7	0,9	100,0	576
20-24	6,5	0,6	16,4	28,0	4,9	0,0	43,3	0,3	100,0	487
25-29	7,6	0,2	25,7	28,7	8,6	0,0	28,9	0,3	100,0	474
30-34	13,1	1,1	21,5	34,3	1,8	1,1	27,0	0,1	100,0	386
35-39	14,3	1,9	21,6	33,7	6,7	0,1	21,4	0,3	100,0	346
40-44	16,1	2,1	23,0	27,0	6,5	0,0	24,7	0,6	100,0	272
45-49	24,4	1,3	15,4	21,6	13,8	0,0	23,5	0,0	100,0	254
État matrimonial										
Célibataire	6,2	0,2	13,6	29,6	6,6	0,2	43,1	0,5	100,0	1 559
Marié ou vivant ensemble	14,7	1,8	22,8	25,3	6,6	0,1	28,7	0,3	100,0	1 216
Divorcé/séparé/veuf	*	*	*	*	*	*	*	*	100,0	22
Nombre d'enfants vivants										
0	7,2	0,2	15,3	27,9	6,6	0,2	42,2	0,4	100,0	1 710
1-2	14,1	2,1	25,0	29,9	4,3	0,1	24,4	0,2	100,0	470
3-4	17,1	2,3	19,4	27,4	7,5	0,0	25,7	0,7	100,0	339
5+	9,9	1,4	17,6	24,8	9,1	0,1	37,2	0,1	100,0	278
Résidence										
Urbain	14,4	1,1	26,4	38,8	8,6	0,3	9,8	0,5	100,0	1 394
Rural	5,3	0,6	8,9	17,0	4,5	0,0	63,4	0,3	100,0	1 403
Grande Région										
Nord	7,3	0,8	14,4	19,6	4,4	0,0	53,2	0,2	100,0	458
Ouest	14,2	1,3	25,8	37,1	9,0	0,3	11,8	0,3	100,0	1 174
Centre	5,9	0,4	12,3	22,7	3,4	0,0	55,0	0,2	100,0	657
Sud	7,0	0,3	8,6	20,6	7,0	0,1	55,4	0,9	100,0	507
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	3,2	2,0	18,6	23,9	6,1	0,4	45,6	0,3	100,0	1 124
Primaire	6,4	0,2	14,0	46,0	6,9	0,0	26,1	0,2	100,0	681
Moyen/secondaire ou plus	19,7	0,0	19,1	19,9	6,8	0,0	33,8	0,6	100,0	992
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	1,8	0,2	6,4	9,8	3,9	0,0	77,5	0,4	100,0	531
Second	4,1	0,3	8,0	19,5	5,2	0,1	62,6	0,3	100,0	563
Moyen	9,3	1,1	12,1	39,0	7,2	0,0	30,9	0,5	100,0	538
Quatrième	14,9	1,9	22,0	40,1	11,4	0,0	9,1	0,7	100,0	579
Le plus élevé	18,2	0,7	38,0	30,1	5,0	0,7	7,3	0,0	100,0	586
Ensemble 15-49	9,8	0,9	17,6	27,9	6,6	0,2	36,7	0,4	100,0	2 797
50-59	15,7	1,0	20,9	20,0	8,2	0,2	33,7	0,4	100,0	352
Ensemble 15-59	10,5	0,9	18,0	27,0	6,8	0,2	36,3	0,4	100,0	3 148

Tableau 3.7 Type d'emploi : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi, selon le secteur agricole et non-agricole, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique de l'emploi	Travail agricole	Travail non agricole	Manquant	Ensemble
Type de revenu				
Argent seulement	17,5	86,3	*	67,6
Argent et en nature	21,3	3,2	*	8,1
En nature seulement	1,5	0,1	*	0,5
Pas rémunérée	59,7	10,3	*	23,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Type d'employeur				
Employée par un membre de la famille	48,7	7,8	*	18,9
Employée par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille	3,7	31,3	*	23,7
Travaille à son propre compte	47,6	60,9	*	57,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Régularité de l'emploi				
Toute l'année	5,3	80,9	*	60,3
Saisonnier	93,7	11,9	*	34,2
Occasionnel	1,0	7,3	*	5,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes ayant eu un emploi au cours des 12 derniers mois	1 258	3 338	15	4 612

Note : L'ensemble comprend les femmes dont l'information sur le type d'emploi est manquante et qui ne sont pas présentées séparément.

SITUATION DES ENFANTS 4

Tableau 4.1 Enregistrement des naissances d'enfants de moins de 5 ans

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Enfants dont la naissance a été enregistrée			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage ayant un acte de naissance	Pourcentage n'ayant pas d'acte de naissance	Pourcentage enregistré	Effectif d'enfants
Âge				
<2	52,2	17,4	69,6	2 267
2-4	55,2	15,6	70,9	3 663
Sexe				
Masculin	54,3	17,2	71,5	3 015
Féminin	53,9	15,4	69,2	2 915
Résidence				
Urbain	64,0	23,2	87,2	2 193
Rural	48,3	12,2	60,5	3 738
Grande région				
Nord	45,7	6,9	52,5	1 076
Ouest	58,2	28,9	87,2	1 888
Centre	53,6	13,7	67,3	1 915
Sud	56,1	8,0	64,1	1 051
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	37,6	9,6	47,2	1 456
Second	53,9	10,7	64,7	1 357
Moyen	60,6	15,4	76,0	1 137
Quatrième	58,4	24,3	82,6	1 037
Le plus élevé	67,3	26,9	94,1	944
Ensemble	54,1	16,3	70,4	5 930

Tableau 4.2 Enfants orphelins et résidence avec les parents

Répartition (en %) de la population de droit des enfants de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents ; pourcentage d'enfants ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants ayant un ou leurs deux parents décédés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Vit avec les deux parents	Vit avec la mère mais pas avec le père: Père en vie	Père décédé	Vit avec le père mais pas avec la mère: Mère en vie	Mère décédée	Ne vit avec aucun des deux parents: Les deux sont vivants	Seul le père est vivant	Seule la mère est vivante	Les deux décédés	Information manquante sur père/mère	Total	Pourcentage ne vivant avec aucun parent biologique	Pourcentage avec un ou les deux parents décédés[1]	Effectif d'enfants
Age														
0-4	59,4	32,5	0,7	1,0	0,1	5,7	0,3	0,2	0,1	0,0	100,0	6,2	1,4	5 930
<2	60,6	37,5	0,5	0,3	0,1	0,9	0,1	0,2	0,0	0,0	100,0	1,1	0,8	2 267
2-4	58,7	29,4	0,9	1,5	0,2	8,6	0,4	0,2	0,1	0,0	100,0	9,3	1,7	3 663
5-9	53,8	26,4	1,5	2,7	0,7	12,7	0,7	1,2	0,3	0,1	100,0	14,9	4,4	5 749
10-14	49,4	21,8	3,5	3,3	1,2	17,1	1,2	1,8	0,7	0,0	100,0	20,8	8,5	4 783
15-17	40,5	19,8	6,1	3,5	1,5	22,5	1,3	2,9	1,9	0,1	100,0	28,6	13,8	2 214
Sexe														
Masculin	54,6	26,2	2,3	2,9	0,9	10,7	0,8	1,1	0,5	0,0	100,0	13,1	5,6	9 282
Féminin	51,1	26,5	2,3	2,0	0,6	14,8	0,7	1,4	0,6	0,1	100,0	17,4	5,6	9 395
Résidence														
Urbain	50,6	27,3	2,7	2,9	0,6	13,5	0,8	1,1	0,5	0,1	100,0	15,8	5,7	7 352
Rural	54,3	25,8	2,1	2,1	0,8	12,3	0,7	1,4	0,5	0,0	100,0	14,9	5,5	11 325
Région														
Nord	52,9	29,5	1,8	2,6	0,8	10,7	1,0	0,6	0,2	0,0	100,0	12,4	4,3	3 386
Ouest	53,3	27,1	2,2	2,6	0,5	12,2	0,5	1,0	0,4	0,1	100,0	14,1	4,7	6 232
Centre	49,4	28,7	2,2	1,9	0,8	13,9	0,9	1,5	0,7	0,0	100,0	17,0	6,1	5 700
Sud	57,7	17,8	3,4	2,6	1,1	14,0	0,8	1,8	0,7	0,1	100,0	17,3	7,8	3 359
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	66,8	15,8	2,1	2,3	1,1	9,1	0,5	1,6	0,7	0,0	100,0	11,9	6,0	4 317
Second	52,3	26,7	2,4	2,0	0,7	13,5	0,8	0,9	0,4	0,0	100,0	15,8	5,4	4 158
Moyen	45,7	31,4	2,6	2,6	0,8	14,4	1,0	1,4	0,1	0,0	100,0	16,9	6,0	3 855
Quatrième	47,1	30,6	3,1	2,2	0,4	14,0	0,7	1,1	0,7	0,1	100,0	16,5	6,1	3 329
Le plus élevé	49,1	29,8	1,3	3,3	0,5	13,4	0,7	1,2	0,7	0,1	100,0	16,0	4,4	3 018
Ensemble <15	54,5	27,2	1,8	2,3	0,6	11,4	0,7	1,0	0,3	0,0	100,0	13,5	4,5	16 463
Ensemble <18	52,8	26,3	2,3	2,4	0,7	12,8	0,8	1,2	0,5	0,0	100,0	15,3	5,6	18 677

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.
[1] Inclut les enfants dont le père est décédé, la mère est décédée, les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé mais dont l'information sur l'état de survie de l'autre parent est manquante.

Tableau 4.3 Programme d'apprentissage ou d'éveil

Répartition (en %) des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un lieu d'encadrement au cours de l'année scolaire par type d'établissement d'apprentissage éducatif, pourcentage d'enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un établissement d'apprentissage éducatif, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Répartition des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un lieu d'encadrement au cours de l'année scolaire par type d'établissement d'apprentissage						
Caractéristique sociodémographique	École maternelle	Jardin d'enfants	Daara, Coran, Arabe	Case de Tout Petits	Autre	Pourcentage ayant fréquenté un établissement d'apprentissage	Effectif d'enfants de 3-5 ans
Sexe							
Masculin	1,2	11,0	22,0	1,3	0,5	35,9	1 828
Féminin	0,5	12,2	16,7	1,5	0,8	31,8	1 709
Résidence							
Urbain	2,0	23,0	28,6	1,6	0,6	55,8	1 361
Rural	0,2	4,5	13,7	1,2	0,7	20,3	2 176
Région							
Nord	0,4	10,4	14,5	0,3	0,2	25,7	636
Ouest	1,7	20,4	32,0	0,4	0,7	55,2	1 156
Centre	0,6	4,4	16,7	1,3	1,0	24,1	1 111
Sud	0,3	9,5	6,1	4,4	0,4	20,7	633
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	0,1	0,8	8,8	0,6	0,4	10,7	835
Second	0,2	3,9	14,9	1,1	1,4	21,5	777
Moyen	0,3	7,0	23,8	2,8	0,1	34,1	717
Quatrième	1,6	18,1	30,3	1,8	0,1	51,9	648
Le plus élevé	2,8	36,7	23,5	0,5	1,4	64,9	559
Orphelin (père et/ou mère décédé)							
Oui	0,0	2,9	9,7	1,3	0,0	13,9	68
Non	0,9	11,8	19,6	1,4	0,7	34,3	3 468
Ensemble	0,9	11,6	19,4	1,4	0,6	33,9	3 536

Note : Le tableau n'est basé que sur les enfants qui vivent habituellement dans le ménage.

Tableau 4.4 Participation des enfants à des activités économiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des activités économiques au cours de la semaine ayant précédé l'interview, par groupe d'âges et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans ayant participé à des activités économiques pendant au moins une heure	Effectif d'enfants de 5-11 ans	Pourcentage d'enfants de 12-14 ans ayant participé à : Des activités écono-miques pour moins de 14 heures	Des activités écono-miques pour 14 heures ou plus	Effectif d'enfants de 12-14 ans	Pourcentage d'enfants de 15-17 ans ayant participé à : Des activités écono-miques pour moins de 43 heures	Des activités écono-miques pour 43 heures ou plus	Effectif d'enfants de 15-17 ans
Sexe								
Masculin	29,2	1 124	22,9	28,2	393	38,7	10,9	362
Féminin	11,4	1 152	9,6	9,9	383	18,9	1,9	345
Résidence								
Urbain	5,7	884	8,0	6,2	301	15,8	5,9	347
Rural	29,4	1 392	21,7	27,3	476	41,8	7,1	360
Région								
Nord	24,3	428	20,7	19,0	136	34,3	5,0	117
Ouest	6,8	742	9,4	10,5	268	18,2	6,6	279
Centre	24,5	682	19,8	26,8	242	40,1	6,2	187
Sud	32,4	424	20,0	23,0	130	31,8	8,3	124
Fréquentation scolaire								
Oui	18,2	1 116	16,9	13,6	478	21,1	3,9	413
Non	22,1	1 160	15,6	28,1	298	40,2	10,2	294
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	24,7	1 349	18,5	26,3	441	32,4	6,3	350
Primaire	9,4	342	11,3	5,2	75	19,0	15,7	89
Moyen/secondaire ou plus	7,0	171	(12,8)	(0,0)	41	(7,8)	(0,0)	40
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[1]	20,0	411	14,6	12,9	218	31,6	4,4	228
Quintiles de bien-être économique								
Le plus Bas	41,0	526	27,9	35,1	191	55,4	9,0	130
Second	29,3	532	22,4	25,8	172	34,7	7,7	120
Moyen	13,6	499	13,3	15,7	152	30,9	3,4	147
Quatrième	3,5	401	4,5	8,8	133	19,3	6,4	141
Le plus élevé	1,9	317	7,0	1,4	127	11,3	6,6	169
Ensemble[2]	20,2	2 276	16,4	19,2	776	29,0	6,5	707

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.
[1] Y compris les enfants dont la mère est décédée.
[2] Y compris 2 cas d'enfants de 5-11 ans et 1 cas d'enfant de 12-14 ans dont l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante.

Tableau 4.5 Participation des enfants à des tâches domestiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des tâches domestiques au cours de la semaine ayant précédé l'interview, par groupe d'âges et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans ayant participé à :			Pourcentage d'enfants de 12-14 ans ayant participé à :			Pourcentage d'enfants de 15-17 ans ayant participé à :		
Caractéristiques sociodémographiques	Des tâches domestiques pendant moins de 28 heures	Des tâches domestiques pendant 28 heures ou plus	Effectif d'enfants de 5-11 ans	Des tâches domestiques pour moins de 28 heures	Des tâches domestiques pour 28 heures ou plus	Effectif d'enfants de 12-14 ans	Des tâches domestiques pour moins de 43 heures	Des tâches domestiques pour 43 heures ou plus	Effectif d'enfants de 15-17 ans
Sexe									
Masculin	62,2	1,9	1 124	65,3	1,6	393	69,6	1,1	362
Féminin	77,0	6,3	1 152	76,0	15,5	383	88,9	7,2	345
Résidence									
Urbain	75,8	3,9	884	75,4	9,4	301	84,3	5,8	347
Rural	65,8	4,2	1 392	67,5	7,9	476	74,0	2,4	360
Région									
Nord	51,7	0,1	428	68,1	1,6	136	63,7	0,2	117
Ouest	84,7	6,0	742	78,3	10,6	268	90,0	6,3	279
Centre	65,3	4,6	682	65,1	9,5	242	77,0	2,5	187
Sud	68,8	4,2	424	67,3	9,1	130	72,1	5,2	124
Fréquentation scolaire									
Oui	75,5	4,2	1 116	75,2	7,5	478	85,5	1,8	413
Non	64,1	4,0	1 160	63,1	10,1	298	69,9	7,2	294
Niveau d'instruction de la mère									
Pas d'instruction	66,8	5,1	1 349	66,0	8,7	441	75,0	3,5	350
Primaire	76,8	3,9	342	79,0	3,1	75	87,3	6,8	89
Moyen/secondaire ou plus	64,8	1,8	171	(79,7)	(1,5)	41	(96,8)	(0,0)	40
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[1]	75,6	2,3	411	75,0	11,1	218	79,1	4,7	228
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	61,7	4,5	526	59,0	10,2	191	70,2	4,2	130
Second	68,6	3,5	532	68,1	13,2	172	74,5	4,5	120
Moyen	73,0	4,2	499	83,6	2,8	152	76,3	0,5	147
Quatrième	74,5	6,0	401	72,0	9,2	133	81,3	7,6	141
Le plus élevé	73,6	2,0	317	74,2	5,5	127	89,6	3,8	169
Ensemble [2]	69,7	4,1	2 276	70,6	8,5	776	79,0	4,1	707

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

[1] Y compris les enfants dont la mère est décédée.

[2] Y compris 2 cas d'enfants de 5-11 ans et 1 d'enfant de 12-14 ans dont l'information sur la fréquentation scolaire est manquante.

Tableau 4.6 Travail des enfants

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant participé, au cours de la semaine ayant précédé l'enquête, à des activités économiques ou à des tâches domestiques, pourcentage ayant travaillé dans des conditions dangereuses au cours de la semaine ayant précédé l'interview et pourcentage d'enfants ayant effectué un travail au cours de la semaine ayant précédé l'enquête, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants ayant participé à des activités économiques pour un nombre total d'heures, au cours de la semaine avant l'interview : En dessous du seuil défini pour chaque groupe âges[1]	À la limite ou au-dessus du seuil défini pour chaque groupe âges[1]	Enfants ayant participé à des tâches domestiques pour un nombre total d'heures, au cours de la semaine avant l'interview : En dessous du seuil défini pour chaque groupe d'âges[2]	À la limite ou au-dessus du seuil défini pour chaque groupe d'âges[2]	Enfants ayant travaillé dans des conditions dangereuses[3]	Ensemble du travail des enfants[4]	Effectif d'enfants de 5-17 ans
Age							
5-11	-	20,2	69,7	4,1	10,3	23,5	2 276
12-14	16,4	19,2	70,6	8,5	15,0	31,8	776
15-17	29,0	6,5	79,0	4,1	10,4	18,4	707
Sexe							
Masculin	12,3	25,5	64,3	1,7	15,6	30,2	1 879
Féminin	5,4	9,3	79,0	8,4	7,0	18,4	1 880
Résidence							
Urbain	5,1	5,8	77,7	5,4	3,9	12,7	1 531
Rural	11,4	25,3	67,5	4,7	16,4	32,3	2 228
Région							
Nord	10,0	19,9	57,1	0,4	12,3	22,8	681
Ouest	5,9	7,5	84,5	7,0	5,9	16,0	1 288
Centre	11,1	21,9	67,2	5,3	16,1	29,8	1 111
Sud	9,7	26,2	69,1	5,3	12,8	32,4	679
Fréquentation scolaire							
Oui	8,4	14,1	77,5	4,5	9,1	21,1	2 007
Non	9,4	21,1	64,9	5,6	13,9	28,0	1 752
Niveau d'instruction de la mère							
Pas d'instruction	9,1	22,0	67,9	5,6	13,8	29,3	2 140
Primaire	5,0	9,9	79,0	4,3	4,5	14,4	506
Moyen/secondaire ou plus	3,3	4,7	72,3	1,5	2,9	7,6	251
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[5]	12,1	14,1	76,3	5,1	11,7	22,5	857
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	14,8	34,7	62,4	5,7	25,1	44,3	848
Second	9,7	25,4	69,3	5,7	14,8	32,9	825
Moyen	8,2	12,1	75,6	3,3	7,6	17,1	797
Quatrième	4,9	5,1	75,5	7,0	3,1	12,4	676
Le plus élevé	4,6	3,1	78,1	3,2	1,5	7,6	614
Ensemble[6]	8,8	17,4	71,6	5,0	11,3	24,3	3 759

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.
[1] Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 1 heure d'activité économique pour les enfants de 5-11 ans, 14 heures d'activité , économique pour les enfants de 12-14 ans, et 43 heures d'activité, ,économique pour les enfants de 15-17 ans.
[2] Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 28 heures de tâches domestiques pour les enfants de 5-11 ans et 12-14 ans, et 43 heure de tâches domestiques pour les enfants de 15-17 ans.
[3] Selon la définition de l'UNICEF, les enfants travaillant dans des conditions dangereuses sont ceux qui, dans le cadre de leur travail : a) portent des charges lourdes ; ou b) travaillent avec des outils dangereux ou font fonctionner de grosses machines ; ou c) sont exposés la poussière, à la fumée ou au gaz ; ou d) sont exposés au froid, à la chaleur ou à de l'humidité, extrême ; e) sont exposés à des bruits intenses ou des vibrations ; f) sont exposés à un travail en hauteur ; g) sont exposés à des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou … des explosifs ; h) sont exposés … d'autres choses, procédés ou conditions mauvaises pour sa santé, ou sa sécurité.
[4] Selon la définition de l'UNICEF, sont inclus dans cette catégorie les enfants qui a) participent à des activités ,économiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou b) participent à des tâches domestiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou c) qui travaillent dans des conditions dangereuses.
[5] Y compris les enfants dont la mère est décédée.
[6] Y compris 4 cas d'enfants de 5-17 ans enfants dont l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante.

FÉCONDITÉ 5

Tableau 5.1 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années ayant précédé l'enquête selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2016

Groupe d'âges	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
15-19	35	106	72
20-24	136	247	192
25-29	173	275	230
30-34	167	229	197
35-39	110	183	145
40-44	65	92	77
45-49	5	42	22
ISF (15-49)	3,5	5,9	4,7
TGFG	113	196	156
TBN	27,2	40,8	34,6

Notes : Les taux sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux pour le groupe d'âges 45-49 ans peuvent être légèrement biaisés pour cause de troncature. Les taux correspondent à la période 1-36 mois avant l'interview.
ISF : Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme.
TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes âge 15-44 ans.
TBN : Taux Brut de Natalité exprimé pour 1 000 individus.

Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques

Indice Synthétique de Fécondité pour les trois années ayant précédé l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique	Indice synthétique de fécondité	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes	Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans
Résidence			
Urbain	3,5	7,7	4,5
Rural	5,9	10,0	6,3
Grande Région			
Nord	5,0	9,4	5,5
Ouest	3,7	7,9	4,7
Centre	5,5	9,8	6,0
Sud	5,6	9,2	6,3
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	5,7	10,8	6,0
Primaire	4,4	9,7	4,9
Moyen/secondaire ou plus	3,3	5,0	3,0
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	7,1	12,0	7,2
Second	6,2	8,9	6,6
Moyen	4,3	9,3	5,5
Quatrième	3,5	7,2	4,7
Le plus élevé	3,4	7,9	4,0
Ensemble	4,7	8,9	5,3

Note : l'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période 1-36 mois avant l'interview.

Tableau 5.3 Fécondité par âge selon six sources

Taux de fécondité par âge et indice synthétique de fécondité (sur une période de trois années ayant précédé l'enquête), EDS-Continue, Sénégal 2016

Groupe d'âges	EDS 1986	EDS 1992	EDS 1997	EDS 2005	EDS-MICS 2010-2011	EDS-Continue 2012-2013	EDS-Continue 2014	EDS-Continue 2015	EDS-Continue 2016
15-19	154	127	103	101	93	80	90	80	72
20-24	270	250	219	212	201	210	195	189	192
25-29	271	266	240	250	241	246	240	226	230
30-34	261	244	245	228	219	223	210	213	197
35-39	196	185	186	169	156	184	155	164	145
40-44	89	99	99	74	73	97	96	83	77
45-49	36	34	41	22	13	19	20	16	22
ISF 15-49 ans	6,4	6,0	5,7	5,3	5,0	5,3	5,0	4,9	4,7

Note : Taux de fécondité par groupe d'âges pour 1 000 femmes

Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes

Répartition (en %) de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes actuellement en union de 15-49 ans par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, selon le groupe d'âges des femmes, EDS-Continue, Sénégal 2016

Groupe d'âges	Nombre d'enfants nés vivants											Total	Effectif de femmes	Nombre moyen d'enfants nés vivants	Nombre moyen d'enfants survivants
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+				
ENSEMBLE DES FEMMES															
15-19	87,7	10,2	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 998	0,15	0,14
20-24	50,3	24,4	16,3	7,5	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 664	0,86	0,82
25-29	20,7	18,3	19,4	20,3	12,4	5,1	3,2	0,4	0,1	0,0	0,0	100,0	1 524	2,17	2,03
30-34	14,8	11,7	12,2	17,2	16,3	12,1	8,3	4,8	1,9	0,6	0,0	100,0	1 318	3,18	2,95
35-39	8,1	4,7	9,3	14,0	14,7	14,8	13,8	9,3	7,5	2,1	1,7	100,0	998	4,43	4,04
40-44	6,7	5,4	10,4	12,4	11,3	9,7	12,6	11,8	8,6	6,5	4,5	100,0	806	4,90	4,42
45-49	6,7	3,8	2,9	7,8	8,9	11,3	13,1	13,4	10,9	8,8	12,4	100,0	557	5,96	5,32
Ensemble	36,9	13,0	10,8	10,7	8,0	6,0	5,3	3,8	2,6	1,5	1,4	100,0	8 865	2,36	2,16
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION															
15-19	53,2	38,2	7,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	487	0,56	0,54
20-24	23,6	35,1	26,3	12,5	2,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	985	1,35	1,29
25-29	9,8	17,9	21,7	24,6	15,1	6,3	4,0	0,5	0,1	0,0	0,0	100,0	1 228	2,56	2,39
30-34	6,7	11,2	12,7	18,8	18,8	14,1	9,1	5,7	2,3	0,7	0,1	100,0	1 105	3,58	3,33
35-39	3,6	3,9	9,4	13,6	16,2	15,4	15,1	10,4	8,4	2,3	1,9	100,0	886	4,76	4,35
40-44	3,6	4,2	9,4	11,0	12,5	10,5	13,3	13,3	9,6	7,4	5,2	100,0	706	5,29	4,77
45-49	3,2	3,5	2,7	7,3	9,4	11,5	13,1	14,3	11,8	9,3	13,9	100,0	486	6,30	5,64
Ensemble	12,9	16,2	14,7	14,8	11,7	8,6	7,5	5,5	3,9	2,1	2,1	100,0	5 883	3,35	3,08

Tableau 5.5 Intervalle intergénésique

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang un, ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente, et nombre médian de mois depuis la naissance précédente selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Mois depuis la naissance précédente						Total	Effectifs de naissances autres que de premier rang	Nombre médian de mois depuis la naissance précédente
	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+			
Groupe d'âges									
15-19	15,8	9,8	52,1	18,8	3,5	0,0	100,0	46	28,6
20-29	5,0	13,4	44,2	22,8	8,5	6,1	100,0	1 887	32,2
30-39	4,0	7,6	37,5	22,9	13,1	14,8	100,0	2 113	36,3
40-49	3,1	8,3	27,1	20,4	12,0	29,1	100,0	637	43,2
Sexe de l'enfant précédent									
Masculin	4,1	10,3	40,2	21,9	12,6	10,9	100,0	2 359	34,5
Féminin	4,7	9,8	37,7	23,1	9,4	15,3	100,0	2 325	35,3
Survie de la naissance précédente									
Vivante	3,1	9,7	39,5	22,9	11,3	13,5	100,0	4 425	35,3
Décédée	26,4	15,7	28,8	15,1	6,7	7,2	100,0	258	26,7
Rang de naissance									
2-3	4,4	10,9	36,1	22,1	11,6	14,8	100,0	2 153	35,5
4-6	3,9	8,8	40,6	23,3	11,1	12,3	100,0	1 773	35,0
7+	5,4	10,6	43,2	21,6	9,0	10,1	100,0	759	33,2
Résidence									
Urbain	4,3	9,4	30,3	22,1	13,7	20,2	100,0	1 626	38,5
Rural	4,4	10,4	43,6	22,7	9,6	9,3	100,0	3 058	33,7
Grande Région									
Nord	4,7	12,1	39,2	22,3	11,6	10,2	100,0	865	34,4
Ouest	3,6	9,0	31,6	22,5	13,7	19,6	100,0	1 411	38,6
Centre	5,1	10,0	43,8	22,0	8,9	10,2	100,0	1 555	33,5
Sud	4,1	9,9	42,0	23,5	9,8	10,7	100,0	854	34,3
Niveau d'instruction									
Pas d'instruction	4,3	10,2	42,0	23,2	10,1	10,3	100,0	3 276	34,2
Primaire	4,4	10,1	33,5	20,6	14,3	17,1	100,0	962	36,9
Moyen/secondaire ou plus	5,1	9,2	28,6	21,4	10,5	25,2	100,0	445	39,0
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	5,4	12,2	46,8	21,0	7,6	7,0	100,0	1 284	32,0
Second	4,1	9,8	43,7	23,6	9,4	9,4	100,0	1 082	34,0
Moyen	2,8	10,8	37,4	24,9	12,0	12,1	100,0	865	35,7
Quatrième	5,0	7,3	32,2	22,3	13,5	19,7	100,0	817	38,4
Le plus élevé	4,0	8,8	25,8	20,6	16,2	24,5	100,0	636	41,5
Ensemble	4,4	10,1	38,9	22,5	11,0	13,1	100,0	4 684	34,9

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances des trois années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois écoulés depuis la naissance et durées médiane et moyenne EDS-Continue, Sénégal 2016

Nombre de mois depuis la naissance	Pourcentage de naissances pour lesquelles les mères sont :			Effectif de naissances
	En aménorrhée	En abstinence	En insusceptibilité[1]	
<2	97,2	98,3	100,0	161
2-3	80,1	52,1	84,8	222
4-5	72,1	29,9	77,9	176
6-7	56,7	25,1	67,1	219
8-9	52,7	18,1	56,5	206
10-11	49,8	15,1	54,5	187
12-13	40,6	11,6	45,1	196
14-15	40,4	14,9	49,5	181
16-17	29,2	11,0	35,5	191
18-19	17,5	15,0	29,9	219
20-21	14,5	7,6	20,8	205
22-23	10,4	8,1	18,3	179
24-25	6,3	3,6	9,9	178
26-27	5,3	6,6	11,9	179
28-29	0,9	2,6	3,5	177
30-31	0,3	2,7	3,0	245
32-33	3,1	2,4	5,5	192
34-35	0,9	1,4	2,3	226
Ensemble	31,5	17,4	36,9	3 538
Médiane	9,7	3,3	12,2	na
Moyenne	11,8	6,8	13,8	na

Note : Les calculs sont basés sur le statut au moment de l'enquête.
na = Non applicable
[1] Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance

Tableau 5.7 Âge à la première naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage qui n'ont jamais eu d'enfant et âge médian à la première naissance selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2016

Âge actuel	Pourcentage ayant eu une naissance avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais donné naissance	Effectif de femmes	Âge médian à la première naissance
	15	18	20	22	25			
Groupe d'âges								
15-19	0,9	na	na	na	na	87,7	1 998	a
20-24	1,6	17,0	31,4	na	na	50,3	1 664	a
25-29	1,9	19,4	37,8	54,4	71,0	20,7	1 524	21,5
30-34	2,6	19,1	34,9	51,0	67,7	14,8	1 318	21,9
35-39	1,6	19,8	34,8	50,8	71,6	8,1	998	21,9
40-44	3,7	19,3	33,5	49,5	65,9	6,7	806	22,1
45-49	1,7	18,6	38,6	55,8	73,7	6,7	557	21,0
20-49	2,1	18,8	34,8	na	na	22,1	6 867	a
25-49	2,3	19,3	35,9	52,2	69,8	13,1	5 203	21,7

na = Non applicable
a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.8 Âge médian à la première naissance

Âge médian à la première naissance des femmes de 20-49 ans et 25-49 ans selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique socio-économique	Âge des femmes 20-49	Âge des femmes 25-49
Résidence		
Urbain	a	23,3
Rural	a	20,4
Grande Région		
Nord	a	21,2
Ouest	a	23,4
Centre	a	20,7
Sud	19,8	19,6
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	a	20,4
Primaire	a	22,8
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	19,2	19,1
Second	a	20,0
Moyen	a	21,7
Quatrième	a	22,8
Le plus élevé	a	25,0
Ensemble	a	21,7

a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.9 Fécondité des adolescentes

Pourcentage d'adolescentes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage qui ont déjà commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :			
Caractéristiques sociodémographiques	Ont eu une naissance vivante	Sont enceintes d'un premier enfant	Pourcentage ayant déjà commencé leur vie procréative	Effectif de femmes
Âge				
15	0,5	1,2	1,7	385
16	6,5	1,4	7,9	416
17	8,9	3,0	11,8	369
18	18,9	5,4	24,3	465
19	26,5	4,9	31,5	364
Résidence				
Urbain	5,4	2,4	7,8	923
Rural	18,3	3,9	22,2	1 075
Grande Région				
Nord	14,1	2,2	16,2	357
Ouest	4,8	2,3	7,1	712
Centre	15,2	4,2	19,5	602
Sud	21,4	4,5	26,0	327
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	25,4	7,1	32,5	575
Primaire	14,7	2,2	16,9	394
Moyen/secondaire ou plus	4,1	1,5	5,5	1 029
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	27,5	6,4	33,9	365
Second	19,0	2,5	21,5	383
Moyen	10,4	3,6	14,0	389
Quatrième	6,8	2,1	8,9	429
Le plus élevé	0,8	2,0	2,8	432
Ensemble	12,3	3,2	15,6	1 998

FÉCONDITÉ (PART 2) 5

Tableau 5.10 Tendance de la fécondité par âge

Taux de fécondité par âge par période de cinq ans ayant précédé l'enquête, selon l'âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant EDS-Continue, Sénégal 2016

Groupe d'âges	Nombre d'années ayant précédé l'enquête 0-4	5-9	10-14	15-19
15-19	75	98	98	92
20-24	199	224	224	206
25-29	225	243	251	243
30-34	199	243	244	264
35-39	160	183	222	*
40-44	86	155	*	*
45-49	25	*	*	*

Note: Les taux de fécondité par groupe d'âges sont exprimés pour 1000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux excluent le mois de l'interview.

Tableau 5.11 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum

Nombre médian de mois d'aménorrhée, d'abstinence et d'insusceptibilité post-partum, à la suite d'une naissance ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Aménorrhée postpartum	Abstinence postpartum	Insusceptibilité postpartum[1]
Age de la mère			
15-29	9,4	3,3	11,0
30-49	12,6	3,2	13,2
Résidence			
Urbain	6,1	3,6	8,4
Rural	11,8	3,1	13,6
Grande Région			
Nord	9,4	2,8	10,3
Ouest	6,6	3,0	8,6
Centre	11,8	2,6	12,5
Sud	12,1	8,9	16,9
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	12,0	3,3	13,8
Primaire	8,2	3,6	9,4
Moyen/secondaire ou plus	6,9	2,8	9,2
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	13,2	3,9	15,0
Second	10,1	3,6	13,6
Moyen	10,5	3,0	12,7
Quatrième	5,1	3,7	6,4
Le plus riche	5,6	*	7,7
Total	9,7	3,3	12,2

Note: Les médianes sont basées sur le statut actuel
[1] Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance

Tableau 5.12 Ménopause

Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, EDS-Continue, Sénégal 2016

Age	Pourcentage en ménopause[1]	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
30-34	2,5	1 318
35-39	1,9	998
40-41	3,5	374
42-43	11,1	308
44-45	11,1	263
46-47	19,8	214
48-49	34,7	203
Total	6,5	3 678

[1] Pourcentage de toutes les femmes qui ne sont ni enceintes, ni en aménorrhée postpartum et dont les dernières règles ont eu lieu 6 mois ou plus avant l'enquête.

MORTALITÉ DES ENFANTS 6

Tableau 6.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de cinq ans

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de cinq ans ayant précédé l'enquête, EDS-Continue, Sénégal 2016

Nombre d'années ayant précédé l'enquête	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéo-natale (PNN)[1]	Mortalité infantile ($_1q_0$)	Mortalité juvénile ($_4q_1$)	Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)
0-4	21	15	36	16	51
5-9	27	17	44	26	68
10-14	29	23	53	40	91

[1] Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

Tableau 6.2 Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques socio-économiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des dix années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique socio-économique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéo-natale (PNN)[1]	Mortalité infantile ($_1q_0$)	Mortalité juvénile ($_4q_1$)	Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)
Résidence					
Urbain	20	11	31	10	41
Rural	26	18	45	27	70
Grande Région					
Nord	24	16	40	14	53
Ouest	17	11	28	8	36
Centre	25	17	43	22	63
Sud	34	21	55	48	100
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	26	18	44	25	68
Primaire	23	13	36	10	46
Moyen/secondaire ou plus	17	7	24	7	32
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	31	22	53	40	91
Second	23	18	41	22	62
Moyen	22	15	36	17	53
Quatrième	25	13	38	8	46
Le plus élevé	15	6	21	6	27

[1] Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

Tableau 6.3 Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques démographiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des dix années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique démographique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité post-néonatale (PNN)[1]	Mortalité infantile ($_1q_0$)	Mortalité juvénile ($_4q_1$)	Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)
Sexe de l'enfant					
Masculin	27	16	43	20	63
Féminin	21	15	36	20	55
Âge de la mère à la naissance de l'enfant					
<20	20	16	36	29	65
20-29	24	16	40	20	59
30-39	24	15	40	18	57
40-49	37	(9)	(46)	*	*
Rang de naissance					
1	23	13	37	16	53
2-3	22	15	36	21	57
4-6	25	18	43	23	65
7+	29	18	47	16	63
Intervalle avec la naissance précédente[2]					
<2 années	34	27	61	30	89
2 années	25	16	42	23	64
3 années	14	13	28	21	48
4 années+	23	9	32	9	41
Taille à la naissance[3]					
Petit/très petit	30	22	52	na	na
Moyen ou gros	15	12	27	na	na

Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 250-499 cas années d'exposition non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 250 cas années d'exposition non pondérés.
na = Non applicable.
[1] Calculé par différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale.
[2] Non compris les naissances de rang 1.
[3] Quotients pour la période des cinq années avant l'enquête.

Tableau 6.4 Mortalité périnatale

Effectif de mort-nés, de décès néonatals précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des cinq années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Effectifs de mort-nés[1]	Effectif de décès néonatals précoces[2]	Taux de mortalité périnatale[3]	Effectif de grossesses de 7 mois ou +
Age de la mère à la naissance de l'enfant				
<20	19	7	36	739
20-29	39	49	27	3 229
30-39	68	34	53	1 915
40-49	7	12	59	322
Intervalle avec la naissance précédente en mois[4]				
Première grossesse	36	17	40	1 329
<15	14	11	34	731
15-26	23	32	37	1 476
27-38	10	22	26	1 193
39+	50	20	48	1 476
Résidence				
Urbain	60	28	38	2 293
Rural	73	74	38	3 912
Grande Région				
Nord	21	24	40	1 133
Ouest	53	18	36	1 958
Centre	34	36	35	2 008
Sud	24	23	43	1 106
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	86	72	39	4 010
Primaire	31	18	37	1 346
Moyen/secondaire ou plus	16	11	37	741
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	30	36	42	1 567
Second	23	24	33	1 400
Moyen	28	17	39	1 165
Quatrième	28	18	41	1 135
Le plus élevé	23	7	32	938
Ensemble	133	102	38	6 206

[1] Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.
[2] Les décès néonatals précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.
[3] La somme du nombre de mort-nés et de décès néonatals divisée par le nombre de grossesses de 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000.
[4] Les catégories correspondent à des intervalles intergénésiques de <24 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48 mois ou plus.

Tableau 6.5 Comportement procréateur à hauts risques

Répartition (en %) des enfants nés au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par catégorie de hauts risques de mortalité, ratio de risque et répartition (en %) des femmes actuellement en union par catégorie de hauts risques si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, EDS-Continue, Sénégal 2016

Catégories de risques	Naissances des cinq années ayant précédé l'enquête		Pourcentage de femmes actuellement en union[1]
	Pourcentage de naissances	Ratio de risques	
Dans aucune catégorie à hauts risques	27,5	1,00	17,4
Catégorie à risque inévitable			
Naissances de rang 1, âge entre 18 et 34 ans	18,2	1,13	10,2
Catégorie à haut risque unique			
Âge de la mère <18	4,8	1,23	1,6
âge de la mère >34	2,4	1,19	5,7
Intervalle intergénésique <24 mois	5,1	1,34	9,3
Rang de naissance >3	23,4	1,27	14,9
Sous-total	35,7	1,27	31,5
Catégorie à hauts risques multiples			
Âge <18 et intervalle intergénésique <24 mois[2]	0,2	(3,01)	0,4
Âge >34 et intervalle intergénésique <24 mois	0,1	*	0,1
Âge >34 et rang de naissance >3	12,5	1,69	26,5
Âge >34 et intervalle intergénésique <24 mois et rang de naissance >3	1,7	0,96	4,5
Intervalle intergénésique <24 mois et rang de naissance >3	4,0	2,53	9,5
Sous-total	18,6	1,85	41,0
Dans une des catégories de hauts risques évitables	54,3	1,47	72,4
Total	100,0	na	100,0
Effectif de naissances/femmes	6 073	na	5 883

Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondéré et qu'elle sa été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.
Note : Le rapport de risque est le rapport de la proportion d'enfants décédés, parmi les enfants appartenant à chaque catégorie à hauts risques, à la proportion d'enfants décédés parmi les enfants n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques.
na = Non applicable.
[1] Les femmes sont classées dans les catégories à hauts risques selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si l'enfant était conçu au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, ou la dernière naissance a eu lieu dans les 15 derniers mois, ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus.
[2] Y compris la catégorie : âge <18 ans et RG >3.
[a] Y compris les femmes stérilisées.

PLANIFICATION FAMILIALE ET PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ 7

Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives par caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage qui ont entendu parler d'au moins une méthode moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme			Homme		
Caractéristique sociodémographique	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne[1]	Effectif	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne[1]	Effectif
Groupe d'âges						
15-19	86,3	86,0	487	*	*	5
20-24	94,9	94,9	985	(90,9)	(90,9)	43
25-29	97,1	97,0	1 228	96,8	96,8	154
30-34	97,3	97,3	1 105	98,2	98,2	252
35-39	97,3	97,3	886	98,6	98,6	287
40-44	96,2	96,1	706	99,0	99,0	246
45-49	96,2	96,2	486	99,2	99,2	238
Résidence						
Urbain	98,7	98,7	2 455	99,6	99,6	624
Rural	93,5	93,4	3 428	96,7	96,7	602
Grande Région						
Nord	93,4	93,4	1 081	99,2	99,2	212
Ouest	99,4	99,4	2 089	100,0	100,0	522
Centre	95,4	95,3	1 795	96,7	96,7	276
Sud	90,8	90,5	918	94,7	94,7	215
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	93,9	93,8	3 660	96,7	96,7	657
Primaire	98,0	98,0	1 296	99,7	99,7	294
Moyen/secondaire ou plus	99,7	99,7	927	100,0	100,0	275
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	88,8	88,6	1 247	94,6	94,6	271
Second	94,6	94,5	1 188	98,7	98,7	211
Moyen	97,8	97,8	1 117	98,1	98,1	214
Quatrième	98,7	98,7	1 199	99,7	99,7	270
Le plus élevé	99,4	99,4	1 132	100,0	100,0	259
Ensemble 15-49	95,7	95,7	5 883	98,2	98,2	1 225
50-59	na	na	na	98,3	98,3	348
Ensemble 15-59	na	na	na	98,2	98,2	1 574

Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non applicable
[1] Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, diaphragme, mousse ou gelée, Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et pilule du lendemain.

Tableau 7.2 Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes actuellement en union de 15-49 ans par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Une méthode moderne: Stérilisation féminine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	MAMA	Autre	Une méthode traditionnelle	Une méthode traditionnelle: Rythme	Retrait	Autre	N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes
Nombre d'enfants vivants																	
0	2,5	2,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,7	1,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0	97,5	100,0	787
1-2	24,0	22,1	0,0	5,2	1,0	8,1	6,7	0,9	0,2	0,0	1,9	0,5	0,7	0,7	76,0	100,0	1 944
3-4	30,9	28,2	0,9	5,6	1,7	11,9	7,2	0,5	0,1	0,3	2,7	1,3	0,2	1,2	69,1	100,0	1 643
5+	32,1	29,7	1,9	5,1	3,0	8,3	10,8	0,2	0,2	0,2	2,4	1,0	0,4	1,0	67,9	100,0	1 509
Résidence																	
Urbain	34,2	31,3	1,5	6,8	2,6	10,1	9,1	1,2	0,1	01	2,9	1,4	0,8	0,6	65,8	100,0	2 455
Rural	18,6	17,2	0,2	3,1	0,8	6,8	5,7	0,2	0,2	0,1	1,5	0,3	0,2	1,0	81,4	100,0	3 428
Grande Région																	
Nord	20,3	19,8	0,3	4,1	0,9	8,0	6,0	0,0	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	79,7	100,0	1 081
Ouest	36,3	32,9	1,6	7,6	3,0	10,2	9,4	1,1	0,0	0,1	3,3	1,6	1,0	0,7	63,7	100,0	2 089
Centre	18,4	16,9	0,2	2,9	0,9	7,2	4,8	0,3	0,3	0,2	1,6	0,5	0,2	0,9	81,6	100,0	1 795
Sud	18,6	16,6	0,4	1,6	0,4	5,6	7,8	0,8	0,0	0,1	1,9	0,2	0,0	1,7	81,4	100,0	918
Niveau d'instruction																	
Pas d'instruction	21,1	19,4	0,7	3,9	1,1	6,7	6,5	0,2	0,2	0,1	1,6	0,5	0,2	0,9	78,9	100,0	3 660
Primaire	32,8	30,3	1,0	6,0	2,5	10,8	9,2	0,7	0,0	0,0	2,5	0,9	0,5	1,0	67,2	100,0	1 296
Moyen/secondaire ou plus	30,5	27,3	0,5	5,2	2,0	10,4	6,7	2,0	0,1	0,4	3,2	1,7	1,3	0,2	69,5	100,0	927
Quintiles de bien-être économique																	
Le plus bas	15,6	13,4	0,2	0,8	0,8	4,9	6,2	0,1	0,4	0,1	2,2	0,3	0,1	1,8	84,4	100,0	1 247
Second	19,5	18,3	0,2	2,4	1,0	7,0	7,2	0,2	0,1	0,3	1,2	0,4	0,0	0,8	80,5	100,0	1 188
Moyen	28,2	26,5	0,7	6,0	1,1	9,5	8,6	0,6	0,1	0,0	1,6	0,7	0,5	0,4	71,8	100,0	1 117
Quatrième	31,3	29,3	2,2	7,6	1,2	10,2	6,7	1,0	0,2	0,2	2,0	0,9	0,4	0,7	68,7	100,0	1 199
Le plus élevé	32,0	28,7	0,4	6,5	3,9	9,5	7,1	1,2	0,0	0,1	3,3	1,8	1,2	0,4	68,0	100,0	1 132
Ensemble	25,1	23,1	0,7	4,6	1,6	8,2	7,1	0,6	0,2	0,2	2,1	0,8	0,4	0,8	74,9	100,0	5 883

Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon âge

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, des femmes actuellement en union et des femmes qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actives, par méthode contraceptive actuellement utilisée selon le groupe d'âges, EDS-Continue, Sénégal 2016

Groupe d'âges	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Une méthode moderne: Stérilisation féminine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	MAMA	Autre	Une méthode traditionnelle	Une méthode traditionnelle: Rythme	Retrait	Autre	N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes
TOUTES LES FEMMES																	
15-19	2,2	1,9	0,0	0,2	0,0	0,5	0,8	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	97,8	100,0	1 998
20-24	13,7	12,7	0,0	2,0	0,7	4,6	4,5	0,9	0,0	0,0	0,9	0,2	0,3	0,5	86,3	100,0	1 664
25-29	20,3	19,4	0,0	4,2	0,4	8,5	5,5	0,4	0,2	0,1	1,0	0,3	0,2	0,5	79,7	100,0	1 524
30-34	29,1	26,6	0,4	5,9	1,6	9,8	7,7	1,0	0,0	0,2	2,5	0,9	0,4	1,2	70,9	100,0	1 318
35-39	28,2	25,6	1,2	3,2	2,8	8,9	8,9	0,5	0,1	0,0	2,6	1,0	1,1	0,5	71,8	100,0	998
40-44	28,3	26,4	0,8	6,4	3,4	5,9	8,3	1,4	0,0	0,2	1,9	0,9	0,1	0,8	71,7	100,0	806
45-49	21,2	18,8	3,6	2,9	1,5	5,0	5,4	0,2	0,0	0,2	2,4	2,1	0,0	0,3	78,8	100,0	557
Total	18,0	16,6	0,5	3,1	1,2	5,8	5,2	0,6	0,1	0,1	1,4	0,5	0,3	0,6	82,0	100,0	8 865
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION																	
15-19	6,7	5,5	0,0	0,7	0,0	1,7	2,4	0,1	0,6	0,0	1,2	0,1	0,0	1,1	93,3	100,0	487
20-24	20,2	18,6	0,0	2,8	1,2	6,9	6,5	1,2	0,1	0,0	1,5	0,2	0,5	0,8	79,8	100,0	985
25-29	23,8	22,6	0,0	5,2	0,5	9,8	6,1	0,5	0,3	0,1	1,2	0,3	0,2	0,6	76,2	100,0	1 228
30-34	31,7	28,7	0,5	7,0	1,5	11,3	7,9	0,3	0,0	0,2	2,9	1,0	0,5	1,4	68,3	100,0	1 105
35-39	30,7	27,9	1,4	3,6	2,5	10,0	9,8	0,4	0,2	0,0	2,8	1,1	1,3	0,5	69,3	100,0	886
40-44	31,1	28,9	0,9	7,3	3,9	6,3	8,8	1,5	0,0	0,2	2,2	1,1	0,2	1,0	68,9	100,0	706
45-49	23,5	20,8	4,0	3,2	1,7	5,4	6,2	0,0	0,0	0,3	2,7	2,4	0,0	0,3	76,5	100,0	486
Total	25,1	23,1	0,7	4,6	1,6	8,2	7,1	0,6	0,2	0,2	2,1	0,8	0,4	0,8	74,9	100,0	5 883
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES[1]																	
Total	(49,5)	(47,9)	(0,5)	(1,6)	(12,5)	(15,0)	(5,9)	(12,4)	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	50,5	100,0	43

Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.
na = Non applicable
MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée
[1] Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours ayant précédé l'enquête.

Tableau 7.4 Source d'approvisionnement des méthodes modernes

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans par source d'approvisionnement la plus récente, en fonction de la méthode, EDS-Continue, Sénégal 2016

Source d'approvisionnement	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Total
Secteur public	80,3	82,9	97,9	93,2	22,2	88,8
Hôpital du gouvernement	0,7	3,7	1,7	6,0	1,3	4,4
Centre de santé du gouvernement	15,8	34,3	14,4	24,2	0,0	19,7
Poste de santé du gouvernement	55,0	38,4	73,6	58,6	0,0	57,5
Clinique de PF	2,9	1,2	2,6	1,8	0,0	2,1
Maternité rurale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Case de santé	4,1	0,0	3,4	1,0	0,0	2,3
Pharmacie communautaire	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,1
Stratégie avancée/équipe mobile	0,0	1,0	0,2	1,5	0,0	0,6
Autre public	1,7	4,3	2,0	0,2	19,5	2,1
Secteur médical privé	19,7	0,9	1,8	3,0	50,0	7,4
Hôpital/clinique privé	3,3	0,9	1,8	2,4	0,0	2,2
Pharmacie	16,1	0,0	0,0	0,0	50,0	5,0
Médecin privé	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
Dispensaire religieux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre médical privé	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Autre	0,0	0,0	0,1	0,0	27,8	1,1
Boutique	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,3
Église	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amis/parents	0,0	0,0	0,1	0,0	20,5	0,8
Bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Out of the calencar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ne sait pas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Manquant	0,0	16,2	0,0	3,9	0,0	2,4
Total	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,7
Effectif de femmes	276	104	510	462	56	1 455

[1] L'ensemble inclut d'autres méthodes modernes mais pas la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA).

Tableau 7.5 Besoins en matière de planification familiale des femmes actuellement en union

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage de demande totale en planification familiale et pourcentage de demande selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale[1]			Pourcentage de demande satisfaite[2]	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes[3]	Effectif de femmes
Caractéristique sociodémographique	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Groupe d'âges												
15-19	25,5	0,9	26,4	6,7	0,0	6,7	32,2	0,9	33,1	20,2	16,7	487
20-24	24,2	0,3	24,5	20,0	0,1	20,2	44,3	0,4	44,7	45,1	41,7	985
25-29	22,4	1,0	23,5	22,9	0,8	23,8	45,4	1,9	47,2	50,3	47,8	1 228
30-34	17,5	3,3	20,8	26,0	5,6	31,7	43,5	9,0	52,5	60,3	54,8	1 105
35-39	14,2	9,7	23,9	17,5	13,3	30,7	31,7	23,0	54,7	56,2	51,0	886
40-44	7,0	18,4	25,5	8,6	22,5	31,1	15,6	41,0	56,6	55,0	51,1	706
45-49	2,2	20,4	22,6	1,5	22,0	23,5	3,7	42,4	46,1	51,0	45,1	486
Résidence												
Urbain	13,3	6,2	19,5	23,5	10,7	34,2	36,8	16,9	53,7	63,7	58,3	2 455
Rural	20,2	6,4	26,6	13,0	5,7	18,6	33,1	12,1	45,2	41,2	38,0	3 428
Grande Région												
Nord	21,9	6,6	28,5	13,9	6,4	20,3	35,8	13,0	48,8	41,6	40,5	1 081
Ouest	12,5	6,3	18,8	25,0	11,3	36,3	37,5	17,6	55,1	65,9	59,8	2 089
Centre	20,3	6,6	26,9	13,4	5,0	18,4	33,7	11,6	45,3	40,7	37,2	1 795
Sud	17,1	5,4	22,5	11,7	6,9	18,6	28,7	12,3	41,1	45,2	40,5	918
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	17,3	7,1	24,4	13,2	7,8	21,1	30,5	15,0	45,5	46,3	42,7	3 660
Primaire	17,4	5,4	22,8	25,0	7,8	32,8	42,4	13,2	55,6	58,9	54,5	1 296
Moyen/secondaire ou plus	17,3	4,4	21,6	23,0	7,5	30,5	40,2	11,9	52,1	58,5	52,4	927
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	20,2	7,7	27,8	10,2	5,5	15,6	30,3	13,2	43,5	36,0	30,9	1 247
Second	20,9	5,3	26,2	12,7	6,7	19,5	33,7	12,0	45,7	42,6	40,1	1 188
Moyen	16,3	6,1	22,3	19,3	8,9	28,2	35,6	14,9	50,5	55,8	52,5	1 117
Quatrième	16,2	6,0	22,2	22,7	8,6	31,3	38,9	14,6	53,5	58,5	54,8	1 199
Le plus élevé	12,6	6,5	19,0	22,5	9,5	32,0	35,1	16,0	51,1	62,7	56,2	1 132
Ensemble	17,3	6,3	23,6	17,4	7,8	25,1	34,7	14,1	48,8	51,6	47,3	5 883

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale décrite dans in Bradley et al., 2012.
[1] La demande totale équivaut à la somme des besoins satisfaits et des besoins non satisfaits en matière de planification familiale
[2] Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale [3] Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, l, la pilule, le DIU les injectables, les implants, le condom masculin et la Méthode de l'aménorrhée et de l'Allaitement maternel (MAMA.)

Tableau 7.6 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, par désir d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants, EDS-Continue, Sénégal 2016

Désir d'enfants	Nombre d'enfants vivants[1] 0	1	2	3	4	5	6+	Ensemble 15-49	Ensemble 15-59
FEMME									
Veut un autre bientôt[2]	77,8	31,9	32,6	22,6	22,7	18,0	7,8	28,6	na
Veut un autre plus tard[3]	6,7	58,0	55,0	56,3	48,5	39,3	20,5	42,2	na
Veut un autre, NSP quand	14,1	7,9	6,5	7,0	4,1	5,8	2,6	6,5	na
Indécise	0,0	0,1	0,4	0,9	1,9	2,5	2,7	1,2	na
Ne veut plus d'enfant	0,2	1,3	4,3	11,4	20,6	30,3	59,9	18,8	na
Stérilisée[4]	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	1,6	2,0	0,7	na
S'est déclarée stérile	1,3	0,8	1,2	1,2	1,2	2,4	4,5	1,8	na
Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	na
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	na
Effectif	622	1 017	929	967	781	520	1 046	5 883	na
HOMME									
Veut un autre bientôt[2]	76,3	32,2	32,8	26,8	23,8	17,9	10,4	31,3	29,6
Veut un autre plus tard[3]	12,2	39,5	40,6	32,4	38,2	29,5	25,3	31,9	27,3
Veut un autre, NSP quand	4,9	17,6	21,0	24,7	23,3	21,9	8,3	17,4	15,7
Indécise	1,3	0,1	1,4	1,4	4,3	0,7	1,9	1,6	1,7
Ne veut plus d'enfant	0,5	1,8	0,7	2,5	2,5	3,3	11,8	3,3	7,1
Stérilisée[4]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S'est déclarée stérile	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,4
Manquant	4,8	8,4	3,5	12,2	7,9	26,3	42,0	14,4	18,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	154	232	185	195	169	102	188	1 225	1 573

na = Non applicable
[1] Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle.
[2] Veut une autre naissance dans les deux ans.
[3] Veut espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus.
[4] Y compris la stérilisation féminine et masculine.
[5] Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêtée est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).

PLANIFICATION FAMILIALE ET PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ (PART 2) 7

Tableau 7.7 Connaissance des méthodes contraceptives

Pourcentage d'hommes et de femmes de 15-49 ans, d'hommes et de femmes actuellement en union et d'hommes et de femmes qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actifs qui ont entendu parler d'une méthode contraceptive, selon la méthode, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme			Homme		
Méthode	Ensemble des femmes	Femmes actuellement en union	Femmes non en union sexuellement actives[1]	Ensemble des hommes	Hommes actuellement en union	Hommes non en union sexuellement actifs[1]
N'importe quelle méthode	93,5	95,7	98,5	93,6	98,2	98,2
Une méthode moderne	93,5	95,7	98,5	93,6	98,2	98,2
Stérilisation féminine	59,9	67,1	70,4	34,9	48,9	36,9
Stérilisation masculine	8,3	8,8	17,7	7,3	9,4	3,8
Pilule	86,7	91,3	90,8	74,1	86,5	78,7
DIU	50,1	59,6	62,1	23,2	31,4	17,2
Injectables	85,0	91,4	92,1	68,2	84,7	85,7
Implants	80,3	87,4	95,4	47,9	68,6	57,2
Condom masculin	80,2	80,5	95,7	92,2	96,5	98,2
Condom féminin	46,3	46,6	81,0	51,6	57,3	55,9
Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	52,8	57,4	66,1	22,5	33,4	15,4
Pilule du lendemain	22,3	20,5	43,5	27,8	29,7	21,8
Une méthode traditionnelle	57,9	61,4	76,5	49,6	59,0	48,1
Rythme	29,2	33,7	60,8	33,5	43,8	34,6
Retrait	26,5	31,8	32,4	27,8	29,7	21,8
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêté(e)s de 15-49 ans	7,0	7,5	9,2	5,6	6,8	5,8
Effectif d'enquêté(e)s	8 865	5 883	43	3 159	1 225	83
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-59 ans	na	na	na	5,7	6,8	5,7
Effectif d'enquêtés	na	na	na	3 527	1 574	84

na = Non applicable
[1] A eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours ayant précédé l'enquête

Tableau 7.8 Choix informé de la méthode

Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes, âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou sur des problèmes liés à cette méthode; pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires et pourcentage ayant été informé de l'existence d'autres méthodes, selon la méthode et la source initiale de la méthode, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes dont la dernière période d'utilisation a commencé au cours des cinq années ayant précédé l'enquête :			
Méthode/source	Pourcentage ayant été informé des effets secondaires ou des problèmes de la méthode utilisée	Pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires	Pourcentage ayant été informé par un agent de santé ou de planification familiale d'autres méthodes qui peuvent être utilisées	Effectif de femmes
Méthode				
Stérilisation féminine	*	*	*	26
Pilule	67,3	59,8	84,6	252
DIU	89,2	76,5	89,5	87
Injectables	79,9	73,5	90,7	480
Implants	82,8	77,4	85,9	436
Source initiale de la méthode[1]				
Secteur public	79,4	73,6	87,8	1 209
Hôpital du gouvernement	73,7	69,8	77,6	51
Centre de santé du gouvernement	78,5	67,6	87,1	265
Poste de santé du gouvernement	80,2	76,4	88,6	804
Clinique de PF	(66,2)	(60,0)	(82,9)	28
Case de santé	(83,5)	(78,9)	(84,5)	31
Stratégie avancée/équipe mobile	*	*	*	8
Autre public	*	*	*	22
Secteur médical privé	(66,0)	(44,9)	(75,5)	70
Hôpital/clinique privé	*	*	*	27
Pharmacie	*	*	*	40
Médecin privé	*	*	*	2
Autre privé	*	*	*	2
Autre secteur privé	*	*	*	1
Amis/parents	*	*	*	1
Manquant	*	*	*	1
Total	78,6	72,0	87,1	1 281

Note: Le tableau n'inclut que les utilisatrices de méthodes figurant sur la liste. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.
Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non applicable
[1] Source au moment où a commencé l'épisode d'utilisation de la méthode actuelle.

Tableau 7.9 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont commencé une période d'utilisation contraceptive au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage d'épisodes de discontinuation au cours des 12 mois selon la raison de discontinuation et par méthode spécifique, EDS-Continue, Sénégal 2016

Méthode	Échec de la méthode	Désir de tomber enceinte	Autres raisons liées à la fécondité[2]	Effets secondaires/ raisons liées à la santé	Souhaitait une méthode plus efficace	Autres raisons liées à la méthode[3]	Autres raisons	N'importe quelle raison	A changé de méthode[4]	Nombre d'épisodes d'utilisation
Pilule	2,2	11,6	12,0	5,8	4,9	1,6	8,2	46,2	0,0	697
Injectables	1,2	6,1	6,0	18,2	2,7	2,1	5,6	41,8	0,0	999
Implants	0,0	1,7	0,8	3,2	0,5	0,3	0,7	7,3	0,0	536
Autre	(7,0)	(7,5)	(1,9)	(5,9)	(8,9)	(0,7)	(14,9)	(46,7)	(0,0)	101
Toutes les méthodes[1]	2,1	6,3	6,0	9,6	3,4	1,3	5,1	33,6	0,0	2 653

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont commencé 3-62 mois avant l'enquête.
[1] Y compris la MAMA, le DIU et le condom.
[2] Inclut rapports sexuels peu fréquents/mari absent, difficultés de tomber enceinte/ménopause et dissolution de l'union/séparation.
[3] Inclut manque d'accès/éloignement, trop cher et utilisation peu pratique.
[4] Les raisons de discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total figurant dans cette colonne.
[5] Les épisodes d'utilisation compris dans cette colonne sont un sous-ensemble des épisodes de discontinuation compris dans le taux de discontinuation. On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente au cours du mois suivant la discontinuation ou si elle a déclaré, comme raison de discontinuation, qu'elle "voulait une méthode plus efficace" et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois après la discontinuation.
[6] Le nombre d'épisodes d'utilisation comprend les épisodes d'utilisation qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués pendant la période d'observation.
Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 7.10 Raisons de discontinuation

Répartition (en %) des discontinuations des méthodes contraceptives au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par raison principale de discontinuation déclarée, selon la méthode spécifique, EDS-Continue, Sénégal 2016

Raison de l'interruption	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée	Rythme	Retrait	Autre	Toutes les méthodes[1]
Est tombée enceinte pendant l'utilisation	10,8	(2,3)	3,0	0,5	*	(0,0)	(39,1)	*	28,8	7,8
Voulait tomber enceinte	35,5	(30,9)	31,0	29,3	*	(6,5)	(48,5)	*	46,2	32,9
Mari/partenaire désapprouvait	8,2	(10,2)	5,7	4,9	*	(19,3)	(8,5)	*	3,2	6,9
Voulait une méthode plus efficace	6,9	(6,9)	5,4	2,9	*	(15,4)	(2,6)	*	8,4	6,6
Problèmes de santé/effets secondaires	14,6	(17,7)	33,6	51,1	*	(22,5)	(0,0)	*	0,0	25,1
Problèmes d'accès/trop loin	0,6	(0,0)	1,2	0,0	*	(0,0)	(0,0)	*	0,0	0,7
Coûte trop cher	0,1	(0,0)	0,9	0,0	*	(2,1)	(0,0)	*	0,0	0,5
Pas pratique à utiliser	0,9	(1,5)	1,1	2,8	*	(0,0)	(0,0)	*	0,0	1,1
Cela dépend de Dieu/fataliste	0,1	(0,0)	0,1	0,0	*	(0,0)	(0,0)	*	0,0	0,1
Difficulté à tomber enceinte/ménopause	0,0	(0,0)	0,0	0,0	*	(0,0)	(0,0)	*	0,0	0,0
Rapports sexuels peu fréquents/mari absent	14,0	(21,1)	6,3	0,2	*	(3,1)	(0,0)	*	5,6	8,7
Dissolution de l'union/séparation	0,5	(0,0)	3,7	2,9	*	(0,0)	(0,0)	*	0,0	2,0
Autre	7,8	(9,5)	8,0	4,6	*	(31,2)	(1,4)	*	4,8	7,5
Ne sait pas	0,0	(0,0)	0,1	0,8	*	(0,0)	(0,0)	*	3,0	0,2
Manquant	0,0	(0,0)	0,0	0,0	*	(0,0)	(0,0)	*	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de discontinuations	607	51	715	161	27	27	55	11	43	1 697

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée.
Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 7.11 Connaissance de la période féconde

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par connaissance de la période féconde au cours du cycle menstruel selon l'utilisation actuelle de la méthode du rythme, EDS-Continue, Sénégal 2016

Connaissance de la période féconde	Utilisatrices de la méthode du rythme	Non utilisatrices de la méthode du rythme	Ensemble des femmes
Juste avant le début des règles	(0,0)	4,4	4,4
Durant les règles	(0,0)	2,0	2,0
Juste après la fin des règles	(56,4)	33,0	33,1
Au milieu du cycle/entre deux périodes de règles	(27,5)	14,1	14,2
Autre	(0,0)	0,1	0,1
Pas de moment spécifique	(16,1)	24,8	24,7
Ne sait pas	(0,0)	21,6	21,5
Manquant	(0,0)	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	48	8 817	8 865

Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 7.12 Besoins en matière de planification familiale de l'ensemble des femmes et de celles qui ne sont pas actuellement en union

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans qui ne sont pas actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage de celles dont les besoins sont satisfaits, pourcentage de demande totale en planification familiale et pourcentage en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale[1]					
Caractéristique sociodémographique	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pourcentage de demande satisfaite[2]	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes[3]	Effectif de femmes
						ENSEMBLE DES FEMMES						
Groupe d'âges												
15-19	6,6	0,2	6,8	2,1	0,0	2,2	8,8	0,2	9,0	24,0	20,8	1 998
20-24	15,2	0,2	15,5	13,5	0,1	13,7	28,8	0,4	29,1	46,9	43,7	1 664
25-29	18,4	0,9	19,3	19,4	0,9	20,3	37,8	1,8	39,6	51,3	48,9	1 524
30-34	14,9	2,8	17,7	24,0	5,1	29,1	38,9	7,9	46,8	62,2	56,8	1 318
35-39	12,9	8,6	21,5	15,7	12,6	28,2	28,5	21,2	49,7	56,8	51,6	998
40-44	6,3	16,2	22,4	7,8	20,5	28,3	14,0	36,7	50,7	55,8	52,0	806
45-49	2,3	17,8	20,1	1,3	19,9	21,2	3,6	37,8	41,4	51,4	45,6	557
Résidence												
Urbain	8,0	3,5	11,5	14,7	6,6	21,2	22,6	10,1	32,7	64,9	59,9	4 351
Rural	15,7	4,9	20,6	10,4	4,4	14,8	26,0	9,3	35,4	41,9	38,6	4 514
Grande Région												
Nord	15,7	4,7	20,3	10,0	4,5	14,5	25,7	9,2	34,9	41,6	40,6	1 537
Ouest	7,6	3,7	11,3	15,7	7,1	22,8	23,3	10,8	34,1	66,9	61,2	3 559
Centre	15,0	4,9	19,9	10,2	3,8	14,0	25,2	8,7	33,9	41,2	37,8	2 460
Sud	13,3	3,8	17,1	10,8	5,4	16,2	24,1	9,2	33,3	48,7	44,1	1 309
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	14,9	6,0	21,0	11,5	6,8	18,4	26,4	12,9	39,3	46,7	43,2	4 310
Primaire	11,9	3,6	15,5	18,3	6,0	24,3	30,1	9,6	39,8	61,0	56,8	1 967
Moyen/secondaire ou plus	6,9	1,6	8,5	9,7	2,8	12,5	16,5	4,4	21,0	59,5	53,8	2 588
Quintiles de bien-être économique												
Le plus pauvre	17,3	6,5	23,8	9,1	4,8	13,9	26,5	11,3	37,7	36,8	31,7	1 475
Second	16,5	4,0	20,5	10,5	5,3	15,8	27,0	9,3	36,2	43,5	41,0	1 603
Moyen	10,8	4,0	14,8	14,0	6,0	20,0	24,8	10,0	34,7	57,5	54,4	1 749
Quatrième	10,0	3,6	13,6	14,2	5,5	19,7	24,2	9,1	33,3	59,1	55,5	1 991
Le plus riche	7,1	3,6	10,7	13,5	5,7	19,2	20,6	9,3	29,9	64,2	58,0	2 046
Total	11,9	4,2	16,1	12,5	5,5	18,0	24,4	9,7	34,1	52,7	48,6	8 865
						FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES[4]						
Total	36,4	0,7	37,1	44,5	5,0	49,5	80,9	5,7	86,6	57,2	55,4	43

Note: Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits décrite dans Bradley et al. 2012.

[1] La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

[2] Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale

[3] Les méthodes modernes comprennent la stérilisation féminine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le collier et la méthode de l'Allaitement maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)

[4] A eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours ayant précédé l'enquête

Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 7.13 Utilisation future de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union qui n'utilisent pas actuellement de méthode, par nombre d'enfants vivants et selon l'intention d'utiliser une méthode dans l'avenir, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Nombre d'enfants vivants[1]					
Intention	0	1	2	3	4+	Total
A l'intention d'utitliser	19,9	30,8	29,9	36,6	32,5	30,7
Pas sûre	14,4	12,2	12,9	10,9	10,2	11,7
N'a pas l'intention d'utiliser	65,6	57,0	57,2	52,5	57,3	57,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	603	788	690	697	1 626	4 405

[1] Y compris la grossesse actuelle

Tableau 7.14 Exposition aux messages sur la planification familiale

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, au cours des derniers mois ayant précédé l'enquête, ont, soit entendu à la radio, soit vu à la télévision ou dans un journal ou un magazine, un message sur la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Femmes					Hommes				
	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Aucun des trois médias	Effectif	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Aucun des trois médias	Effectif
Groupe d'âges										
15-19	19,3	29,5	3,2	64,1	1 998	25,4	28,1	1,9	62,6	760
20-24	34,6	44,2	5,9	45,3	1 664	46,9	47,9	7,4	37,5	581
25-29	35,1	37,8	5,2	50,7	1 524	52,6	47,9	7,8	35,3	521
30-34	33,7	39,6	4,2	49,1	1 318	62,3	51,5	7,3	30,5	402
35-39	39,7	42,5	4,8	44,5	998	58,7	50,0	8,3	28,3	350
40-44	36,3	41,5	5,6	49,3	806	60,6	52,6	7,0	22,5	285
45-49	35,7	41,0	2,7	48,7	557	61,2	50,0	10,3	25,5	260
Résidence										
Urbain	36,6	53,5	7,9	39,5	4 351	50,6	57,3	7,6	30,9	1 696
Rural	27,4	23,9	1,4	63,1	4 514	45,8	29,5	5,2	48,2	1 464
Grande Région										
Nord	19,7	25,1	1,4	67,1	1 537	52,6	45,2	1,7	40,8	486
Ouest	39,0	56,0	7,2	35,9	3 559	49,1	59,3	4,8	29,0	1 405
Centre	29,4	30,1	2,8	58,6	2 460	41,7	27,4	4,1	51,0	725
Sud	31,7	22,2	4,5	62,3	1 309	51,5	28,1	18,3	46,8	543
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	28,5	26,6	0,2	60,6	4 310	42,8	25,8	0,7	52,0	1 149
Primaire	31,4	45,4	1,7	47,7	1 967	52,7	49,5	5,0	33,9	704
Moyen/secondaire ou plus	37,9	52,8	14,1	39,2	2 588	50,9	58,0	12,3	30,2	1 306
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	24,7	7,0	0,4	74,0	1 475	37,1	12,9	2,5	61,6	535
Second	27,5	19,1	1,4	66,4	1 603	47,4	24,7	7,3	48,2	581
Moyen	33,9	41,6	3,4	48,5	1 749	54,0	51,8	8,6	33,8	583
Quatrième	35,2	53,5	4,1	41,1	1 991	52,9	58,3	6,5	31,1	700
Le plus riche	35,6	59,0	11,5	36,3	2 046	48,5	63,2	6,9	27,0	759
Ensemble 15-49	31,9	38,5	4,6	51,5	8 865	48,4	44,4	6,5	38,9	3 159
50-59	na	na	na	na	na	58,1	45,8	10,4	29,6	368
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	49,4	44,6	6,9	38,0	3 527

na = Non applicable

Tableau 7.15 Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, pourcentage de celles qui, au cours des 12 derniers mois, ont reçu la visite d'un agent de terrain qui leur a parlé de planification familiale, pourcentage qui ont visité un établissement de santé et parlé de planification familiale, pourcentage qui ont visité un établissement de santé mais qui n'ont pas parlé de planification familiale et pourcentage qui n'ont ni discuté de planification familiale avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont reçu la visite d'un agent de terrain qui a parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes qui ont visité un établissement de santé au cours des 12 derniers mois et qui : Ont parlé de planification familiale	N'ont pas parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes qui n'ont parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé	Effectif de femmes
Groupe d'âges					
15-19	4,7	4,0	30,1	92,1	1 955
20-24	9,2	11,7	47,6	82,9	1 437
25-29	12,8	20,4	53,0	71,9	1 214
30-34	14,9	19,3	50,8	72,4	934
35-39	17,2	19,7	53,9	70,5	716
40-44	14,7	19,4	47,9	70,7	578
45-49	9,4	8,8	53,5	84,5	438
Résidence					
Urbain	8,8	13,4	45,3	81,7	3 428
Rural	12,1	13,2	45,2	78,6	3 845
Grande Région					
Nord	7,1	9,4	49,6	85,8	1 314
Ouest	9,3	16,2	45,0	79,1	2 746
Centre	11,9	12,4	47,2	79,4	2 116
Sud	15,1	12,2	36,4	77,0	1 096
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	12,2	13,9	49,1	78,2	3 519
Primaire	11,4	16,9	43,5	77,1	1 489
Moyen/secondaire ou plus	7,5	9,9	40,3	84,9	2 265
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	12,1	10,9	40,5	80,4	1 270
Second	13,8	14,5	42,9	76,6	1 350
Moyen	11,8	13,7	44,5	78,3	1 400
Quatrième	8,4	13,5	46,4	81,4	1 599
Le plus riche	7,7	13,4	50,2	82,9	1 654
Total	10,6	13,3	45,2	80,1	7 273

Tableau 7.16.1 Désir de limiter les naissances: Femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ne voulant plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique socio-économique	Nombre d'enfants vivants[1] 0	1	2	3	4	5	6+	Total
Résidence								
Urbain	0,2	1,3	5,0	20,7	27,5	45,1	67,9	21,4
Rural	0,1	1,2	3,8	3,9	16,6	25,4	59,1	18,3
Grande Région								
Nord	0,8	2,6	5,9	7,7	14,9	33,3	56,3	18,0
Ouest	0,0	1,2	4,7	21,0	27,4	39,9	64,9	21,8
Centre	0,0	1,1	3,9	4,0	18,9	29,4	62,0	18,4
Sud	0,0	0,3	2,4	6,0	19,4	24,2	62,4	18,7
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	0,3	1,4	3,7	6,6	17,9	29,0	59,9	21,5
Primaire	0,0	0,0	2,9	12,0	23,4	37,1	68,3	16,8
Moyen/secondaire ou plus	0,0	1,9	7,6	33,5	43,9	(54,7)	(78,9)	15,9
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	0,4	2,2	3,6	2,1	12,8	22,9	55,3	19,4
Second	0,0	0,1	1,4	3,7	10,9	23,9	59,9	18,0
Moyen	0,6	1,4	3,7	6,2	23,0	33,5	71,2	20,4
Quatrième	0,0	0,0	5,7	18,5	29,2	44,3	59,3	20,1
Le plus riche	0,0	2,5	6,3	23,5	29,7	(53,9)	71,4	20,1
Total	0,2	1,3	4,3	12,0	21,6	32,0	61,8	19,6

Note: Les femmes stérilisées sont considérées comme ne voulant plus d'enfant.
[1] Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle
Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

Tableau 7.16.2 Désir de limiter les naissances: Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, ne voulant plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique socio-économique	Nombre d'enfants vivants[1]							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Urbain	(0,0)	3,2	0,0	4,0	0,6	(0,0)	25,6	4,3
Rural	1,0	0,0	1,4	0,0	4,5	5,2	4,1	2,3
Grande Région								
Nord	(0,0)	(2,7)	(0,0)	(0,0)	(5,9)	(2,5)	4,1	2,1
Ouest	*	(2,8)	(0,0)	(5,2)	(0,0)	*	(31,0)	5,2
Centre	(2,4)	0,0	(0,0)	(0,0)	3,0	(0,0)	5,6	1,9
Sud	(0,0)	0,0	3,5	0,0	5,9	(0,0)	2,8	1,8
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	1,0	0,7	1,3	0,0	1,6	0,0	2,6	1,2
Primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(5,8)	(5,1)	(45,7)	6,8
Moyen/secondaire ou plus	*	(5,7)	(0,0)	(8,3)	(1,8)	*	*	4,7
Ensemble 15-49	0,5	1,8	0,7	2,5	2,5	3,3	11,8	3,3
50-59	*	*	*	*	(44,1)	(16,4)	19,1	20,5
Ensemble 15-59	0,5	1,7	1,1	4,6	11,6	5,7	15,6	7,1

Note: Les hommes stérilisés ou qui ont répondu, à la question sur le désir d'enfant, que leur épouse était stérilisée sont considérés comme ne voulant plus d'enfant.
[1] Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).
Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 7.17 Nombre idéal d'enfants par nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par nombre idéal d'enfants et nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes et des hommes et pour celles et ceux actuellement en union, selon le nombre d'enfants vivants, EDS-Continue, Sénégal 2016

Nombre idéal d'enfants	Nombre d'enfants vivants[1] 0	1	2	3	4	5	6+	Total
FEMME								
0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2	4,0	3,5	1,5	1,4	0,8	1,4	1,9	2,6
3	11,9	7,2	6,6	6,0	2,0	1,9	1,7	7,2
4	30,7	26,2	24,5	20,2	16,0	8,3	11,0	23,0
5	19,8	21,4	22,7	20,7	15,8	15,7	9,0	18,5
6+	18,7	28,7	27,0	31,2	45,0	43,1	45,2	29,6
Réponse non numérique	14,7	12,6	17,7	20,3	20,3	29,4	31,3	18,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	3 137	1 225	1 023	1 046	815	539	1 080	8 865
Nombre idéal moyen d'enfants pour:[2]								
Ensemble	4,7	5,1	5,2	5,3	5,9	6,1	6,2	5,2
Effectif	2 676	1 070	842	834	650	381	743	7 195
Actuellement en union	5,4	5,2	5,3	5,4	5,8	6,2	6,2	5,6
Effectif	514	891	760	772	624	365	723	4 648
Nombre idéal moyen d'enfants pour les hommes de 15-54[59] ans:[2]								
Ensemble	*	*	*	*	*	*	*	*
Effectif	0	0	0	0	0	0	0	0
Actuellement en union	*	*	*	*	*	*	*	*
Effectif	0	0	0	0	0	0	0	0
HOMME								
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
2	2,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
3	7,9	1,8	3,5	5,6	0,0	0,9	0,5	5,9
4	14,7	10,3	12,1	6,8	2,5	1,7	0,4	11,8
5	23,7	21,0	20,2	11,6	16,9	3,3	2,5	20,2
6+	36,5	50,0	46,2	59,5	60,7	61,7	56,7	43,0
Réponse non numérique	14,6	14,4	18,0	16,4	19,4	32,3	39,8	17,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	2 032	271	196	199	169	102	189	3 158
Nombre idéal moyen d'enfants pour:[2]								
Ensemble	6,1	7,0	7,8	8,8	8,2	10,1	12,2	6,9
Effectif	1 735	232	161	167	136	69	114	2 613
Actuellement en union	7,5	7,2	8,0	8,8	8,2	10,1	12,2	8,6
Effectif	129	194	151	163	136	69	114	955
Nombre idéal moyen d'enfants pour les hommes de 15-54[59] ans:[2]								
Ensemble	6,1	7,0	7,7	8,4	7,7	9,6	12,1	7,2
Effectif	1 747	246	178	195	172	84	262	2 884
Actuellement en union	7,5	7,2	7,8	8,4	7,7	9,7	12,1	8,8
Effectif	134	206	162	192	172	83	262	1 210

[1] Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle pour les femmes.
[2] Les moyennes sont calculées en excluant les femmes et les hommes ayant donné des réponses non numériques.
[3] Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte pour les hommes qui ont plusieurs épouses).
Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée

Tableau 7.18 Nombre idéal d'enfants par caractéristique sociodémographique

Nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-19	4,8	1 684
20-24	5,1	1 476
25-29	5,3	1 253
30-34	5,4	1 056
35-39	5,5	759
40-44	5,3	587
45-49	5,6	380
Résidence		
Urbain	4,7	3 671
Rural	5,7	3 523
Grande Région		
Nord	5,2	1 172
Ouest	4,8	2 979
Centre	5,6	1 982
Sud	5,6	1 062
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	5,9	3 213
Primaire	5,0	1 590
Moyen/secondaire ou plus	4,4	2 392
Quintiles de bien-être économique		
Le plus pauvre	6,2	1 139
Second	5,7	1 262
Moyen	5,1	1 401
Quatrième	4,8	1 649
Le plus riche	4,6	1 745
Total	5,2	7 195

[1] Effectif de femmes ayant donné une réponse numérique.

Tableau 7.19 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans survenues au cours des cinq années ayant précédé l'enquête (y compris les grossesses actuelles) par planification de la grossesse selon le rang de naissance et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, EDS-Continue, Sénégal 2016

Rang de naissance et âge de la mère à la naissance de l'enfant	Planification de la naissance					
	Voulue au moment	Voulue plus tard	Non désirée	Manquant	Total	Effectif de naissances
Rang de naissance						
1	89,9	9,1	0,6	0,4	100,0	1 561
2	83,0	15,5	1,4	0,0	100,0	1 301
3	80,9	17,8	1,2	0,0	100,0	1 155
4+	77,2	16,4	6,4	0,0	100,0	2 842
Age de la mère à la naissance de l'enfant						
<20	89,1	9,2	1,2	0,5	100,0	801
20-24	84,4	14,8	0,8	0,1	100,0	1 776
25-29	81,7	17,1	1,2	0,0	100,0	1 828
30-34	81,5	16,7	1,8	0,0	100,0	1 303
35-39	75,5	15,2	9,3	0,0	100,0	789
40-44	69,9	8,6	21,4	0,0	100,0	320
45-49	56,5	7,6	35,9	0,0	100,0	41
Total	81,8	14,8	3,3	0,1	100,0	6 859

Tableau 7.20 Taux de fécondité désirée

Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour les trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
Résidence		
Urbain	3,1	3,5
Rural	5,2	5,9
Grande Région		
Nord	4,4	5,0
Ouest	3,3	3,7
Centre	4,9	5,5
Sud	5,2	5,6
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	5,1	5,7
Primaire	3,9	4,4
Moyen/secondaire ou plus	3,1	3,3
Quintiles de bien-être économique		
Le plus pauvre	6,3	7,1
Second	5,4	6,2
Moyen	3,9	4,3
Quatrième	3,2	3,5
Le plus riche	3,0	3,4
Total	4,2	4,7

Note: L'ISFD et l'ISF sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois avant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au tableau 5.2.

SANTÉ DE LA MÈRE ET SANTÉ DE L'ENFANT 8

Tableau 8.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par type de prestataire vu durant la grossesse pour la naissance la plus récente, et pourcentage de naissances les plus récentes pour lesquelles la mère a consulté un professionnel de la santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Prestataire de soins prénatals: Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/ Accoucheuse traditionnelle	Pas de soins prénatals	Total	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire formé[1]	Effectif de femmes
Age de la mère à la naissance								
<20	0,4	78,1	17,7	1,0	2,7	100,0	96,2	458
20-34	3,2	79,2	14,0	0,9	2,7	100,0	96,4	2 974
35-49	5,2	76,8	11,9	1,4	4,8	100,0	93,9	806
Rang de naissance								
1	5,7	81,7	10,3	1,0	1,3	100,0	97,7	961
2-3	3,2	80,5	13,8	0,5	2,1	100,0	97,4	1 478
4-5	2,8	76,7	16,4	0,8	3,4	100,0	95,8	914
6+	1,2	74,3	16,0	2,0	6,6	100,0	91,4	886
Résidence								
Urbain	6,4	87,5	4,8	0,7	0,5	100,0	98,8	1 690
Rural	1,2	72,7	20,1	1,2	4,8	100,0	94,0	2 548
Grande Région								
Nord	0,5	66,9	25,8	0,4	6,4	100,0	93,2	760
Ouest	6,7	85,5	6,8	1,0	0,1	100,0	99,0	1 443
Centre	2,3	77,6	16,7	0,8	2,6	100,0	96,6	1 308
Sud	1,1	79,3	11,0	1,9	6,7	100,0	91,4	728
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	1,2	74,8	18,1	1,2	4,8	100,0	94,0	2 611
Primaire	2,2	88,5	8,1	0,5	0,7	100,0	98,8	954
Moyen/secondaire ou plus	12,9	79,4	6,7	0,7	0,3	100,0	99,0	673
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	0,5	67,6	21,2	1,3	9,4	100,0	89,3	951
Second	1,4	72,7	21,5	0,4	4,0	100,0	95,6	929
Moyen	1,0	82,1	14,6	1,8	0,4	100,0	97,7	828
Quatrième	3,7	87,2	7,7	1,2	0,2	100,0	98,6	831
Le plus élevé	11,6	87,3	1,0	0,0	0,1	100,0	99,9	699
Ensemble	3,3	78,6	14,0	1,0	3,1	100,0	95,9	4 238

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul le prestataire le plus qualifié est pris en compte dans ce tableau.
[1] Les médecins, les sages-femmes et les infirmières sont considérés comme des prestataires formés.

Tableau 8.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, selon le nombre de visites prénatales et selon le stade de la grossesse au moment de la première visite pour la naissance la plus récente; Parmi les femmes ayant effectué des visites prénatales, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, par milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2016

Visites prénatales	Résidence: Urbain	Résidence: Rural	Ensemble
Nombre de visites prénatales			
Aucune	0,5	4,8	3,1
1	1,8	5,7	4,1
2-3	27,0	43,1	36,7
4+	67,4	44,8	53,8
Ne sait pas/manquant	3,2	1,6	2,2
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de mois de grossesse à la première visite prénatale			
Aucune visite prénatale	0,5	4,8	3,1
<4	75,9	51,4	61,2
4-5	17,6	30,0	25,0
6-7	3,9	10,8	8,0
8+	0,8	1,4	1,1
Ne sait pas/manquant	1,2	1,7	1,5
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	1 690	2 548	4 238
Nombre médian de mois de grossesse à la première visite prénatale (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)	3,2	3,8	3,5
Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals	1 681	2 425	4 106

Tableau 8.3 Composants des visites prénatales

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris des suppléments de fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse la plus récente et, parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des cinq dernières années, pourcentage ayant effectué certains examens prénatals, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui, durant la grossesse la plus récente, ont pris :			Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des cinq dernières années, pourcentage qui :				
Caractéristique sociodémographique	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq dernières années	Ont été informées des signes de complication de la grossesse	Ont eu leur tension artérielle vérifiée	Ont eu un prélèvement d'urine	Ont eu un prélèvement de sang	Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente
Age de la mère à la naissance								
<20	93,4	26,7	458	52,9	97,9	89,6	84,6	446
20-34	95,3	34,0	2 974	48,6	99,4	90,8	84,3	2 892
35-49	93,0	33,6	806	47,3	99,2	91,2	83,2	768
Rang de naissance								
1	96,2	35,6	961	53,1	99,1	91,6	91,1	948
2-3	95,9	34,6	1 478	47,6	99,5	92,2	85,0	1 447
4-5	94,1	33,6	914	46,6	99,1	90,9	79,9	883
6+	91,5	27,6	886	48,6	98,9	87,1	79,4	827
Résidence								
Urbain	97,6	38,2	1 690	48,0	99,9	94,7	90,5	1 681
Rural	92,7	29,7	2 548	49,5	98,7	88,0	79,8	2 425
Grande Région								
Nord	90,0	16,4	760	32,2	97,6	88,9	67,2	711
Ouest	98,2	39,0	1 443	42,2	100,0	94,8	89,7	1 442
Centre	95,4	35,1	1 308	50,6	99,2	91,7	84,4	1 273
Sud	91,2	35,5	728	77,0	99,4	82,2	89,7	679
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	93,0	28,7	2 611	48,1	98,9	88,8	79,7	2 487
Primaire	97,2	38,8	954	49,6	99,5	93,6	88,9	948
Moyen/secondaire ou plus	97,7	42,1	673	50,6	99,9	94,0	93,8	672
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	88,3	24,2	951	52,5	98,6	81,7	76,2	861
Second	93,2	33,3	929	53,2	99,1	89,6	80,2	892
Moyen	98,3	35,5	828	46,7	99,0	92,5	86,0	824
Quatrième	97,5	33,9	831	47,4	99,5	95,0	86,2	830
Le plus élevé	97,6	41,5	699	43,1	100,0	96,3	94,5	699
Ensemble	94,7	33,1	4 238	48,8	99,2	90,7	84,2	4 106

Tableau 8.4 Vaccination antitétanique

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu, au moins, deux injections antitétaniques au cours de la grossesse pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la dernière grossesse	Pourcentage dont la dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal[1]	Effectif de mères
Age de la mère à la naissance			
<20	70,3	80,6	458
20-34	51,5	83,1	2 974
35-49	43,8	76,9	806
Rang de naissance			
1	85,0	85,7	961
2-3	45,6	84,3	1 478
4-5	40,0	79,1	914
6+	39,6	75,4	886
Résidence			
Urbain	59,4	83,3	1 690
Rural	47,3	80,5	2 548
Grande Région			
Nord	37,8	82,6	760
Ouest	57,2	78,7	1 443
Centre	50,8	84,8	1 308
Sud	59,2	80,7	728
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	46,0	79,3	2 611
Primaire	56,2	84,6	954
Moyen/secondaire ou plus	69,7	86,4	673
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	45,8	75,6	951
Second	49,1	81,4	929
Moyen	53,1	83,6	828
Quatrième	54,7	84,1	831
Le plus élevé	60,3	84,9	699
Ensemble	52,1	81,6	4 238

[1] Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de leur dernière naissance ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des cinq années ayant précédé la dernière naissance), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des dix années ayant précédé la dernière naissance), ou, au moins, cinq injections à n'importe quel moment avant la dernière naissance.

Tableau 8.5 Lieu de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par lieu de l'accouchement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Établissement de santé		Maison	Autre	Total	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé					
Âge de la mère à la naissance							
<20	73,9	4,2	21,9	0,0	100,0	78,1	719
20-34	71,7	3,8	24,4	0,0	100,0	75,6	4 337
35-49	71,2	4,4	24,2	0,2	100,0	75,6	1 017
Rang de naissance							
1	82,0	6,7	11,3	0,0	100,0	88,7	1 389
2-3	75,9	3,3	20,7	0,1	100,0	79,2	2 153
4-5	66,0	4,1	30,0	0,0	100,0	70,0	1 321
6+	59,7	2,0	38,3	0,0	100,0	61,7	1 211
Visites prénatales[1]							
Aucune	12,3	0,0	87,7	0,0	100,0	12,3	133
1-3	67,4	2,1	30,4	0,0	100,0	69,6	1 730
4+	81,7	6,4	11,8	0,1	100,0	88,1	2 281
Ne sait pas/manquant	84,7	8,7	6,6	0,0	100,0	93,4	94
Résidence							
Urbain	86,3	7,8	5,7	0,1	100,0	94,2	2 233
Rural	63,5	1,8	34,8	0,0	100,0	65,2	3 839
Grande Région							
Nord	61,3	1,1	37,6	0,0	100,0	62,4	1 112
Ouest	86,0	7,4	6,5	0,1	100,0	93,4	1 905
Centre	73,3	3,8	23,0	0,0	100,0	77,0	1 973
Sud	55,3	1,3	43,3	0,0	100,0	56,7	1 082
Niveau d'instruction de la mère							
Pas d'instruction	65,4	2,3	32,4	0,0	100,0	67,6	3 925
Primaire	83,0	5,5	11,5	0,0	100,0	88,5	1 315
Moyen/secondaire ou plus	85,0	9,8	4,9	0,3	100,0	94,8	833
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	43,6	0,6	55,8	0,0	100,0	44,2	1 537
Second	69,8	0,5	29,7	0,0	100,0	70,3	1 377
Moyen	87,1	2,9	10,0	0,0	100,0	90,0	1 137
Quatrième	90,1	5,1	4,6	0,2	100,0	95,2	1 107
Le plus élevé	81,6	15,0	3,4	0,0	100,0	96,6	915
Ensemble	71,9	4,0	24,1	0,0	100,0	75,9	6 073

[1] Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.6 Assistance durant l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par type d'assistance durant l'accouchement, pourcentage de naissances assistées par un prestataire formé et pourcentage de naissances ayant nécessité une césarienne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Personne ayant assisté l'accouchement : Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/ Accoucheuse traditionnelle	Parents/ Autre	Personne	Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire formé[1]	Pourcentage accouché par césarienne	Effectif de naissances
Age de la mère à la naissance										
<20	3,9	44,2	12,6	34,7	1,6	3,1	100,0	60,7	4,4	719
20-34	4,9	43,4	9,0	35,6	2,7	4,4	100,0	57,3	4,6	4 337
35-49	9,1	46,4	7,1	29,7	0,8	6,9	100,0	62,6	9,9	1 017
Rang de naissance										
1	8,8	52,0	10,5	26,2	1,3	1,2	100,0	71,3	8,6	1 389
2-3	5,5	47,6	8,7	32,6	2,3	3,3	100,0	61,8	5,5	2 153
4-5	4,1	39,0	9,3	38,8	3,4	5,4	100,0	52,3	3,7	1 321
6+	3,0	34,2	8,0	42,5	2,1	10,2	100,0	45,2	3,7	1 211
Visites prénatales[1]										
Aucune	0,4	7,8	2,1	53,6	4,0	32,2	100,0	10,2	0,4	133
1-3	2,6	38,1	10,2	41,2	3,0	5,0	100,0	50,9	3,6	1 730
4+	8,7	52,7	8,9	26,2	1,1	2,5	100,0	70,3	8,7	2 281
Ne sait pas/manquant	15,0	48,2	1,8	30,6	1,5	2,9	100,0	65,0	10,0	94
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	7,1	57,0	11,8	23,9	0,0	0,2	100,0	75,9	7,2	4 608
Ailleurs	0,3	3,3	0,5	67,9	9,2	18,8	100,0	4,1	0,0	1 465
Résidence										
Urbain	10,7	64,0	7,3	15,8	0,4	1,8	100,0	82,0	9,4	2 233
Rural	2,4	32,4	10,2	45,3	3,3	6,3	100,0	45,0	3,2	3 839
Grande Région										
Nord	2,8	31,1	12,6	43,3	5,2	5,1	100,0	46,5	3,9	1 112
Ouest	11,1	61,1	8,4	17,1	0,9	1,5	100,0	80,6	9,3	1 905
Centre	2,9	38,6	10,0	42,7	2,5	3,2	100,0	51,5	3,8	1 973
Sud	3,0	37,2	5,1	41,0	1,2	12,5	100,0	45,3	3,5	1 082
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	3,0	36,5	9,8	41,0	3,1	6,4	100,0	49,4	3,7	3 925
Primaire	6,8	57,1	6,9	26,5	0,8	1,9	100,0	70,8	6,5	1 315
Moyen/secondaire ou plus	15,0	58,8	9,1	16,1	0,4	0,7	100,0	82,8	12,5	833
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	1,8	20,6	7,2	54,3	5,2	11,0	100,0	29,5	2,3	1 537
Second	2,5	38,0	10,0	41,5	3,1	4,9	100,0	50,5	3,1	1 377
Moyen	4,9	47,2	13,7	30,9	0,7	2,6	100,0	65,7	5,8	1 137
Quatrième	7,4	59,2	10,1	21,9	0,4	1,0	100,0	76,7	8,0	1 107
Le plus élevé	14,6	70,1	4,2	10,2	0,2	0,6	100,0	88,9	11,1	915
Ensemble	5,5	44,0	9,1	34,5	2,3	4,7	100,0	58,6	5,5	6 073

Note : Si l'enquêtée a déclaré que plus d'une personne avait assisté l'accouchement, seule la personne la plus qualifiée est prise en compte dans ce tableau.
[1] Sont considérés comme prestataires formés, les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les sages-femmes/infirmières auxiliaires
[2] Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.7 Moment où les premiers soins postnatals ont été dispensés à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête, répartition(en %) par durée écoulée entre l'accouchement et les premiers soins postnatals dispensés à la mère pour la dernière naissance vivante et pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où la mère a reçu ses premiers soins postnatals									
Caractéristiques sociodémographiques	Moins de 4 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	7-41 jours	Ne sait pas/ Manquant	Pas de soins postnatals[1]	Total	Pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Effectif de femmes
Age de la mère à la naissance										
<20	71,7	4,2	1,7	1,0	3,8	1,8	15,8	100,0	77,6	293
20-34	65,9	6,7	2,6	1,1	3,7	4,4	15,7	100,0	75,1	1 676
35-49	66,3	5,9	2,2	0,7	2,1	5,1	17,6	100,0	74,4	348
Rang de naissance										
1	72,9	7,1	1,4	0,6	2,8	6,7	8,6	100,0	81,3	585
2-3	72,6	4,9	2,1	0,6	3,2	3,4	13,2	100,0	79,7	808
4-5	61,4	7,6	3,7	2,2	4,1	1,9	19,1	100,0	72,7	466
6+	53,6	6,2	2,8	1,1	4,2	4,7	27,4	100,0	62,7	457
Lieu de l'accouchement										
Établissement de santé	81,7	5,7	1,6	0,4	1,7	5,0	3,9	100,0	89,0	1 778
Ailleurs	17,1	8,0	4,9	2,9	9,4	1,5	56,1	100,0	30,0	538
Résidence										
Urbain	81,4	5,3	1,7	0,2	1,5	6,3	3,7	100,0	88,4	779
Rural	59,2	6,8	2,7	1,4	4,5	3,1	22,3	100,0	68,7	1 537
Grande Région										
Nord	54,9	3,2	2,4	0,9	6,5	0,3	31,8	100,0	60,6	431
Ouest	79,3	6,0	2,0	0,0	1,1	8,3	3,2	100,0	87,3	667
Centre	69,2	9,0	2,3	1,4	3,4	4,0	10,7	100,0	80,6	792
Sud	54,1	4,5	3,1	2,1	4,3	2,0	29,9	100,0	61,7	426
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	59,8	6,2	2,7	1,5	4,2	3,5	22,1	100,0	68,7	1 480
Primaire	79,6	4,3	2,1	0,3	2,1	4,6	7,0	100,0	86,0	470
Moyen/secondaire ou plus	77,8	9,1	1,6	0,1	2,2	6,3	2,9	100,0	88,5	367
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	45,1	5,5	2,9	2,9	7,0	2,0	34,6	100,0	53,5	602
Second	63,7	7,1	2,6	0,7	2,9	3,8	19,3	100,0	73,4	573
Moyen	74,3	5,8	2,5	0,3	3,6	5,4	8,1	100,0	82,5	400
Quatrième	79,6	6,5	1,9	0,3	1,5	5,9	4,4	100,0	88,0	372
Le plus élevé	85,3	6,4	1,7	0,0	0,5	5,2	0,9	100,0	93,4	369
Ensemble	66,7	6,3	2,4	1,0	3,5	4,2	16,0	100,0	75,3	2 316

[1] Y compris les femmes qui ont eu une visite postnatale après 41 jours.

Tableau 8.8 Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire ayant dispensé les premiers soins postnatals à la mère dans les deux jours après la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère : Médecin/ Sage-femme	Infirmière	Matrone/ Accoucheuse traditionnelle	Pas de soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Total	Effectif de femmes
Age de la mère à la naissance						
<20	48,8	13,6	16,3	21,3	100,0	293
20-34	52,4	8,8	14,6	24,1	100,0	1 676
35-49	55,4	6,9	12,6	25,1	100,0	348
Rang de naissance						
1	56,8	9,2	16,2	17,8	100,0	585
2-3	58,2	8,9	13,1	19,7	100,0	808
4-5	49,8	9,8	14,1	26,4	100,0	466
6+	39,2	8,7	15,4	36,8	100,0	457
Lieu d'accouchement						
Établissement de santé	63,3	10,0	16,7	10,0	100,0	1 778
Ailleurs	16,6	6,3	7,3	69,9	100,0	538
Résidence						
Urbain	70,6	4,0	14,1	11,4	100,0	779
Rural	43,2	11,7	14,8	30,3	100,0	1 537
Grande Région						
Nord	40,9	14,8	6,4	37,8	100,0	431
Ouest	64,9	5,1	17,8	12,2	100,0	667
Centre	50,4	11,1	19,8	18,6	100,0	792
Sud	48,2	6,0	7,7	38,1	100,0	426
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	43,9	10,2	15,4	30,4	100,0	1 480
Primaire	67,0	5,4	13,8	13,8	100,0	470
Moyen/secondaire ou plus	68,0	9,5	11,9	10,6	100,0	367
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	31,3	10,3	12,3	46,1	100,0	602
Second	46,6	12,8	15,8	24,8	100,0	573
Moyen	50,7	10,9	21,7	16,8	100,0	400
Quatrième	67,9	5,6	15,0	11,5	100,0	372
Le plus élevé	82,3	3,2	7,9	6,6	100,0	369
Ensemble	52,4	9,1	14,5	23,9	100,0	2 316

[1] Y compris les femmes qui ont eu une visite postnatale après 41 jours

Tableau 8.9 Moment où les premiers soins postnatals ont été dispensés au nouveau-né

Répartition en (%) des dernières naissances ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre l'accouchement et le moment où ont été donnés les premiers soins postnatals au nouveau-né et pourcentage de naissances ayant reçu des soins postnatals dans les deux jours qui ont suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où le nouveau-né a reçu ses premiers soins postnatals									
Caractéristique sociodémographique	Moins d'une heure	1-3 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	Ne sait pas/ manquant	Pas de soins post-natals[1]	Total	Pourcentage de naissances ayant reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Effectif de naissances
Age de la mère à la naissance										
<20	35,3	7,9	2,3	1,1	1,7	1,8	49,8	100,0	46,6	293
20-34	42,7	5,5	3,4	2,3	2,1	4,3	39,7	100,0	53,9	1 676
35-49	42,0	5,3	2,7	2,3	3,0	4,6	40,1	100,0	52,4	348
Rang de naissance										
1	47,2	6,6	2,0	1,0	3,4	6,0	33,8	100,0	56,8	585
2-3	46,5	6,2	3,6	1,7	1,2	4,1	36,8	100,0	58,0	808
4-5	35,9	5,4	3,5	3,3	2,9	2,2	46,8	100,0	48,0	466
6+	31,9	4,3	3,6	3,3	1,6	3,2	52,1	100,0	43,1	457
Lieu de l'accouchement										
Établissement de santé	52,7	5,3	2,3	1,7	2,2	4,8	31,1	100,0	61,9	1 778
Ailleurs	5,1	7,5	6,1	3,8	2,1	1,3	74,1	100,0	22,5	538
Résidence										
Urbain	60,4	5,5	2,2	1,4	2,6	6,1	21,7	100,0	69,6	779
Rural	32,1	5,9	3,7	2,6	2,0	2,9	50,9	100,0	44,2	1 537
Grande Région										
Nord	35,8	1,2	2,3	1,7	0,5	0,4	58,1	100,0	41,0	431
Ouest	68,3	8,2	2,9	1,7	1,4	9,2	8,2	100,0	81,2	667
Centre	37,9	6,4	4,8	2,7	3,0	3,4	41,9	100,0	51,7	792
Sud	12,7	5,5	1,6	2,4	3,5	0,7	73,7	100,0	22,2	426
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	33,9	6,2	3,3	2,3	1,8	3,3	49,2	100,0	45,7	1 480
Primaire	52,5	5,6	2,4	2,3	2,3	4,5	30,4	100,0	62,8	470
Moyen/secondaire ou plus	58,9	4,3	3,5	1,5	3,5	6,4	21,9	100,0	68,2	367
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	19,5	5,6	4,4	2,5	1,9	2,2	64,0	100,0	31,9	602
Second	34,4	4,6	4,0	2,9	2,7	2,5	48,7	100,0	46,0	573
Moyen	49,5	9,2	2,2	2,4	1,5	4,4	30,6	100,0	63,4	400
Quatrième	55,7	6,1	0,6	1,2	1,8	5,8	28,7	100,0	63,6	372
Le plus élevé	66,3	3,8	3,4	1,2	2,7	7,1	15,5	100,0	74,7	369
Ensemble	41,6	5,8	3,2	2,2	2,2	4,0	41,1	100,0	52,8	2 316

[1] Y compris les naissances qui ont eu une visite postnatale après 41 jours.

Tableau 8.10 Type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né

Répartition (en %) des dernières naissances survenues au cours des deux années ayant précédé l'enquête par type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né dans les deux premiers jours après la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né			Pas de soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Total	Effectif de naissances
	Médecin/ Sage-femme	Infirmière	Matrone/ Accoucheuse traditionnelle			
Age de la mère à la naissance						
<20	23,6	16,0	7,0	53,4	100,0	293
20-34	27,1	16,5	10,2	46,1	100,0	1 676
35-49	32,0	11,1	9,3	47,6	100,0	348
Rang de naissance						
1	30,5	17,7	8,7	43,2	100,0	585
2-3	31,6	16,4	10,0	42,0	100,0	808
4-5	23,1	15,5	9,5	52,0	100,0	466
6+	20,6	11,8	10,7	56,9	100,0	457
Lieu d'accouchement						
Établissement de santé	32,6	18,4	11,0	38,1	100,0	1 778
Ailleurs	10,4	6,6	5,5	77,5	100,0	538
Résidence						
Urbain	41,1	19,2	9,3	30,4	100,0	779
Rural	20,5	13,8	9,9	55,8	100,0	1 537
Grande Région						
Nord	23,8	11,4	5,8	59,0	100,0	431
Ouest	40,0	27,5	13,6	18,8	100,0	667
Centre	24,8	13,9	13,0	48,3	100,0	792
Sud	16,2	4,7	1,2	77,8	100,0	426
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	21,7	14,1	9,9	54,3	100,0	1 480
Primaire	38,3	14,0	10,5	37,2	100,0	470
Moyen/secondaire ou plus	36,5	23,8	7,9	31,8	100,0	367
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	17,4	9,2	5,3	68,1	100,0	602
Second	18,4	14,9	12,7	54,0	100,0	573
Moyen	29,2	18,8	15,4	36,6	100,0	400
Quatrième	39,0	13,8	10,7	36,4	100,0	372
Le plus élevé	44,1	25,8	4,8	25,3	100,0	369
Ensemble	27,4	15,7	9,7	47,2	100,0	2 316

Tableau 8.11 Vaccinations par sources d'information

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins, à n'importe quel moment avant l'enquête selon la source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage ayant été vaccinés avant l'âge de 12 mois, EDS-Continue, Sénégal 2016

Source d'information	BCG	Penta 1	Penta 2	Penta 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins[2]	Aucun vaccin	Fièvre Jaune	Tous les vaccins y compris la Fièvre Jaune	Effectif d'enfants
Vacciné à n'importe quel moment avant l'enquête														
Carnet de vaccination	72,4	73,7	72,8	69,8	52,8	73,7	72,5	69,1	64,2	61,2	0,0	65,5	61,1	853
Déclaration de la mère	21,6	21,1	20,6	19,6	15,9	20,9	20,4	11,6	16,4	8,6	3,3	16,5	8,6	290
Les deux sources	94,1	94,9	93,4	89,5	68,7	94,6	92,9	80,7	80,6	69,8	3,3	82,0	69,6	1 143
Vacciné avant l'âge de 12 mois[3]	92,3	93,7	91,8	87,6	68,2	93,5	91,3	79,2	70,8	61,4	170,9	72,1	60.5	1 143

[1] Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.
[2] BCG, rougeole, les trois doses de DTCoq et les trois doses de polio (non-compris la dose de polio donnée à la naissance).
[3] Pour les enfants dont l'information est basée sur la déclaration de la mère, on suppose que la proportion de vaccins effectués au cours de la première année est la même que celle des enfants dont l'information provient d'un carnet de vaccination.

Tableau 8.12 Vaccinations selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère) et pourcentage pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	BCG	Penta 1	Penta 2	Penta 3	Polio 0[1]	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins[2]	Aucun vaccin	Fièvre Jaune	Tous les vaccins y compris la Fièvre Jaune	Pourcentage avec un carnet de vaccination présenté à l'enquêtrice	Effectif d'enfants
Sexe															
Masculin	94,4	95,3	93,7	88,8	67,5	94,8	93,0	79,5	82,4	71,6	3,4	83,9	71,4	75,8	578
Féminin	93,7	94,4	93,1	90,2	69,9	94,5	92,8	82,0	78,7	67,9	3,2	80,1	67,8	73,4	565
Rang de naissance															
1	94,4	95,8	94,7	92,0	74,3	95,7	94,5	85,3	81,0	73,5	3,6	83,9	73,2	81,3	297
2-3	97,0	95,4	94,1	90,9	72,0	96,3	94,5	81,6	83,7	71,2	1,5	84,5	71,1	73,4	377
4-5	92,7	94,2	91,9	86,9	67,8	92,7	90,8	76,7	77,1	66,3	4,1	77,9	66,1	70,4	243
6+	90,2	93,3	92,3	86,5	56,4	92,6	90,3	77,3	78,5	66,3	5,1	79,7	66,3	72,4	226
Résidence															
Urbain	97,5	96,4	95,7	94,0	83,9	96,5	95,5	86,1	85,1	77,0	2,1	86,2	76,8	79,3	368
Rural	92,4	94,1	92,3	87,3	61,4	93,7	91,6	78,1	78,4	66,4	3,9	80,0	66,2	72,4	774
Grande Région															
Nord	90,1	90,4	87,5	81,0	66,8	90,1	87,8	75,1	69,7	59,5	5,3	72,4	59,5	73,6	228
Ouest	99,0	97,6	97,6	96,8	88,0	97,6	97,6	87,1	90,6	81,2	1,0	90,8	81,2	80,7	323
Centre	97,0	98,0	97,3	94,2	67,1	97,1	96,0	84,7	84,3	73,8	1,7	87,1	73,6	75,1	383
Sud	85,3	89,7	86,4	78,7	43,6	90,4	85,3	69,5	69,9	56,1	7,6	69,4	55,6	65,5	208
Niveau d'instruction de la mère															
Pas d'instruction	92,0	92,6	90,7	85,4	63,7	92,3	90,6	76,1	75,2	63,4	4,7	76,7	63,2	71,9	744
Primaire	97,4	98,9	98,1	96,7	73,8	98,9	97,1	89,7	87,1	78,5	0,7	88,5	78,2	79,4	244
Moyen/secondaire ou plus	98,6	99,3	99,1	97,4	84,4	99,3	97,2	88,7	96,1	87,0	0,7	97,3	87,0	80,2	155
Quintiles de bien-être économique															
Le plus bas	87,3	90,1	87,3	78,9	51,6	90,1	87,1	71,3	72,0	58,8	6,1	72,6	58,8	68,5	302
Second	93,2	94,3	92,1	88,2	59,1	93,8	91,7	81,9	78,9	69,2	4,7	80,5	68,9	73,5	287
Moyen	96,7	96,9	96,9	94,3	74,8	97,1	96,3	81,6	84,5	72,9	2,9	87,2	72,9	73,6	199
Quatrième	98,5	96,2	95,4	94,0	82,7	96,2	94,1	82,8	83,6	72,1	0,0	84,0	71,6	83,5	166
Le plus élevé	99,4	100,0	100,0	99,0	91,6	99,1	99,1	91,1	89,9	82,9	0,0	92,2	82,9	79,5	189
Ensemble	94,1	94,9	93,4	89,5	68,7	94,6	92,9	80,7	80,6	69,8	3,3	82,0	69,6	74,6	1 143

[1] Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.
[2] BCG, rougeole, les trois doses de DTCoq et les trois doses de polio (non compris la dose de polio donnée à la naissance).

Tableau 8.13 Prévalence et traitement des symptômes d'Infection Respiratoire Aiguë (IRA)

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont présenté des symptômes d'Infection Respiratoire Aiguë au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ; Parmi ces enfants, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé et pourcentage qui ont reçu des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans : Pourcentage avec des symptômes d'IRA[1]	Effectif d'enfants	Parmi les enfants de moins de cinq ans avec des symptômes d'IRA : Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé[2]	Pourcentage ayant pris des antibiotiques	Effectif d'enfants
Age en mois					
<6	1,7	560	*	*	10
6-11	3,8	609	(67,4)	(69,8)	23
12-23	4,6	1 143	46,0	22,9	53
24-35	3,7	1 180	(50,9)	(36,4)	44
36-47	2,7	1 188	(33,0)	(28,5)	32
48-59	2,4	1 150	(51,7)	(36,5)	28
Sexe					
Masculin	3,9	2 972	47,9	38,0	115
Féminin	2,6	2 857	48,3	29,0	75
Combustible pour cuisiner					
Électricité ou gaz	3,6	1 223	*	*	45
Charbon de bois	2,5	928	*	*	24
Bois/paille[3]	3,4	3 519	47,2	33,2	118
Bouse	1,9	132	*	*	2
Autre combustible	*	26	*	*	1
Résidence					
Urbain	3,6	2 175	49,7	35,9	78
Rural	3,1	3 654	46,9	33,5	112
Grande Région					
Nord	2,1	1 058	*	*	23
Ouest	3,7	1 868	(47,0)	(29,2)	70
Centre	3,1	1 885	57,3	46,7	59
Sud	3,8	1 018	51,0	33,8	39
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	3,0	3 747	46,8	34,0	113
Primaire	3,9	1 268	(39,5)	(38,0)	49
Moyen/secondaire ou plus	3,4	814	*	*	28
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	3,4	1 440	41,8	29,1	49
Second	3,5	1 316	48,6	31,8	46
Moyen	3,1	1 101	(39,0)	(25,0)	34
Quatrième	3,4	1 072	*	*	36
Le plus élevé	2,7	900	*	*	24
Ensemble	3,3	5 829	48,1	34,5	190

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Les symptômes d'IRA (toux accompagnée d'une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou à des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine) sont considérés comme une mesure indirecte de la pneumonie.

[2] Non compris les pharmacies, les boutiques et les praticiens traditionnels.

[3] Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Tableau 8.14 Prévalence et traitement de la fièvre

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ; Parmi ces enfants, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé, pourcentage qui ont pris des antipaludiques et pourcentage qui ont pris des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans : Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre : Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé[1]	Pourcentage ayant pris des antipaludiques	Pourcentage ayant pris des antibiotiques	Effectif d'enfants
Age en mois						
<6	8,9	560	40,9	0,0	20,8	50
6-11	19,8	609	48,2	1,8	21,4	121
12-23	17,2	1 143	42,9	5,2	20,8	196
24-35	14,1	1 180	44,7	6,1	28,1	167
36-47	9,2	1 188	35,2	7,3	25,4	109
48-59	8,4	1 150	41,7	6,7	30,4	97
Sexe						
Masculin	13,9	2 972	43,8	3,3	25,6	414
Féminin	11,4	2 857	41,4	7,2	23,1	326
Résidence						
Urbain	11,7	2 175	41,2	7,9	30,4	255
Rural	13,3	3 654	43,5	3,5	21,4	485
Grande Région						
Nord	10,7	1 058	29,8	2,0	19,7	113
Ouest	9,7	1 868	39,9	12,3	23,0	181
Centre	13,8	1 885	45,5	2,2	26,5	260
Sud	18,2	1 018	49,5	3,6	26,0	186
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	12,3	3 747	39,8	2,9	21,4	461
Primaire	12,2	1 268	41,8	4,9	28,4	154
Moyen/secondaire ou plus	15,2	814	54,9	12,9	31,1	124
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	14,7	1 440	41,9	2,8	23,2	212
Second	14,7	1 316	47,8	3,7	22,4	193
Moyen	11,4	1 101	37,4	3,3	22,6	126
Quatrième	10,7	1 072	37,4	5,7	29,4	115
Le plus élevé	10,4	900	47,9	14,1	28,3	93
Ensemble	12,7	5 829	42,7	5,0	24,5	740

[1] Non compris les pharmacies, les boutiques et les praticiens traditionnels.

Tableau 8.15 Prévalence de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview :		
Caractéristique sociodémographique	Toute diarrhée	Diarrhée avec sang	Effectif d'enfants
Age en mois			
<6	18,1	0,4	560
6-11	24,1	1,9	609
12-23	23,1	3,4	1 143
24-35	16,1	2,7	1 180
36-47	9,3	1,8	1 188
48-59	7,0	0,7	1 150
Sexe			
Masculin	15,3	1,8	2 972
Féminin	15,3	2,1	2 857
Provenance de l'eau de consommation[1]			
Source améliorée	14,8	1,7	4 577
Non améliorée	17,3	3,0	1 252
Type d'installation sanitaire[2]			
Améliorée, non partagée	14,0	1,4	2 705
Partagée[3]	14,1	1,8	770
Non améliorée	17,3	2,6	2 354
Résidence			
Urbain	14,8	1,8	2 175
Rural	15,6	2,0	3 654
Grande Région			
Nord	10,5	0,6	1 058
Ouest	12,9	1,4	1 868
Centre	16,9	2,0	1 885
Sud	22,0	4,3	1 018
Niveau d'instruction de la mère			
Pas d'instruction	14,8	2,0	3 747
Primaire	15,5	2,3	1 268
Moyen/secondaire ou plus	17,7	1,3	814
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	16,9	3,0	1 440
Second	17,9	2,3	1 316
Moyen	13,1	1,6	1 101
Quatrième	14,6	1,6	1 072
Le plus élevé	12,6	0,5	900
Ensemble	15,3	1,9	5 829

[1] Se reporter au Tableau 2.1 pour la définition des catégories
[2] Se reporter au Tableau 2.2 pour la définition des catégories
[3] Types d'installations sanitaires qui seraient considérées comme « améliorées » si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus

Tableau 8.16 Traitement de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ; Pourcentage à qui on a donné une Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO), pourcentage à qui on a donné davantage de liquides, pourcentage à qui on a donné une TRO ou davantage de liquides et pourcentage d'enfants à qui on a administré d'autres traitements, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants ayant eu la diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé[1]	Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO)					Autres traitements :					
		Liquide de sachets SRO ou liquide SRO préconditionné	Solution Maison Recommandée (SMR)	Soit SRO ou SMR	Liquides augmentés	TRO ou liquides augmentés	Anti-biotique	Médicaments antimotilité	Suppléments de zinc	Remède maison/ Autre	Aucun traitement	Effectif d'enfants avec la diarrhée
Age en mois												
<6	23,9	9,4	1,9	11,2	16,9	26,4	5,0	4,0	2,4	6,8	66,1	101
6-11	35,9	12,7	0,9	13,1	47,7	52,0	17,3	0,0	3,3	20,2	29,8	147
12-23	42,1	23,1	1,4	23,9	63,5	71,2	14,5	1,5	9,0	28,7	16,6	264
24-35	31,9	25,1	1,4	26,1	73,7	78,3	13,1	0,9	9,4	17,0	16,5	190
36-47	39,4	27,3	3,3	29,8	58,3	68,2	9,0	2,0	9,5	22,6	24,5	111
48-59	30,2	20,3	0,0	20,3	67,1	77,3	6,5	0,0	1,5	34,4	20,0	81
Sexe												
Masculin	36,4	22,0	1,5	23,3	56,4	63,8	11,6	1,1	7,8	21,8	27,2	455
Féminin	34,4	18,9	1,4	19,8	58,5	65,5	12,7	1,6	5,8	22,4	24,1	438
Type de diarrhée[2]												
Pas de présence de sang	33,7	19,4	1,7	20,6	56,4	63,7	12,1	1,5	6,4	22,0	26,1	777
Présence de sang	48,2	29,0	0,0	29,0	65,9	72,6	12,8	0,0	9,8	23,3	21,3	113
Résidence												
Urbain	29,7	18,4	1,0	19,2	50,8	58,8	9,9	0,7	8,1	19,1	31,0	322
Rural	38,7	21,7	1,7	22,9	61,2	67,9	13,5	1,7	6,0	23,8	22,6	571
Grande Région												
Nord	27,2	13,1	0,8	13,1	48,8	53,9	16,0	0,8	4,3	15,8	30,9	111
Ouest	25,7	17,7	0,8	18,5	52,0	60,2	8,2	3,7	10,6	15,7	32,7	241
Centre	38,5	22,5	1,9	23,7	60,9	68,1	14,1	0,7	5,3	25,8	23,0	318
Sud	45,6	24,3	1,9	26,0	62,6	69,8	11,9	0,0	6,1	26,9	19,1	224
Niveau d'instruction de la mère												
Pas d'instruction	36,5	20,8	1,3	21,6	57,8	65,8	11,1	1,9	6,7	23,7	24,6	553
Primaire	33,1	23,8	0,6	24,4	59,8	65,8	13,7	0,0	9,4	17,2	25,8	197
Moyen/secondaire ou plus	34,3	14,7	3,3	17,6	53,0	58,7	14,2	0,9	3,5	22,8	29,6	144
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	40,2	23,2	1,1	24,0	63,2	69,8	13,3	0,0	6,0	22,7	20,6	244
Second	38,9	19,9	2,3	21,3	60,7	68,4	12,1	2,1	5,6	26,4	21,8	236
Moyen	37,3	26,7	1,9	28,0	58,9	66,0	7,5	4,8	12,1	23,8	24,4	144
Quatrième	25,9	10,3	0,3	10,6	54,8	57,6	15,8	0,0	5,0	14,2	30,8	156
Le plus élevé	28,8	22,2	1,5	23,7	40,2	53,9	10,8	0,0	6,5	20,5	39,0	114
Ensemble	35,4	20,5	1,5	21,6	57,5	64,6	12,2	1,3	6,8	22,1	25,7	893

Note : La TRO comprend le liquide préparé à partir des sachets de Sels de Réhydratation Orale (SRO), le liquide et les Solutions Maison Recommandées (SMR).
[1] Non compris les pharmacies, les boutiques et les guérisseurs traditionnels.
[2] Y compris 3 cas pour lesquels l'information sur le type de diarrhée est manquante.

Tableau 8.17 Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en %) des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, pourcentage d'enfants à qui on a donné davantage de liquides et qui ont continué à s'alimenter pendant l'épisode diarrhéique et pourcentage d'enfants qui ont continué à s'alimenter et qui ont été traités au moyen d'une TRO et/ou à qui on a donné davantage de liquides durant les épisodes diarrhéiques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2016

	Quantité de liquides donnée							Quantité de nourriture donnée									
Caractéristique sociodémographique	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/ manquant	Total	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne mange pas encore	Total	Pourcentage à qui on a donné davantage de liquides et qui ont continué à s'alimenter[1]	Pourcentage qui ont continué à s'alimenter et qui ont été traités avec une TRO et/ou à qui on a donné davantage de liquides[1]	Effectif d'enfants avec la diarrhée
Age en mois																	
<6	16,9	40,1	2,2	1,1	39,1	0,7	100,0	0,0	6,0	3,0	1,1	0,6	89,3	100,0	3,7	3,7	101
6-11	47,7	44,3	5,8	0,6	1,6	0,0	100,0	6,1	39,4	26,3	4,9	5,9	17,4	100,0	36,2	39,9	147
12-23	63,5	20,3	9,6	6,7	0,0	0,0	100,0	2,9	35,0	37,7	17,6	5,8	1,1	100,0	46,9	53,5	264
24-35	73,7	17,2	4,9	4,2	0,0	0,0	100,0	3,8	56,0	32,3	6,1	1,9	0,0	100,0	66,8	71,2	190
36-47	58,3	24,2	17,4	0,0	0,0	0,0	100,0	10,8	38,7	37,1	8,4	5,0	0,0	100,0	50,8	55,7	111
48-59	67,1	29,8	0,7	2,4	0,0	0,0	100,0	2,3	54,1	33,5	7,8	2,3	0,0	100,0	59,6	69,8	81
Sexe																	
Masculin	56,4	29,8	7,2	2,5	3,9	0,2	100,0	5,3	39,9	28,5	9,2	2,9	14,3	100,0	44,9	50,4	455
Féminin	58,5	24,4	7,4	4,1	5,5	0,0	100,0	3,1	38,2	32,1	9,1	5,1	12,3	100,0	47,3	51,8	438
Type de diarrhée																	
Pas de présence de sang	56,4	28,8	7,1	2,5	5,2	0,1	100,0	4,1	39,2	28,9	8,6	4,3	14,8	100,0	44,7	49,5	777
Présence de sang	65,9	14,4	8,9	9,2	1,5	0,0	100,0	5,0	36,5	40,6	13,0	1,6	3,2	100,0	56,5	62,6	113
Manquant	*	*	*	*	*	*	100,0	*	*	*	*	*	*	100,0	*	*	3
Résidence																	
Urbain	50,8	25,8	7,7	6,3	9,1	0,2	100,0	3,2	38,6	28,6	7,9	5,6	16,1	100,0	43,7	48,7	322
Rural	61,2	27,9	7,0	1,6	2,2	0,0	100,0	4,8	39,3	31,2	9,9	3,1	11,7	100,0	47,5	52,5	571
Grande Région																	
Nord	48,8	31,1	13,5	0,0	6,0	0,6	100,0	7,7	34,3	23,0	9,3	5,5	20,2	100,0	31,1	35,3	111
Ouest	52,0	21,7	8,0	7,6	10,7	0,0	100,0	2,5	36,1	29,3	8,7	5,8	17,6	100,0	46,8	51,1	241
Centre	60,9	29,2	6,6	2,2	1,1	0,0	100,0	4,7	39,4	36,0	7,5	2,3	10,0	100,0	50,1	55,7	318
Sud	62,6	28,3	4,4	1,9	2,8	0,0	100,0	3,6	44,1	26,9	12,0	3,5	9,9	100,0	47,2	52,4	224
Niveau d'instruction de la mère																	
Pas d'instruction	57,8	29,8	8,3	2,1	1,9	0,1	100,0	3,8	40,8	30,5	8,5	5,2	11,3	100,0	45,8	51,1	553
Primaire	59,8	22,7	5,2	6,6	5,8	0,0	100,0	7,2	41,0	30,7	10,2	1,1	9,8	100,0	50,7	55,7	197
Moyen/secondaire ou plus	53,0	23,1	6,2	3,5	14,1	0,0	100,0	1,9	29,9	28,8	10,4	3,1	26,0	100,0	41,0	44,7	144
Quintiles de bien-être économique																	
Le plus bas	63,2	24,7	7,5	2,6	2,1	0,0	100,0	5,4	39,1	27,5	13,0	3,9	11,0	100,0	46,8	52,0	244
Second	60,7	28,3	7,7	0,9	2,3	0,0	100,0	3,7	42,1	33,4	7,9	2,1	10,9	100,0	48,5	53,7	236
Moyen	58,9	25,9	3,6	5,4	5,8	0,5	100,0	3,1	34,5	33,8	9,4	4,4	14,8	100,0	47,6	51,2	144
Quatrième	54,8	24,1	8,9	8,6	3,6	0,0	100,0	7,3	42,3	33,7	2,5	3,3	11,0	100,0	51,8	54,2	156
Le plus élevé	40,2	36,0	8,5	0,0	15,4	0,0	100,0	0,0	34,2	20,7	12,3	8,4	24,4	100,0	29,9	39,5	114
Ensemble	57,5	27,2	7,3	3,3	4,7	0,1	100,0	4,2	39,1	30,3	9,2	4,0	13,3	100,0	46,1	51,1	893

Note: Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] C'est-à-dire les enfants dont les quantités de nourriture ont été augmentées, ceux pour qui elles sont restées identiques ou ceux qui en ont reçu un peu moins pendant les épisodes diarrhéiques.

SANTÉ DE LA MÈRE ET SANTÉ DE L'ENFANT (PART 2) 8

Tableau 8.18 Poids et taille de l'enfant à la naissance

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête et dont le poids à la naissance a été déclaré; Répartition (en %)de toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par grosseur de l'enfant à la naissance estimée par la mère et pourcentage de toutes les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Répartition (en %) de toutes les naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance					Pourcentage de toutes les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré[1]		Des naissances dont le poids à la naissance a été déclaré[1]	
Caractéristique sociodémographique	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas/ manquant	Total		Effectif de naissances	Pourcentage avec moins de 2,5 kg	Effectif d'enfants
Age de la mère à la naissance									
<20	18,3	13,1	68,4	0,2	100,0	49,1	719	13,6	353
20-34	15,6	17,9	66,3	0,2	100,0	54,1	4 337	11,4	2 347
35-49	12,8	18,1	68,5	0,6	100,0	52,5	1 017	11,4	533
Rang de naissance									
1	17,6	21,9	60,4	0,1	100,0	62,1	1 389	17,6	863
2-3	14,1	16,0	69,4	0,5	100,0	58,3	2 153	8,9	1 254
4-5	15,5	17,2	67,1	0,1	100,0	47,7	1 321	10,4	630
6+	15,3	14,8	69,7	0,1	100,0	40,3	1 211	9,5	488
Résidence									
Urbain	10,9	21,5	67,2	0,3	100,0	71,8	2 233	11,3	1 603
Rural	18,1	15,0	66,7	0,2	100,0	42,5	3 839	11,9	1 631
Grande Région									
Nord	26,0	12,5	61,2	0,2	100,0	37,7	1 112	12,6	420
Ouest	6,0	28,3	65,4	0,3	100,0	74,2	1 905	10,9	1 413
Centre	19,5	15,3	65,1	0,2	100,0	48,8	1 973	11,9	962
Sud	14,0	7,0	78,7	0,3	100,0	40,6	1 082	12,4	439
Niveau d'instruction de la mère									
Pas d'instruction	17,9	15,3	66,7	0,1	100,0	43,3	3 925	11,8	1 699
Primaire	11,7	19,8	68,3	0,2	100,0	65,4	1 315	10,9	859
Moyen/secondaire ou plus	10,2	23,3	65,7	0,7	100,0	81,1	833	12,1	676
Quintiles de bienêtre économique									
Le plus pauvre	20,7	11,7	67,2	0,4	100,0	25,5	1 537	12,4	392
Second	16,2	14,4	69,4	0,0	100,0	45,9	1 377	12,3	632
Moyen	14,3	20,8	64,8	0,2	100,0	60,1	1 137	11,7	683
Quatrième	12,9	20,6	66,3	0,2	100,0	69,4	1 107	9,7	768
Le plus riche	10,2	23,3	66,0	0,5	100,0	82,9	915	12,4	759
Total	15,5	17,4	66,9	0,2	100,0	53,3	6 073	11,6	3 234

[1] Basé sur, soit un enregistrement écrit, soit la déclaration de la mère.

Tableau 8.19 Vaccinations au cours de la première année

Pourcentage d'enfants âgés de 12-59 mois au moment de l'enquête qui ont reçu certains vaccins avant l'âge de 12 mois et pourcentage de ceux pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon l'âge actuel de l'enfant, EDS-Continue, Sénégal 2016

Age en mois	BCG	Penta 1	Penta 2	Penta 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins[2]	Aucun vaccin	Fièvre Jaune	Tous les vaccins y compris le Fièvre Jaune	Pourcentage avec un carnet de vaccination présenté à l'enquêtrice	Effectif d'enfants
12-23	92,3	93,7	91,8	87,6	68,2	93,5	91,3	79,2	70,8	61,4	170,9	72,1	58,1	74,6	1 143
24-35	94,2	94,2	90,6	85,3	68,4	94,5	90,4	74,5	72,6	58,3	9,9	73,8	54,4	60,5	1 180
36-47	93,8	93,9	91,7	86,1	65,0	94,1	91,4	69,6	68,3	52,1	-	70,3	48,9	47,6	1 188
48-59	92,9	92,5	89,6	84,8	64,3	92,9	91,2	70,7	65,0	49,9	15,3	68,0	45,4	44,9	1 150
Total	93,3	93,6	91,0	86,2	66,5	93,8	91,1	73,6	69,9	55,9	27,4	71,7	51,9	56,8	4 661

Note: L'information provient du carnet de vaccination ou, s'il n' y a pas de carnet, elle provient de la déclaration de la mère. Pour les enfants dont l'information est basée sur la déclaration de la mère, on suppose que la proportion de vaccinations reçues durant la première année est la même que celle observée pour les enfants pour lesquels on dispose d'un carnet de vaccination.

[1] Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

[2] BCG, rougeole, les trois doses de DTCoq et les trois doses de polio (non-compris la dose de polio donnée à la naissance).

Tableau 8.20 Connaissance des sachets de SRO ou des liquides préconditionnés,

Pourcentage de mères de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des cinq années ayant précédé l'enquête et qui connaissent les sachets de SRO et les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO et les liquides préconditionnés	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-19	46,3	246
20-24	58,9	796
25-34	72,6	2 029
35-49	77,7	1 167
Résidence		
Urbain	69,9	1 690
Rural	69,8	2 548
Grande Région		
Nord	59,3	760
Ouest	70,8	1 443
Centre	72,1	1 308
Sud	75,1	728
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	67,8	2 611
Primaire	73,5	954
Moyen/secondaire ou plus	72,8	673
Quintiles de bienêtre économique		
Le plus pauvre	65,7	951
Second	69,0	929
Moyen	75,6	828
Quatrième	67,7	831
Le plus riche	72,6	699
Total	69,9	4 238

SRO = Sels de Réhydratation Orale.

Tableau 8.21 Évacuation des selles des enfants

Répartition (en %) des enfants de moins de trois ans les plus jeunes, vivant avec la mère par moyens d'évacuation des dernières selles des enfants, et pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Moyens pour se débarrasser des selles des enfants									
Caractéristique sociodémographique	Enfant utilise les toilettes ou latrines	Jetées/ rinsées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/ rinsées dans égouts/ caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre	Total	Pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique[1]	Effectif d'enfants
Age en mois										
<6	0,6	56,0	0,6	0,9	29,5	1,2	11,2	100,0	57,2	545
6-11	0,9	68,2	0,1	2,2	22,5	1,3	4,9	100,0	69,1	596
12-23	0,4	72,2	0,5	0,6	23,6	0,9	1,7	100,0	73,2	1 095
24-35	0,8	78,2	0,2	2,4	16,1	2,4	0,0	100,0	79,2	829
Installation sanitaire										
Améliorée, non partagée	0,4	84,6	0,0	1,6	9,3	0,0	4,1	100,0	85,0	1 439
Partagée[2]	1,6	83,6	0,0	1,3	5,9	0,6	6,9	100,0	85,3	372
Non améliorée ou partagée[3]	0,6	49,7	0,8	1,3	42,3	3,3	1,9	100,0	51,1	1 255
Résidence										
Urbain	0,8	81,9	0,1	2,4	8,1	0,0	6,7	100,0	82,7	1 107
Rural	0,6	63,6	0,5	0,9	30,5	2,3	1,8	100,0	64,6	1 957
Grande Région										
Nord	0,4	48,1	0,0	0,4	44,0	3,0	4,2	100,0	48,5	557
Ouest	0,6	79,6	0,0	2,7	9,9	0,0	7,2	100,0	80,2	971
Centre	0,6	69,4	0,4	1,5	25,1	1,6	1,5	100,0	70,3	1 004
Sud	1,1	77,5	1,2	0,2	17,6	2,2	0,0	100,0	79,9	533
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	0,6	63,9	0,5	1,3	29,4	1,9	2,5	100,0	64,9	1 914
Primaire	0,9	82,0	0,1	1,5	9,6	1,1	4,8	100,0	83,0	670
Moyen/secondaire ou plus	0,5	79,0	0,0	2,2	12,5	0,0	5,8	100,0	79,5	481
Quintiles de bienêtre économique										
Le plus pauvre	0,5	43,7	0,8	0,2	47,6	4,9	2,2	100,0	45,0	755
Second	0,8	67,9	0,4	1,0	28,2	0,9	0,8	100,0	69,2	716
Moyen	0,2	85,6	0,2	2,6	8,1	0,2	3,0	100,0	86,0	570
Quatrième	0,3	87,8	0,0	2,6	4,5	0,0	4,7	100,0	88,1	537
Le plus riche	1,5	77,0	0,0	1,3	11,3	0,0	8,9	100,0	78,5	488
Total	0,6	70,2	0,3	1,4	22,4	1,5	3,5	100,0	71,2	3 065

[1] On considère que les selles des enfants sont évacuées de manière hygiénique si l'enfant utilise des toilettes ou des latrines, si les matières fécales sont jetées/rincées dans des toilettes ou des latrines ou si elles sont enterrées.
[2] Se reporter au Chapitre 2 pour la définition des catégories.
[3] Type d'installations sanitaires qui seraient considérées comme "améliorées" si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

ALLAITEMENT ET ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS 9

Tableau 9.1 Allaitement initial

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, pourcentage de ceux qui ont été allaités, pourcentage de ceux qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage de ceux qui ont commencé à être allaités le jour qui a suivi la naissance; parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête et qui ont été allaités, pourcentage de ceux qui ont reçu des aliments avant d'être allaités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête :				Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux dernières années et qui ont été allaités :	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant été allaité	Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage ayant commencé à être allaité le jour qui a suivi la naissance[1]	Effectif d'enfants derniers-nés	Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités[2]	Effectif d'enfants derniers-nés allaités
Sexe						
Masculin	98,3	28,5	93,3	1 189	60,1	1 168
Féminin	98,7	30,3	92,6	1 128	61,1	1 113
Assistance à l'accouchement						
Prestataire formé[3]	98,4	29,8	93,7	1 362	57,8	1 341
Matrone/Accoucheuse traditionnelle	98,3	16,0	88,6	346	67,0	340
Autre	98,4	37,9	93,9	507	65,2	499
Personne	99,7	27,0	93,4	101	52,8	101
Lieu de l'accouchement						
Établissement de santé	98,4	31,7	93,8	1 778	59,6	1 750
Maison	98,7	21,9	90,3	538	63,8	531
Résidence						
Urbain	99,0	23,8	94,3	779	57,8	772
Rural	98,2	32,2	92,3	1 537	62,0	1 509
Grande Région						
Nord	97,8	38,4	90,1	431	61,3	421
Ouest	99,2	12,3	96,8	667	61,2	662
Centre	98,4	30,9	94,2	792	72,0	780
Sud	98,1	44,3	87,6	426	37,6	418
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	98,3	30,8	92,7	1 480	63,7	1 454
Primaire	98,6	27,5	93,6	470	59,1	463
Moyen/secondaire ou plus	99,1	26,1	93,2	367	50,0	363
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	97,6	31,7	90,2	602	58,5	587
Second	99,0	32,0	91,4	573	59,8	568
Moyen	98,7	30,5	95,3	400	61,6	395
Quatrième	98,2	28,1	95,2	372	72,5	366
Le plus élevé	99,2	21,7	95,1	369	52,2	365
Ensemble	98,5	29,4	93,0	2 316	60,6	2 281

Note : Le tableau est basé sur les enfants derniers-nés, nés au cours des deux années ayant précédé l'enquête, qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête.
[1] Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance.
[2] C'est-à-dire les enfants qui ont reçu autre chose que le lait maternel pendant les trois premiers jours.
[3] Médecin, infirmière/sage-femme ou sage-femme auxiliaire.

Tableau 9.2 Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère par type d'allaitement et pourcentage actuellement allaités ; pourcentage de l'ensemble des enfants de moins de deux ans utilisant un biberon, selon l'âge de l'enfant en mois, EDS-Continue, Sénégal 2016

		Type d'allaitement									
Âge en mois	Non allaités	Exclusive-ment allaités	Allaités et eau seulement	Allaités et liquides non lactés[1]	Allaités et autres laits	Allaités et aliments de complément	Total	Pourcen-tage actuelle-ment allaités	Effectif d'enfants derniers-nés de moins de deux ans vivant avec leur mère	Pourcen-tage utilisant un biberon	Effectif d'enfants de moins de deux ans
0-1	1,3	**62,6**	14,0	12,9	3,1	6,2	100,0	98,7	154	4,2	159
2-3	0,6	**35,0**	37,6	15,9	6,8	4,1	100,0	99,4	218	9,8	225
4-5	0,4	**14,9**	60,8	11,2	3,2	9,4	100,0	99,6	173	3,9	176
6-8	0,4	**2,4**	34,0	3,2	4,0	56,1	100,0	99,6	312	6,1	315
9-11	1,6	**0,6**	12,0	3,1	1,6	81,0	100,0	98,4	284	4,9	294
12-17	6,1	**0,1**	7,4	1,2	1,3	83,9	100,0	93,9	543	4,0	557
18-23	43,1	**0,1**	1,8	0,3	0,7	54,0	100,0	56,9	552	0,7	586
0-3	0,9	**46,4**	27,8	14,6	5,3	4,9	100,0	99,1	372	7,5	384
0-5	0,7	**36,4**	38,3	13,5	4,6	6,4	100,0	99,3	545	6,4	560
6-9	0,3	**1,8**	29,6	3,5	3,6	61,3	100,0	99,7	413	6,7	419
12-15	2,9	**0,2**	8,9	1,8	1,3	84,8	100,0	97,1	359	4,7	370
12-23	24,7	**0,1**	4,6	0,7	1,0	68,8	100,0	75,3	1 095	2,3	1 143
20-23	55,0	**0,1**	0,5	0,5	0,7	43,3	100,0	45,0	344	1,0	375

Note : Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de 24 heures (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie "Allaitement et eau seulement" ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaités », « Allaités exclusivement », « Allaités et eau seulement », « Liquides non lactés », « Autres laits », et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi, les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autres laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.
[1] Les liquides non lactés comprennent les jus, les boissons à base de jus, les bouillons et les autres liquides.

Tableau 9.3 Durée médiane de l'allaitement

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Durée médiane (en mois) de l'allaitement parmi les enfants nés au cours des trois dernières années [1]		
Caractéristique sociodémographique	Allaitement	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant[2]
Sexe			
Masculin	20,6	1,4	6,5
Féminin	20,7	1,5	6,2
Résidence			
Urbain	19,5	(1,5)	5,5
Rural	21,1	1,4	6,9
Grande Région			
Nord	20,8	(2,0)	6,6
Ouest	19,4	a	5,4
Centre	20,9	1,0	6,8
Sud	21,7	2,4	7,0
Niveau d'instruction de la mère			
Pas d'instruction	21,1	1,5	6,6
Primaire	19,6	a	6,2
Moyen/secondaire ou plus	20,3	(1,7)	5,8
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	21,8	1,7	7,2
Second	21,6	0,8	6,3
Moyen	19,9	(1,3)	6,6
Quatrième	19,6	*	6,0
Le plus élevé	(19,0)	*	5,2
Ensemble	20,6	1,5	6,4
Moyenne pour tous les enfants	20,7	2,9	7,6

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
Les durées moyenne et médiane sont basées sur les répartitions, au moment de l'enquête, des proportions de naissances par mois depuis la naissance. Y compris les enfants vivants et décédés au moment de l'enquête.
[1] On suppose que les enfants qui ne sont pas des derniers-nés et les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère ne sont pas actuellement allaités.
[2] Soit exclusivement allaités ou qui ont reçu le lait maternel et de l'eau seulement, et/ou des liquides non lactés seulement.

Tableau 9.4 Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de deux ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon l'âge, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Liquides			Aliments solides ou semi solides										
Age en mois	Lait en poudre pour enfant	Autres laits[1]	Autres liquides[2]	Aliments enrichis pour bébés	Aliments à base de céréales[3]	Fruits et légumes riches en vitamine A[4]	Autres fruits et légumes	Aliments à base de racines et de tubercules	Aliments à base de légumineuses et de noix	Viande, poisson, volaille	Œufs	Fromage, yaourt, autres produits laitiers	Aliments solides ou semi-solides	Effectif d'enfants
						ENFANTS ALLAITÉS								
0-1	1,7	1,4	13,5	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,3	152
2-3	2,8	4,0	18,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	217
4-5	1,2	3,0	12,8	0,0	4,8	0,7	0,0	1,6	0,0	0,3	0,0	0,8	9,5	172
6-8	2,6	10,7	11,4	9,5	36,0	19,3	1,3	10,7	3,4	10,2	0,3	7,1	56,3	311
9-11	2,7	15,8	23,7	10,6	62,2	28,1	2,7	12,3	13,9	24,6	2,5	9,3	82,3	279
12-17	3,6	27,7	31,7	6,8	81,1	34,8	6,6	14,7	14,4	42,7	6,3	10,2	89,4	510
18-23	2,5	31,2	36,7	6,5	88,4	39,6	7,7	13,4	21,1	47,0	10,5	10,3	94,9	314
6-23	2,9	22,4	26,8	8,1	69,0	31,1	4,9	13,1	13,4	32,9	5,2	9,3	81,9	1 414
Ensemble	2,7	17,0	23,6	5,8	50,5	22,6	3,5	9,6	9,7	23,9	3,7	6,8	61,0	1 955
						ENFANTS NON ALLAITÉS								
0-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
6-8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
9-11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
12-17	(4,6)	(50,4)	(52,8)	(13,8)	(93,1)	(28,3)	(6,4)	(23,1)	(30,9)	(54,6)	(4,6)	(15,5)	(97,8)	33
18-23	3,2	45,2	36,7	2,6	96,3	38,0	5,3	21,6	16,7	57,9	13,3	23,2	99,6	238
6-23	3,3	46,2	38,4	4,1	95,6	36,8	5,3	21,3	18,0	57,0	12,0	21,9	99,0	277
Ensemble	3,2	45,5	37,8	4,1	94,5	36,2	5,2	21,0	17,8	56,2	11,8	21,6	97,8	281

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
Les données sur l'allaitement et sur les aliments consommés se rapportent à la période de « 24 heures » (hier et la nuit dernière).
[1] Inclut le lait d'animal, qu'il soit frais, en boîte, ou en poudre.
[2] N'inclut pas l'eau plate. Inclut les jus, les boissons à base de jus, les bouillons ou d'autres liquides non lactés.
[3] Inclut les aliments enrichis pour bébés
[4] Inclut [liste des fruits et légumes figurant dans le questionnaire comme les potirons, les ignames rouges ou jaunes ou les courges, les carottes les pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues, les papayes et autres fruits et légumes, cultivés localement et riches en vitamine A].

Tableau 9.5 Pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont été nourris en suivant les trois pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par nombre de groupes d'aliments et par nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview selon qu'ils sont ou non allaités et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les enfants allaités de 6-23 mois, pourcentage nourris :				Parmi les enfants non allaités de 6-23 mois, pourcentage nourris :					Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage nourris :				
Caractéristique sociodémographique	Avec 4 groupes d'aliments ou plus[1]	Selon la fréquence minimale des repas[2]	Avec au moins 4 groupes d'aliments et selon la fréquence minimale des repas	Effectif d'enfants allaités de 6-23 mois	Avec lait ou produits laitiers[3]	Avec 4 groupes d'aliments ou plus[1]	Selon la fréquence minimale des repas[4]	Selon les 3 pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant[5]	Effectif d'enfants non allaités de 6-23 mois	Avec lait maternel ou produits laitiers[6]	Avec 4 groupes d'aliments ou plus[1]	Selon la fréquence minimale des repas[7]	Selon les 3 pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant	Effectif de tous les enfants de 6-23 mois
Age en mois														
6-8	3,6	37,4	3,3	311	*	*	*	*	1	99,6	3,6	37,3	3,3	312
9-11	9,0	20,3	3,5	279	*	*	*	*	5	98,4	9,5	19,9	3,4	284
12-17	18,6	31,4	9,8	510	(49,6)	(25,6)	(60,6)	(4,6)	33	96,9	19,0	33,2	9,4	543
18-23	19,2	39,9	10,3	314	24,8	30,2	45,2	3,8	238	67,6	23,9	42,2	7,5	552
Sexe														
Masculin	12,6	35,1	6,4	722	22,3	28,1	41,6	3,3	135	87,8	15,0	36,1	5,9	857
Féminin	14,5	29,6	8,1	692	31,9	31,3	50,4	4,3	142	88,4	17,4	33,2	7,4	834
Résidence														
Urbain	19,3	37,9	11,2	446	32,1	26,4	49,2	3,3	116	86,0	20,8	40,3	9,5	561
Rural	10,9	29,9	5,4	968	23,7	32,1	43,9	4,2	161	89,1	13,9	31,9	5,2	1 129
Grande Région														
Nord	16,9	21,4	7,7	269	51,4	34,3	58,6	4,7	45	93,0	19,4	26,7	7,3	315
Ouest	15,0	34,9	9,6	375	25,4	21,6	47,9	0,5	111	82,9	16,5	37,9	7,5	486
Centre	12,3	33,4	6,3	497	14,8	36,2	35,1	5,0	85	87,6	15,7	33,6	6,1	582
Sud	10,5	38,3	5,0	272	31,6	33,9	51,0	10,3	36	92,1	13,2	39,7	5,7	308
Niveau d'instruction de la mère														
Pas d'instruction	12,3	30,6	6,4	951	26,9	27,1	43,6	3,9	156	89,7	14,4	32,5	6,0	1 107
Primaire	12,0	25,3	4,0	263	20,3	28,5	40,6	1,9	80	81,4	15,8	28,8	3,5	343
Moyen/secondaire ou plus	21,3	50,3	15,4	200	(42,1)	(42,2)	(66,6)	(7,3)	41	90,2	24,8	53,0	14,0	241
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	8,8	29,4	3,7	387	35,3	27,5	52,0	6,5	46	93,1	10,8	31,9	4,0	434
Second	12,0	28,6	6,1	377	16,3	25,9	39,2	0,8	49	90,4	13,6	29,8	5,5	425
Moyen	14,2	26,2	5,4	237	25,6	34,2	43,6	6,8	53	86,4	17,8	29,4	5,7	290
Quatrième	17,2	40,0	10,8	218	(21,9)	(29,3)	(33,4)	(3,0)	59	83,5	19,7	38,6	9,1	277
Le plus élevé	20,9	45,1	14,5	194	(35,1)	(30,8)	(59,6)	(2,6)	70	82,8	23,5	48,9	11,4	264
Ensemble	13,5	32,4	7,2	1 414	27,2	29,7	46,1	3,8	277	88,1	16,2	34,7	6,6	1 690

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Groupes d'aliments : a) préparations pour bébés, laits autres que le lait maternel, fromages ou yaourts ou autres produits laitiers; b) préparations à base de céréales, de racines et de tubercules, y compris les bouillies d'avoine et les aliments enrichis pour bébés à base de céréales; c) les fruits et les légumes riches en vitamine A (et huile de palme rouge); d) autres fruits et légumes; e) œufs; f). viande, volaille, poisson et coquillages (et abats); g) légumineuses et noix.

[2] Pour les enfants allaités, la fréquence minimale des repas est de recevoir des aliments solides ou semi solides au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et au moins trois fois par jour pour les enfants de 9-23 mois.

[3] Y compris, au moins, deux repas de préparations commerciales pour bébé, de lait d'animal frais, en boîte, ou en poudre et de yaourts.

[4] Pour les enfants non allaités de 6-23 mois, la fréquence minimale des repas est de recevoir des aliments solides ou semi solides ou des aliments lactés au moins quatre fois par jour.

[5] On considère que les enfants de 6-23 mois non allaités sont nourris selon le standard minimum des trois pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers au moins deux fois par jour et s'ils sont nourris avec la fréquence minimale des repas et reçoivent des aliments solides ou semi solides des quatre groupes d'aliments ou plus, non compris le groupe du lait et des produits laitiers.

[6] Allaités ou non allaités et recevant deux repas ou plus de préparation commerciale pour bébé, lait d'animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourt.

[7] Les enfants nourris le nombre minimum recommandé de fois par jour selon leur âge et selon qu'ils sont allaités ou non, comme décrit aux notes 2 et 4.

Tableau 9.6 Présence de sel iodé dans le ménage

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode et pourcentage ne disposant pas de sel; parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage de ceux dont le sel était iodé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi tous les ménages, pourcentage :			Parmi les ménages dont le sel a été testé :	
Caractéristique sociodémographique	Dont le sel a été testé	Ne disposant pas de sel	Effectif de ménages	Pourcentage disposant de sel iodé	Effectif de ménages
Résidence					
Urbain	79,8	20,2	2 359	73,3	1 883
Rural	93,4	6,6	2 078	56,4	1 942
Grande Région					
Nord	92,3	7,7	741	58,5	683
Ouest	78,4	21,6	2 001	71,7	1 569
Centre	93,4	6,6	1 014	53,9	947
Sud	91,9	8,1	682	70,6	626
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	95,3	4,7	767	55,7	730
Second	92,3	7,7	806	53,5	744
Moyen	82,9	17,1	844	61,5	699
Quatrième	76,9	23,1	1 086	72,0	835
Le plus élevé	87,3	12,7	935	78,4	816
Ensemble	86,2	13,8	4 437	64,7	3 825

Tableau 9.7 Consommation de micronutriments par les enfants

Parmi les plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère pourcentage de ceux qui ont reçu des aliments riches en vitamine A et riches en fer durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview; parmi tous les enfants de 6-59 mois pourcentage de ceux à qui on a donné des compléments de vitamine A au cours des six mois ayant précédé l'interview, pourcentage de ceux à qui on a donné des suppléments de fer au cours des sept derniers jours et pourcentage à qui on a donné des vermifuges au cours des six mois ayant précédé l'interview; parmi tous les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dont le sel a été testé, pourcentage de ceux vivant dans un ménage avec du sel iodé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 6-59 mois :				Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dont le sel a été testé pour la présence d'iode	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A au cours des dernières 24 heures[1]	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer au cours des dernières 24 heures [2]	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A au cours des 6 derniers mois	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer au cours des 7 derniers jours	Pourcentage à qui on a donné des vermifuges au cours des 6 derniers mois[3]	Effectif d'enfants	Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé[4]	Effectif d'enfants
Age en mois									
6-9	27,2	13,1	413	45,1	1,5	15,5	419	67,8	402
10-11	41,2	29,6	182	60,5	3,3	28,4	190	61,2	185
12-23	61,0	50,6	1 095	77,3	1,4	59,7	1 143	62,9	1 116
24-35	na	na	na	82,0	1,4	74,7	1 180	62,8	1 123
36-47	na	na	na	81,3	2,8	75,0	1 188	63,1	1 131
48-59	na	na	na	81,1	1,3	75,5	1 150	61,1	1 099
Sexe									
Masculin	51,2	39,3	857	76,7	1,7	65,1	2 681	61,7	2 572
Féminin	50,0	39,0	834	77,1	1,8	65,6	2 588	64,0	2 484
Allaitement									
Allaité	46,7	34,5	1 414	65,2	1,6	42,3	1 495	62,8	1 459
Non allaité	70,5	62,6	277	81,6	1,8	74,4	3 775	62,9	3 598
Âge de la mère à la naissance									
15-19	46,5	38,7	140	66,4	2,3	49,6	221	68,4	219
20-29	51,5	38,9	866	72,3	1,9	59,3	2 443	60,9	2 352
30-39	50,4	39,2	580	80,9	1,8	70,9	2 018	64,7	1 931
40-49	49,6	40,9	105	86,6	1,1	77,0	587	62,9	555
Résidence									
Urbain	56,2	43,6	561	78,6	0,9	68,5	1 971	72,3	1 855
Rural	47,8	36,9	1 129	75,9	2,3	63,4	3 298	57,4	3 201
Grande Région									
Nord	59,0	53,2	315	73,9	1,8	54,9	961	56,8	927
Ouest	52,3	37,1	486	77,9	0,5	68,4	1 692	69,2	1 569
Centre	49,2	40,8	582	80,1	2,0	67,4	1 700	54,5	1 655
Sud	42,0	24,7	308	72,5	3,7	66,7	917	73,4	904
Niveau d'instruction de la mère									
Pas d'instruction	48,3	38,0	1 107	76,0	2,0	62,6	3 415	59,2	3 298
Primaire	47,2	37,0	343	80,0	1,8	71,4	1 156	69,6	1 108
Moyen/secondaire ou plus	66,0	47,4	241	76,4	0,7	68,8	698	70,1	650
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	44,3	32,7	434	72,0	2,5	61,5	1 292	56,8	1 249
Second	45,1	35,8	425	76,0	1,8	62,5	1 190	54,1	1 159
Moyen	56,4	43,1	290	80,3	1,5	67,9	1 005	60,7	955
Quatrième	53,8	43,9	277	79,0	1,8	69,8	978	72,8	916
Le plus élevé	60,1	45,6	264	79,4	0,7	67,0	804	76,7	778
Ensemble	50,6	39,1	1 690	76,9	1,8	65,3	5 269	62,9	5 056

Note : Les informations sur les suppléments de vitamine A sont basées sur la déclaration de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible). Les informations sur les suppléments de fer et sur les vermifuges sont basées sur la déclaration de la mère.
[1] Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille, les œufs, les potirons, les ignames rouges ou jaunes ou les courges, les carottes, les pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues, les papayes et autres fruits et légumes cultivés localement et riches en vitamine A ainsi que l'huile de palme rouge [si les données sont collectées.]
[2] Y compris la viande (abats inclus), le poisson, les volailles et les œufs.
[3] Les vermifuges pour les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomiases.
[4] Sont exclus les enfants vivant dans un ménage dont le sel n'a pas été testé.

Tableau 9.8 Prévalence de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois considérés comme étant atteints d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine				
	Anémie (<11,0 g/dl)	Anémie légère (10,0-10,9 g/dl)	Anémie modérée (7,0-9,9 g/dl)	Anémie sévère (< 7,0 g/dl)	Effectif d'enfants
Âge en mois					
6-9	74,4	30,6	42,7	1,1	315
10-11	78,0	31,7	45,2	1,2	176
12-23	82,4	28,4	50,3	3,7	1 143
24-35	74,4	32,4	38,7	3,3	1 191
36-47	58,2	29,8	26,2	2,2	1 219
48-59	46,3	26,4	18,6	1,3	1 196
Sexe					
Masculin	69,2	29,8	36,8	2,7	2 669
Féminin	62,8	29,0	31,5	2,3	2 571
Interview de la mère					
Interviewée	66,9	29,4	35,1	2,4	4 604
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	62,5	27,5	30,8	4,2	192
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[5]	58,6	30,1	26,4	2,1	443
Résidence					
Urbain	58,1	30,8	26,9	0,4	1 942
Rural	70,8	28,5	38,5	3,7	3 297
Grande Région					
Nord	69,7	28,8	36,0	4,9	961
Ouest	58,6	29,6	28,5	0,4	1 665
Centre	68,8	30,7	35,6	2,6	1 704
Sud	70,9	27,2	40,2	3,5	909
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	69,8	29,4	37,1	3,3	3 162
Primaire	63,1	32,3	29,9	1,0	1 025
Moyen/secondaire ou plus	57,1	23,9	32,3	1,0	604
Manquant	*	*	*	*	4
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	75,1	25,6	43,4	6,1	1 288
Second	70,8	29,2	38,6	2,9	1 187
Moyen	65,9	30,8	33,7	1,3	1 039
Quatrième	60,3	33,3	26,8	0,2	905
Le plus élevé	51,7	29,6	22,1	0,0	820
Ensemble	66,1	29,4	34,2	2,5	5 239

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview et qui ont été testés pour l'anémie. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine, est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998. Hémoglobine en grammes par décilitre (g/dl).
[1] Y compris les enfants dont la mère est décédée.
[2] Pour les femmes qui n'ont pas été enquêtées, les informations proviennent du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le ménage.

Tableau 9.9 Échelle pour l'interprétation des valeurs de prévalence de la malnutrition (-2 Z-score) dans une population, EDS-Continue, Sénégal 2016

Indicateurs	Situation de malnutrition			
	Acceptable	Mauvaise	Grave	Critique
Prévalence du retard de croissance (% d'enfants Z<-2)	<20	≥20 et <30	≥30 et <40	≥40
Prévalence de l'insuffisance pondérale (% d'enfants<-2)	<10	≥10 et <20	≥20 et <30	≥30
Prévalence de l'émaciation (% d'enfants Z<-2)	<5	≥5 et <10	≥10 et <15	≥15

Tableau 9.10 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille en fonction de l'âge, le poids en fonction de la taille et le poids en fonction de l'âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Taille-pour-Âge[1]			Poids-pour-Taille				Poids-pour-Âge				
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET[2]	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pour centage en dessous de -2 ET[2]	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET[2]	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants
Âge en mois												
<6	2,2	10,4	-0,5	2,1	5,5	2,9	0,0	2,4	10,5	1,0	-0,4	528
6-9	2,5	10,5	-0,6	2,7	5,2	0,9	-0,3	1,7	8,7	0,3	-0,6	404
10-11	3,0	12,7	-0,6	1,4	10,5	0,0	-0,5	3,7	14,7	0,0	-0,7	174
12-23	5,2	19,7	-1,0	1,3	8,7	1,4	-0,5	2,6	14,5	0,9	-0,9	1 131
24-35	5,7	22,9	-1,1	1,3	6,0	0,5	-0,4	2,6	14,9	0,3	-0,9	1 171
36-47	5,0	18,2	-0,9	0,5	5,6	1,0	-0,5	2,4	13,0	0,8	-0,9	1 172
48-59	3,8	12,9	-0,8	0,8	9,5	0,2	-0,8	2,3	14,6	0,0	-1,0	1 142
Sexe												
Masculin	4,9	19,3	-0,9	1,5	7,9	0,7	-0,5	2,7	15,1	0,5	-0,9	2 934
Féminin	3,9	14,5	-0,8	0,9	6,4	1,2	-0,5	2,2	11,8	0,6	-0,8	2 788
Intervalle intergénésique en mois[3]												
Première naissance[4]	4,1	16,3	-0,9	1,1	7,6	1,1	-0,5	2,7	13,3	0,6	-0,8	1 147
<24	6,8	18,4	-1,0	1,4	9,2	0,8	-0,5	3,2	16,3	0,4	-0,9	560
24-47	3,8	17,7	-1,0	1,3	7,1	0,8	-0,5	2,4	14,1	0,3	-0,9	2 457
48+	3,5	12,6	-0,7	1,2	6,5	1,1	-0,4	1,7	10,8	1,2	-0,7	972
Grosseur à la naissance[3]												
Très petit	6,0	23,1	-1,2	2,7	13,4	0,9	-0,8	6,5	24,0	0,1	-1,3	767
Petit	4,8	18,6	-1,0	1,0	10,3	0,3	-0,6	2,6	16,2	0,2	-1,0	912
Moyen ou plus gros que la moyenne	3,5	14,5	-0,8	1,0	5,2	1,0	-0,4	1,5	10,5	0,8	-0,7	3 447
Manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
Interview de la mère												
Interviewée	4,1	16,5	-0,9	1,3	7,3	0,9	-0,5	2,4	13,5	0,6	-0,8	5 136
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	5,9	20,8	-0,7	1,1	5,8	1,7	-0,5	2,6	14,0	0,6	-0,8	194
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[5]	7,5	21,3	-0,8	0,7	5,7	1,1	-0,5	2,5	13,2	0,3	-0,8	392
Résidence												
Urbain	3,1	11,7	-0,6	1,3	5,1	1,4	-0,3	1,0	9,3	0,9	-0,6	2 112
Rural	5,2	20,1	-1,1	1,2	8,4	0,7	-0,6	3,3	16,0	0,3	-1,0	3 610
Grande Région												
Nord	4,2	18,3	-1,0	1,9	9,4	0,8	-0,7	3,3	17,8	0,5	-1,1	1 030
Ouest	2,7	10,7	-0,6	0,9	4,6	1,4	-0,3	0,6	8,2	0,9	-0,5	1 810
Centre	4,7	18,1	-1,0	1,2	7,8	0,7	-0,5	2,5	14,2	0,1	-0,9	1 874
Sud	7,4	24,9	-1,2	1,2	8,4	0,8	-0,6	4,6	17,4	0,6	-1,0	1 007
Niveau d'instruction de la mère												
Pas d'instruction	4,9	19,7	-1,0	1,3	8,4	0,6	-0,6	2,9	16,4	0,2	-1,0	3 472
Primaire	3,1	12,6	-0,7	1,6	6,3	1,4	-0,4	1,9	9,7	0,6	-0,7	1 141
Moyen/secondaire ou plus	2,3	8,2	-0,5	0,2	3,4	1,8	-0,1	1,0	5,8	2,1	-0,4	713
Manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	7,1	25,6	-1,3	1,2	9,7	0,4	-0,7	4,9	20,4	0,0	-1,2	1 416
Second	5,0	19,1	-1,0	1,4	7,7	1,0	-0,6	2,5	14,3	0,5	-1,0	1 302
Moyen	3,6	17,0	-0,9	1,3	6,6	1,1	-0,5	1,6	12,2	0,1	-0,8	1 108
Quatrième	3,4	11,7	-0,7	1,9	6,3	0,6	-0,5	1,6	12,0	0,7	-0,8	998
Le plus élevé	1,6	6,3	-0,2	0,2	4,0	2,0	-0,1	0,5	4,7	1,6	-0,2	897
Ensemble	4,4	17,0	-0,9	1,2	7,2	0,9	-0,5	2,4	13,5	0,5	-0,8	5 722

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview. Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant adoptées en 2006. Les indices présentés dans ce tableau ne sont PAS comparables à ceux basés sur les normes NCHS/CDC/OMS de 1977 utilisées précédemment. Le tableau est basé sur les enfants dont les dates de naissance (mois et année) et les mesures du poids et de la taille sont valables.
[1] Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée de même que, dans quelques cas, les enfants dont l'âge est inconnu et qui mesurent moins de 85 cm; les autres enfants sont mesurés en position debout.
[2] Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.
[3] Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée.
[4] Les premières naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.) sont comptées comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.
[5] Y compris les enfants dont la mère est décédée.
[6] Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée et ceux dont la mère est enceinte ou qui ont eu un enfant dans les deux derniers mois.
[7] Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

PALUDISME 10

Tableau 10.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une moustiquaire et pourcentage de ceux qui en possèdent plus d'une (imprégnée ou non); pourcentage qui possède au moins une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII); pourcentage qui possède une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA) et nombre moyen de moustiquaires de MII et de MIILDA par ménages et pourcentage de ménages qui possèdent au moins une moustiquaire, une MII et une MIILDA pour deux personnes qui ont passé la nuit dernière dans le ménage, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire			Nombre moyen de moustiquaires par ménage				Pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire pour deux personnes qui ont passé la nuit dernière dans le ménage			
Caractéristique	Imprégnée ou non	Moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII)[2]	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA)	Imprégnée ou non	Moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII)[2]	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA)	Effectif de ménages	Imprégnée ou non	Moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII)[2]	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA)	Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit dernière dans le ménage
Résidence											
Urbain	73,6	72,6	71,7	3,2	3,1	3,1	2 359	51,7	50,5	49,7	2 349
Rural	94,3	93,6	92,7	5,4	5,3	5,2	2 078	64,0	63,1	61,8	2 077
Type de saison											
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	90,0	89,5	89,0	4,6	4,6	4,5	1 349	66,9	65,7	64,7	1 349
Saison sèche (Février à Août)	80,3	79,3	78,3	4,1	4,0	3,9	3 088	53,3	52,3	51,3	3 077
Grande Région											
Nord	87,5	86,6	86,4	3,8	3,7	3,7	741	48,2	46,8	46,8	739
Ouest	70,7	69,5	69,3	2,9	2,8	2,8	2 001	46,8	45,4	45,4	1 993
Centre	96,2	95,8	95,6	6,3	6,3	6,3	1 014	74,1	73,8	73,4	1 013
Sud	96,4	96,0	91,5	5,5	5,4	4,9	682	74,1	73,0	66,9	681
Profil épidémiologique palustre [3]											
Zone I	75,2	74,1	73,9	3,1	3,1	3,1	2 741	47,1	45,8	45,8	2 732
Zone II	96,2	95,8	95,6	6,3	6,3	6,3	1 014	74,1	73,8	73,4	1 013
Zone III	96,4	96,0	91,5	5,5	5,4	4,9	682	74,1	73,0	66,9	681
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	95,4	94,9	93,0	5,5	5,5	5,2	767	63,6	62,9	60,5	766
Second	94,5	94,1	93,0	5,1	5,1	5,0	806	66,5	65,7	64,1	806
Moyen	89,1	87,8	87,4	4,5	4,4	4,4	844	60,3	58,6	57,9	844
Quatrième	78,8	78,1	77,5	3,4	3,4	3,3	1 086	55,9	55,6	54,8	1 076
Le plus élevé	63,5	62,4	61,8	3,1	3,0	2,9	935	43,8	42,2	42,0	935
Ensemble	83,3	82,4	81,6	4,2	4,2	4,1	4 437	57,5	56,4	55,4	4 426

[1] Membres de fait des ménages.
[2] Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.
[3] La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 10.2 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques

Pourcentage de ménages ayant reçu la visite de quelqu'un qui a pulvérisé d'insecticide les murs intérieurs du logement contre les moustiques (PID) au cours des 12 derniers mois, pourcentage de ménages avec ,au moins, une MII et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois, et pourcentage de ménages avec au moins une MII pour deux personnes et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique	Pourcentage de ménages ayant bénéficié d'une PID[1] au cours des 12 derniers mois	Pourcentage de ménages avec au moins une MII[2] et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois	Pourcentage de ménages avec au moins une MII[2] pour chaque deux personnes et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois	Effectif de ménages
Résidence				
Urbain	3,4	73,3	51,4	2 359
Rural	7,5	93,9	65,5	2 078
Type de saison				
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	6,8	90,2	68,3	1 349
Saison sèche (Février à Août)	4,6	79,8	53,5	3 088
Grande Région				
Nord	2,6	87,0	48,0	741
Ouest	2,3	70,3	46,6	2 001
Centre	11,4	96,1	76,7	1 014
Sud	8,0	96,2	74,6	682
Profil épidémiologique palustre				
Zone I	2,4	74,8	46,9	2 741
Zone II	11,4	96,1	76,7	1 014
Zone III	8,0	96,2	74,6	682
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	9,0	94,9	65,0	767
Second	6,6	94,3	67,7	806
Moyen	4,7	88,0	59,8	844
Quatrième	3,5	78,8	56,6	1 086
Le plus élevé	3,8	63,5	43,8	935
Ensemble	5,3	82,9	58,0	4 437

[1] La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est limitée à la pulvérisation faite par une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.
[2] Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.
[3] La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou).

Tableau 10.3 Accès à une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII)

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par nombre de MII possédée par le ménage, selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Nombre de personnes qui ont passé la nuit avant l'enquête dans le ménage								
Nombre de MII	1	2	3	4	5	6	7	8+	Ensemble
0	43,3	27,5	21,6	20,6	16,9	17,1	13,4	12,0	13,6
1	39,2	24,9	18,2	11,8	4,5	3,0	0,9	1,6	3,2
2	12,5	35,2	34,7	30,1	22,2	13,2	12,1	2,8	7,2
3	4,1	5,7	13,3	14,0	18,5	25,6	16,7	6,0	8,9
4	0,4	4,1	7,2	14,5	14,9	22,0	21,5	8,3	10,4
5	0,3	2,3	1,7	4,3	10,5	8,9	14,2	10,3	9,9
6	0,2	0,0	0,8	2,7	7,0	4,5	11,6	11,3	9,9
7+	0,0	0,3	2,4	2,1	5,5	5,6	9,5	47,7	36,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	351	495	909	1 206	1 885	2 303	2 328	27 657	37 132
Pourcentage ayant accès à une MII[1]	56,7	72,5	72,3	73,6	75,9	76,5	78,3	75,9	75,7

[1] Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.

Tableau 10.4 Utilisation des moustiquaires par la population des ménages

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit ayant précédé l'interview, a dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non), sous une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII), et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA), ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide(PID) au cours des 12 derniers mois et, parmi la population de fait des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Population des ménages					Population des ménages avec au moins une MII[1]	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire Imprégnée ou non a nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière ou dans un ménage ayant bénéficié d'une PID[2] au cours des 12 derniers mois	Effectif	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif
Groupe d'âges							
<5	67,6	66,6	65,8	68,9	5 997	75,0	5 328
5-14	64,4	63,6	62,8	66,1	10 557	72,0	9 328
15-34	61,6	60,8	60,1	63,2	11 524	71,9	9 736
35-49	64,3	63,5	62,8	65,6	4 319	74,9	3 660
50+	64,0	62,6	61,9	64,5	4 732	73,9	4 009
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	4	*	4
Sexe							
Masculin	62,0	61,1	60,4	63,4	17 295	71,2	14 837
Féminin	65,7	64,8	64,0	67,1	19 837	74,6	17 229
Résidence							
Urbain	57,3	56,3	55,8	57,8	16 885	72,7	13 066
Rural	69,5	68,8	67,8	71,7	20 247	73,3	18 999
Type de saison							
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	80,1	79,2	78,1	82,2	11 081	84,4	10 402
Saison sèche (Février à Août)	57,1	56,2	55,7	58,2	26 051	67,6	21 663
Grande Région							
Nord	59,0	58,1	57,9	59,9	6 386	66,8	5 551
Ouest	54,7	53,5	53,5	54,9	14 143	71,5	10 580
Centre	73,7	73,4	73,1	77,6	10 401	76,7	9 954
Sud	73,9	72,7	69,1	74,5	6 201	75,4	5 980
Profil épidémiologique palustre							
Zone I	56,1	54,9	54,8	56,5	20 530	69,9	16 131
Zone II	73,7	73,4	73,1	77,6	10 401	76,7	9 954
Zone III	73,9	72,7	69,1	74,5	6 201	75,4	5 980
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	63,7	63,1	60,9	65,8	7 381	66,4	7 013
Second	75,2	74,4	73,6	77,5	7 427	78,8	7 014
Moyen	73,6	72,9	72,7	74,8	7 437	80,3	6 745
Quatrième	62,6	62,0	61,6	63,6	7 449	73,3	6 302
Le plus élevé	44,8	43,1	42,9	45,3	7 438	64,2	4 991
Ensemble	64,0	63,1	62,4	65,4	37 132	73,0	32 065

[1] Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.
[2] la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est limitée à la pulvérisation faite par une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.
[3] La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 10.5 Utilisation de MII existantes

Pourcentage de MII ayant été utilisées par un membre du ménage la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique	Pourcentage de MII[1] ayant été utilisées la nuit avant l'interview	Effectif de MII[1]
Résidence		
Urbain	70,0	7 389
Rural	67,0	11 042
Type de saison		
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	76,6	6 152
Saison sèche (Février à Août)	64,0	12 279
Grande Région		
Nord	69,7	2 741
Ouest	71,1	5 654
Centre	65,8	6 382
Sud	66,8	3 654
Profil épidémiologique palustre		
Zone I	70,6	8 395
Zone II	65,8	6 382
Zone III	66,8	3 654
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	58,4	4 182
Second	71,4	4 089
Moyen	76,8	3 728
Quatrième	68,7	3 672
Le plus élevé	66,2	2 760
Ensemble	68,2	18 431

[2] Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.
[3]La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 10.6 Utilisation des moustiquaires par les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui, la nuit ayant précédé l'interview, a dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non), sous une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII), et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA), ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) au cours des 12 derniers mois et, parmi les enfants de moins de cinq ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Enfants de moins de cinq ans dans tous les ménages					Enfants de moins de cinq dans les ménages avec au moins une MII[1]	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée ou non la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière où dans un ménage ayant bénéficié d'une PID[2] au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire MII[1] la nuit dernière	Effectif d'enfants
Age (en années)							
<1	70,4	69,1	68,3	71,5	1 144	77,5	1 020
1	66,9	65,6	64,9	67,9	1 163	74,1	1 029
2	69,0	68,7	67,7	70,2	1 219	78,1	1 072
3	65,4	64,2	63,6	66,5	1 231	72,1	1 096
4	66,5	65,6	64,6	68,6	1 240	73,3	1 110
Sexe							
Masculin	69,0	67,8	67,0	70,2	3 062	76,0	2 732
Féminin	66,1	65,3	64,5	67,6	2 934	73,8	2 595
Résidence							
Urbain	61,5	60,1	59,8	61,7	2 215	75,5	1 765
Rural	71,1	70,4	69,3	73,2	3 782	74,7	3 562
Type de saison							
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	82,5	82,0	81,0	85,0	1 874	85,5	1 797
Saison sèche (Février à Août)	60,8	59,6	58,9	61,6	4 123	69,6	3 531
Grande Région							
Nord	61,4	60,5	60,2	61,3	1 087	70,4	934
Ouest	60,8	59,4	59,4	60,3	1 892	75,9	1 479
Centre	75,1	74,8	74,6	79,1	1 959	77,4	1 892
Sud	72,2	70,7	66,8	73,3	1 059	73,2	1 023
Profil épidémiologique palustre							
Zone I	61,0	59,8	59,7	60,7	2 979	73,8	2 413
Zone II	75,1	74,8	74,6	79,1	1 959	77,4	1 892
Zone III	72,2	70,7	66,8	73,3	1 059	73,2	1 023
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	64,0	63,2	60,8	66,3	1 482	66,5	1 410
Second	75,7	74,8	74,2	78,0	1 365	79,1	1 290
Moyen	77,6	77,2	77,1	78,6	1 161	84,9	1 056
Quatrième	67,6	66,9	66,5	68,4	1 054	76,8	918
Le plus élevé	49,0	46,6	46,5	48,4	934	66,6	654
Ensemble	67,6	66,6	65,8	68,9	5 997	75,0	5 328

Note : Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage. PID = Pulvérisation intradomiciliaire

[1] Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.

[2] La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est limitée à la pulvérisation faite par une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.

[3] La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 10.7 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui, la nuit ayant précédé l'interview, a dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non), sous une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII), et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA), ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) au cours des 12 derniers mois et, parmi les femmes enceintes de 15-49 ans des ménages avec au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les femmes enceintes de 15-49 ans dans tous les ménages :					Parmi les femmes enceintes de 15-49 ans dans les ménages avec au moins une MII[1]	
Caractéristique	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée ou non la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière ou dans un ménage ayant bénéficié d'une PID[2] au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif de femmes
Résidence							
Urbain	64,0	64,0	63,3	65,0	315	82,0	246
Rural	72,9	72,6	70,4	75,0	434	76,4	412
Type de saison							
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	81,8	81,3	80,1	83,9	232	88,9	212
Saison sèche (Février à Août)	63,5	63,4	61,7	64,9	516	73,5	445
Grande Région							
Nord	69,0	69,0	67,9	69,3	141	71,6	135
Ouest	61,9	61,9	61,9	62,5	264	82,6	198
Centre	74,1	74,1	73,8	77,4	230	79,1	215
Sud	76,5	75,1	66,9	78,4	114	78,5	109
Profil épidémiologique palustre							
Zone I	64,4	64,4	64,0	64,9	405	78,1	334
Zone II	74,1	74,1	73,8	77,4	230	79,1	215
Zone II	76,5	75,1	66,9	78,4	114	78,5	109
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	71,8	71,5	69,7	73,0	445	77,8	409
Primaire	63,6	63,6	62,0	67,0	180	81,3	141
Moyen/secondaire ou plus	67,9	67,9	67,2	68,5	123	77,6	108
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	64,5	64,1	58,5	65,5	169	66,6	163
Second	80,2	80,0	80,0	84,6	136	83,7	130
Moyen	77,8	77,5	77,4	79,5	155	84,0	143
Quatrième	71,5	71,5	70,5	71,8	136	80,6	121
Le plus élevé	53,6	53,6	53,2	54,7	152	80,7	101
Ensemble	69,2	69,0	67,4	70,8	749	78,5	658

Note : Le tableau est basé sur les femmes ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.
[1] Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.
[2] La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est limitée à la pulvérisation faite par une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.
[3] La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 10.8 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête qui, au cours de la grossesse la plus récente, ont reçu de la SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale pourcentage ayant pris au moins deux doses de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique	Pourcentage ayant reçu de la SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant pris 2 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale	Effectif de femmes ayant eu une naissance au cours des deux dernières années
Résidence			
Urbain	86,4	63,4	779
Rural	88,0	58,7	1 537
Type de saison			
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	85,8	59,5	699
Saison sèche (Février à Août)	88,2	60,6	1 617
Grande Région			
Nord	84,0	52,9	431
Ouest	86,4	62,9	667
Centre	90,7	62,1	792
Sud	86,6	60,2	426
Profil épidémiologique palustre			
Zone I	85,5	59,0	1 097
Zone II	90,7	62,1	792
Zone III	86,6	60,2	426
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	87,1	56,7	1 480
Primaire	92,1	69,2	470
Moyen/secondaire ou plus	83,2	63,1	367
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	85,0	53,4	602
Second	88,6	61,5	573
Moyen	92,4	61,5	400
Quatrième	85,1	65,6	372
Le plus élevé	86,8	63,0	369
Ensemble	87,5	60,3	2 316

Tableau 10.9 Prévalence, diagnostic et traitement précoce de la fièvre chez les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview; parmi ces enfants, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon, pourcentage ayant pris une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (ACT), pourcentage ayant pris la ACT le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre, pourcentage ayant pris des antipaludiques, et pourcentage les ayant pris le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les enfants de moins de cinq ans :		Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre :						
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement[1]	Pourcentage à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé	Pourcentage ayant pris une ACT	Pourcentage ayant pris une ACT le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre	Pourcentage ayant pris des antipaludiques	Pourcentage ayant pris des antipaludiques le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre	Effectif d'enfants
Age (en mois)									
<12	14,6	1 168	51,6	9,9	0,5	0,5	1,3	1,3	171
12-23	17,2	1 143	46,9	14,3	1,8	1,7	5,2	4,0	196
24-35	14,1	1 180	54,6	15,5	0,5	0,5	6,1	5,8	167
36-47	9,2	1 188	46,7	10,4	2,4	1,7	7,3	6,6	109
48-59	8,4	1 150	45,2	14,3	3,1	0,9	6,7	3,6	97
Sexe									
Masculin	13,9	2 972	50,1	13,6	1,9	1,3	3,3	2,6	414
Féminin	11,4	2 857	48,6	12,2	1,0	0,7	7,2	6,0	326
Résidence									
Urbain	11,7	2 175	54,9	12,8	0,6	0,1	7,9	6,6	255
Rural	13,3	3 654	46,6	13,1	1,9	1,6	3,5	2,8	485
Type de saison									
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	11,6	1 842	49,9	16,8	3,0	1,9	5,8	3,7	214
Saison sèche (Février à Août)	13,2	3 987	49,3	11,4	0,8	0,7	4,7	4,3	526
Grande Région									
Nord	10,7	1 058	34,0	7,3	0,9	0,0	2,0	0,4	113
Ouest	9,7	1 868	53,0	10,5	0,0	0,0	12,3	11,0	181
Centre	13,8	1 885	50,3	14,0	1,7	1,0	2,2	1,5	260
Sud	18,2	1 018	54,3	17,5	2,9	2,8	3,6	3,3	186
Profil épidémiologique palustre									
Zone I	10,0	2 926	45,7	9,2	0,4	0,0	8,3	6,9	294
Zone II	13,8	1 885	50,3	14,0	1,7	1,0	2,2	1,5	260
Zone III	18,2	1 018	54,3	17,5	2,9	2,8	3,6	3,3	186
Niveau d'instruction de la mère									
Pas d'instruction	12,3	3 747	44,1	12,1	2,1	1,4	2,9	2,3	461
Primaire	12,2	1 268	53,4	9,1	0,7	0,7	4,9	4,0	154
Moyen/secondaire ou plus	15,2	814	64,5	20,9	0,0	0,0	12,9	11,1	124
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	14,7	1 440	44,0	15,7	2,2	2,2	2,8	2,8	212
Second	14,7	1 316	52,1	13,3	2,0	1,1	3,7	2,3	193
Moyen	11,4	1 101	41,8	6,2	1,0	0,8	3,3	2,8	126
Quatrième	10,7	1 072	46,6	8,7	0,0	0,0	5,7	5,7	115
Le plus élevé	10,4	900	70,2	20,6	1,2	0,0	14,1	10,6	93
Ensemble	12,7	5 829	49,5	13,0	1,5	1,1	5,0	4,1	740

[1] Non compris les marchés et les guérisseurs traditionnels.
[3] La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 10.10 Source des conseils ou des traitements parmi les enfants ayant eu de la fièvre

Pourcentage d'enfants ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'une source spécifique; parmi ces enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'interview et e pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'une source spécifique selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès de chaque source : Parmi les enfants ayant eu de la fièvre	Parmi les enfants ayant eu de la fièvre et pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement
Secteur public	40,8	79,5
Hôpital du gouvernement	1,1	2,2
Centre de santé du gouvernement	3,2	6,2
Poste de santé du gouvernement	32,5	63,4
Clinique mobile	0,1	0,1
Autre	1,2	2,3
CS public	2,9	5,6
Secteur médical privé	8,1	15,8
Hôpital/clinique privé	1,6	3,1
Pharmacie	6,0	11,8
Agent de terrain	0,1	0,2
Autre secteur médical privé	0,4	0,8
Autres sources	2,7	5,3
Boutique	0,6	1,2
Guérisseurs traditionnels	1,5	3,0
Autres CS	0,1	0,1
Autre	0,5	0,9
Effectif d'enfants	740	379

Tableau 10.11 Niveau d'hémoglobine < 8,0 g/dl

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 g/dl, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Niveau d'hémoglobine < 8.0 g/dl	Effectif d'enfants
Âge (en mois)		
6-8	4,6	217
9-11	3,9	273
12-17	7,9	554
18-23	8,5	588
24-35	7,5	1 191
36-47	4,6	1 219
48-59	2,7	1 196
Sexe		
Masculin	5,7	2 669
Féminin	5,4	2 571
Interview de la mère		
Interviewée	5,6	4 604
Non interviewée mais présente dans le ménage	6,6	192
Non interviewée et pas présente dans le ménage[1]	5,0	443
Résidence		
Urbain	1,5	1 942
Rural	7,9	3 297
Type de saison		
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	5,0	1 634
Saison sèche (Février à Août)	5,8	3 606
Grande Région		
Nord	8,8	961
Ouest	0,9	1 665
Centre	6,6	1 704
Sud	8,8	909
Profil épidémiologique palustre		
Zone I	3,8	2 626
Zone II	6,6	1 704
Zone III	8,8	909
Niveau d'instruction de la mère		
Pas d'instruction	7,2	3 162
Primaire	3,2	1 025
Moyen/secondaire ou plus	1,6	604
Manquant	*	4
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	11,9	1 288
Second	7,4	1 187
Moyen	3,6	1 039
Quatrième	1,1	905
Le plus élevé	0,3	820
Ensemble	5,6	5 239

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview. Les niveaux d'hémoglobine ont été ajustés en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC (CDC, 1998). L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl).

[1] Y compris les enfants dont la mère est décédée.

[2] Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du Questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le ménage.

[3] La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 10.12 Couverture du test de paludisme chez les enfants (non pondéré)

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois éligibles pour le Test de Diagnostic Rapide (TDR) et la Goutte épaisse (GE) du paludisme qui ont effectué le TDR et la GE (non pondéré), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage d'enfants ayant effectué le TDR et la GE :		
Caractéristique sociodémographique	Test de Diagnostic Rapide (TDR)	Gouttes Épaisses (GE)	Effectif d'enfants
Résidence			
Urbain	96,1	96,0	2 022
Rural	96,1	96,1	3 426
Type de saison			
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	96,2	96,1	1 697
Saison sèche (Février à Août)	96,0	96,1	3 751
Grande Région			
Nord	97,1	97,2	988
Ouest	96,3	96,3	1 729
Centre	95,9	95,9	1 774
Sud	95,0	95,0	956
Profil épidémiologique palustre			
Zone I	96,6	96,6	2 717
Zone II	95,9	95,9	1 774
Zone III	95,0	95,0	956
Age en mois			
6-9	76,3	76,2	412
10-11	97,5	97,1	180
12-23	97,6	97,6	1 170
24-35	97,3	97,4	1 222
36-47	98,1	98,1	1 241
48-59	97,8	97,9	1 222
Sexe			
Masculin	96,1	96,1	2 775
Féminin	96,0	96,0	2 673
Ensemble	96,1	96,1	5 448

Tableau 10.13 Résultat du test de diagnostic rapide (TDR) et de la goutte épaisse (GE) du paludisme chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat au Test de Diagnostic Rapide (TDR) et la Goutte épaisse (GE) du paludisme est positif, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Tests de diagnostic rapide (TDR)		Goutte épaisse (GE)	
Caractéristique sociodémographique et sanitaire	Pourcentage d'enfants dont le résultat est positif	Effectif d'enfants testés	Pourcentage d'enfants dont le résultat est positif	Effectif d'enfants testés
Age en mois				
6-9	0,5	315	0,5	314
10-11	0,0	175	0,0	175
12-23	0,8	1 142	0,6	1 143
24-35	1,0	1 189	1,2	1 191
36-47	1,0	1 218	1,5	1 219
48-59	1,0	1 196	0,6	1 196
Sexe				
Masculin	0,9	2 667	1,1	2 668
Féminin	0,9	2 567	0,7	2 569
Interview de la mère				
Interviewée	0,9	4 601	0,9	4 602
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	2,0	191	1,2	192
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[5]	0,6	442	0,4	443
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	1,2	3 160	1,2	3 161
Primaire	0,6	1 025	0,6	1 025
Moyen/secondaire ou plus	0,0	603	0,1	603
Manquant	0,0	4	0,0	4
Résidence				
Urbain	0,1	1 942	0,1	1 942
Rural	1,3	3 291	1,4	3 295
Type de saison				
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	0,8	1 633	0,4	1 632
Saison sèche (Février à Août)	0,9	3 601	1,1	3 605
Grande Région				
Nord	0,2	959	0,3	961
Ouest	0,1	1 665	0,0	1 665
Centre	0,6	1 701	0,9	1 702
Sud	3,6	908	3,2	909
Profil épidémiologique palustre				
Zone I	0,1	2 624	0,1	2 626
Zone II	0,6	1 701	0,9	1 702
Zone III	3,6	908	3,2	909
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	1,9	1 286	1,8	1 287
Second	1,4	1 185	1,3	1 186
Moyen	0,4	1 038	0,5	1 038
Quatrième	0,2	905	0,4	905
Le plus élevé	0,0	819	0,0	820
Ensemble	0,9	5 234	0,9	5 237

EXCISION 11

Tableau 11.1 Connaissance de l'excision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans connaissant l'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme		Homme	
Caractéristique sociodémographique	Proportion de femmes connaissant l'excision	Effectif de femmes	Proportion d'hommes connaissant l'excision	Effectif d'hommes
Groupe d'âges				
15-19	78,2	1 998	59,7	760
20-24	88,0	1 664	84,3	581
25-29	88,2	1 524	93,5	521
30-34	91,9	1 318	93,7	402
35-39	92,3	998	93,7	349
40-44	94,4	806	96,7	285
45-49	94,8	557	96,8	260
Religion				
Musulman	87,9	8 530	84,5	3 022
Chrétien	87,2	304	80,0	132
Animiste	(87,6)	30	*	4
Ethnie				
Wolof	84,5	3 750	86,8	1 247
Poular	90,9	2 484	81,6	899
Serer	86,8	1 379	77,5	458
Mandingue	95,5	462	87,1	186
Diola	99,2	272	92,8	131
Soninké	86,3	64	(93,5)	37
Autre/non Sénégalais	88,5	454	86,2	201
Résidence				
Urbain	92,8	4 351	90,6	1 695
Rural	83,2	4 514	76,9	1 463
Grande Région				
Nord	81,8	1 537	90,1	486
Ouest	93,2	3 559	89,3	1 405
Centre	79,3	2 460	75,8	725
Sud	96,7	1 309	77,3	543
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	84,8	4 310	81,8	1 149
Primaire	90,5	1 967	82,9	703
Moyen/secondaire ou plus	91,0	2 588	87,1	1 306
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	83,5	1 475	72,1	535
Second	83,5	1 603	77,1	581
Moyen	87,9	1 749	87,8	583
Quatrième	90,2	1 991	89,1	700
Le plus élevé	92,2	2 046	91,2	759
Ensemble 15-49	87,9	8 865	84,3	3 158
50-59	na	na	98,7	368
Ensemble 15-59	na	na	85,8	3 526

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non applicable

Tableau 11.2 Prévalence de l'excision

Proportion de femmes excisées de 15-49 ans, et répartition (en%) des femmes excisées par type d'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes excisées	Effectif de femmes	Type d'excision				Total	Effectif de femmes excisées
			Parties de chair enlevées	Entaille, pas de chair enlevée	Fermeture du vagin	NSP		
Groupe d'âges								
15-19	20,6	1 998	9,5	51,9	3,0	35,5	100,0	412
20-24	22,6	1 664	12,1	58,1	5,2	24,5	100,0	376
25-29	22,5	1 524	13,9	51,4	7,6	27,1	100,0	344
30-34	23,3	1 318	12,6	55,4	9,0	23,0	100,0	307
35-39	25,0	998	11,0	53,4	12,2	23,4	100,0	250
40-44	22,2	806	8,8	63,2	4,7	23,3	100,0	179
45-49	26,0	557	18,3	46,6	12,2	23,0	100,0	145
Religion								
Musulman	23,0	8 530	12,2	54,3	7,2	26,3	100,0	1 962
Chrétien	11,7	304	5,9	67,4	4,1	22,6	100,0	36
Animiste	(48,8)	30	(0,0)	(22,8)	(0,0)	(77,2)	100,0	15
Ethnie								
Wolof	0,8	3 750	36,4	38,7	4,3	20,5	100,0	32
Poular	52,0	2 484	12,9	52,0	9,5	25,7	100,0	1 292
Serer	0,9	1 379	*	*	*	*	100,0	13
Mandingue	65,2	462	9,3	60,6	1,9	28,1	100,0	302
Diola	54,5	272	1,6	60,3	4,4	33,7	100,0	148
Soninké	58,8	64	26,0	48,6	1,1	24,3	100,0	38
Autre/non sénégalais	41,7	454	10,5	59,9	3,3	26,2	100,0	189
Résidence								
Urbain	18,5	4 351	14,9	55,6	6,8	22,7	100,0	806
Rural	26,7	4 514	10,0	53,4	7,3	29,3	100,0	1 207
Grande Région								
Nord	27,9	1 537	23,1	34,0	19,3	23,5	100,0	430
Ouest	11,8	3 559	23,5	55,3	8,1	13,1	100,0	419
Centre	6,0	2 460	9,2	55,9	3,1	31,7	100,0	147
Sud	77,8	1 309	2,9	62,3	2,1	32,8	100,0	1 018
Ensemble	22,7	8 865	12,0	54,3	7,1	26,6	100,0	2 013

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 11.3 Âge des femmes à l'excision

Répartition (en%) des femmes de 15-49 ans excisées par âge à l'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Âge à l'excision					Total	Effectif des femmes excisées
	<5[1]	5-9	10-14	15+	NSP/ Manquant		
Groupe d'âges							
15-19	77,3	10,3	5,3	0,6	6,5	100,0	412
20-24	74,4	14,6	6,9	1,0	3,0	100,0	376
25-29	73,2	11,1	5,6	1,4	8,7	100,0	344
30-34	68,0	11,7	7,9	2,1	10,3	100,0	307
35-39	77,3	12,0	4,0	0,6	6,2	100,0	250
40-44	60,6	24,2	4,4	2,8	7,9	100,0	179
45-49	64,6	12,8	12,6	1,0	9,0	100,0	145
Religion							
Musulman	72,6	12,8	6,4	1,1	7,2	100,0	1 962
Chrétien	48,1	28,7	5,6	14,6	3,0	100,0	36
Animiste	(87,0)	(8,8)	(4,2)	(0,0)	(0,0)	100,0	15
Ethnie							
Wolof	(77,3)	(3,5)	(5,2)	(0,0)	(14,0)	100,0	32
Poular	78,3	9,2	4,7	0,9	6,9	100,0	1 292
Serer	*	*	*	*	*	100,0	13
Mandingue	65,4	20,7	9,2	0,8	3,9	100,0	302
Diola	55,4	22,8	9,4	5,9	6,5	100,0	148
Soninké	84,5	7,0	2,4	0,0	6,0	100,0	38
Autre/non sénégalais	54,4	20,7	10,5	0,9	13,5	100,0	189
Résidence							
Urbain	61,8	16,4	7,8	1,7	12,3	100,0	806
Rural	79,2	10,8	5,3	1,0	3,6	100,0	1 207
Grande Région							
Nord	94,5	1,2	2,1	0,9	1,5	100,0	430
Ouest	47,6	20,8	8,4	2,5	20,6	100,0	419
Centre	60,8	16,7	14,7	1,9	5,9	100,0	147
Sud	74,6	14,4	6,1	0,9	4,0	100,0	1 018
Ensemble	72,2	13,1	6,3	1,3	7,1	100,0	2 013

[1] Inclut les femmes qui ont répondu qu'elles ont été excisées dans la petite enfance, sans être en mesure de donner un âge précis

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 11.4 Prévalence et âge à l'excision des filles de 0-14 ans

Répartition en (%) des filles de 0-14 ans par âge à l'excision et pourcentage de filles excisées selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Âge à l'excision								
Caractéristique sociodémographique	<1	1-4	5-9	10-14	NSP/ Manquant	Pourcentage de filles non excisées	Total	Effectifs de filles	Pourcentage de filles excisées
Âge actuel des filles									
0-4	6,4	2,7	na	na	0,0	90,8	100,0	2 857	9,2
5-9	7,7	6,5	1,0	na	0,0	84,8	100,0	2 588	15,2
10-14	8,6	7,7	1,5	0,0	0,1	82,1	100,0	1 945	17,9
Ensemble	7,4	5,4	0,7	0,0	0,0	86,4	100,0	7 390	13,6

Note : Le statut d'excision des filles est déclaré par la mère.
na : non applicable pour cause de troncature

Tableau 11.5 Excision des filles de 0-14 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère

Pourcentage de filles de 0-14 ans excisées par âge actuel, selon certaines caractéristiques de la mère, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristiques sociodémographiques de la mère	Âge actuel des filles 0-4	5-9	10-14	Ensemble 0-14	Effectif de filles de 0-14 ans
Religion					
Musulman	9,3	15,5	18,3	13,8	7 137
Chrétien	1,5	3,3	4,3	3,0	220
Animiste	*	*	*	(29,8)	33
Ethnie					
Wolof	0,2	0,2	0,2	0,2	2 933
Poular	23,4	36,7	40,7	32,7	2 332
Serer	0,0	0,3	0,6	0,3	1 138
Mandingue	22,2	38,5	45,8	34,4	380
Diola	3,2	19,7	19,7	14,8	178
Soninké	(22,2)	*	*	31,7	46
Autre/non Sénégalais	8,5	21,4	16,3	15,2	383
Résidence					
Urbain	4,5	9,0	12,2	8,2	2 904
Rural	11,9	19,3	21,8	17,0	4 486
Grande Région					
Nord	18,8	24,4	33,1	24,3	1 354
Ouest	1,6	4,0	7,1	4,0	2 554
Centre	0,7	2,4	3,0	1,9	2 251
Sud	28,8	49,9	55,7	43,0	1 230
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	11,4	17,7	21,8	16,6	5 117
Primaire	5,8	11,0	8,3	8,2	1 478
Moyen/secondaire ou plus	4,2	4,1	4,9	4,3	794
Statut d'excision de la mère					
Excisée	32,3	53,0	61,5	47,4	2 072
Non excisée	0,4	0,6	0,2	0,4	4 605
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	20,1	30,3	36,0	27,7	1 732
Second	10,7	17,4	21,1	15,7	1 670
Moyen	6,0	13,0	12,0	10,1	1 387
Quatrième	3,6	5,6	10,1	6,2	1 421
Le plus élevé	0,5	3,7	5,0	2,8	1 180
Ensemble	9,2	15,2	17,9	13,6	7 390

Tableau 11.6 Infibulation parmi les filles excisées âgées de 0-14 ans

Répartition (en %) des filles excisées de 0-14 ans selon que la zone génitale a été fermée par une couture suivant les caractéristiques sociodémographiques des mères, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique de la mère	La zone génitale a été fermée par une couture				
	Oui	Non	NSP/ Manquant	Total	Effectif de filles excisées
Religion					
Musulman	3,8	79,5	16,7	100,0	986
Chrétien	*	*	*	100,0	7
Animiste	*	*	*	100,0	10
Ethnie					
Wolof	*	*	*	100,0	6
Poular	4,1	75,3	20,6	100,0	763
Serer	*	*	*	100,0	3
Mandingue	2,0	96,1	1,9	100,0	131
Diola	(0,0)	(100,0)	(0,0)	100,0	26
Soninké	(4,7)	(72,4)	(22,9)	100,0	14
Autre/non Sénégalais	4,3	94,6	1,0	100,0	58
Résidence					
Urbain	3,2	85,8	11,1	100,0	239
Rural	3,9	77,9	18,2	100,0	764
Grande Région					
Nord	3,9	47,6	48,5	100,0	330
Ouest	(5,0)	(92,9)	(2,2)	100,0	102
Centre	0,0	95,5	4,5	100,0	42
Sud	3,6	96,1	0,2	100,0	529
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	3,8	78,5	17,7	100,0	847
Primaire	3,1	87,9	8,9	100,0	121
Moyen/secondaire ou plus	3,6	83,8	12,5	100,0	34
Excision de la mère					
Mère ayant subi une infibulation	6,7	27,3	66,0	100,0	113
Mère n'ayant pas subi d'infibulation	3,3	86,5	10,2	100,0	870
Mère non excisée	(3,4)	(85,3)	(11,2)	100,0	20
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	3,5	80,6	15,9	100,0	480
Second	4,0	73,7	22,2	100,0	262
Moyen	2,9	82,3	14,8	100,0	140
Quatrième	1,7	92,0	6,3	100,0	88
Le plus élevé	*	*	*	100,0	33
Ensemble	3,7	79,8	16,5	100,0	1 003

Note : Le statut d'excision des filles est déclaré par les mères. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 11.7 Personne qui a procédé à l'excision et type d'excision parmi les filles excisées de 0-14 ans et les femmes de 15-49 ans

Répartition (en %) des filles excisées de 0-14 ans par âge actuel et des femmes excisées de 15-49 ans, selon la personne qui a procédé à l'excision et selon le type d'excision, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristiques démographiques	Âge actuel des filles			Filles excisées de 0-14 ans	Femmes excisées de 15-49 ans
	0-4	5-9	10-14		
Personne qui a procédé à l'excision					
Exciseuse traditionnelle	99,7	99,7	100,0	99,8	92,8
Accoucheuse traditionnelle	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3
Autre praticien traditionnel	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Type d'excision					
Cousu et fermé	4,4	2,6	4,4	3,7	7,1
Non cousu et fermé	79,8	81,9	77,5	79,8	80,0
NSP/manquant	15,8	15,5	18,1	16,5	12,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	262	393	348	1 003	2 013

Note : L'information sur l'excision des filles est basée sur la déclaration de la mère.

Tableau 11.8 Croyance des femmes et des hommes au sujet de l'excision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaissent l'excision et qui ont eu une fille depuis 2000 et pourcentage d'hommes de 15-59 ans connaissant l'excision et d'hommes de 15-59 ans qui connaissent l'excision et qui pensent que l'excision est exigée par la religion, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme					Homme				
Caractéristique démographique	Exigée	Non exigée	NSP/ Manquant	Total	Effectif de femmes qui ont eu une fille depuis 2000 et qui connaissent l'excision	Exigée	Non exigée	NSP/ Manquant	Total	Effectif d'hommes qui connaissent l'excision
Excision de la femme										
Excisée	39,2	55,4	5,4	100,0	1 177	na	na	na	na	na
Non excisée	2,9	91,9	5,1	100,0	2 803	na	na	na	na	na
Groupe d'âges										
15-19	14,7	76,0	9,4	100,0	109	12,3	71,7	16,0	100,0	454
20-24	18,6	76,2	5,2	100,0	429	11,5	67,2	21,3	100,0	490
25-29	13,9	81,0	5,2	100,0	798	13,9	70,2	15,9	100,0	487
30-34	12,7	82,9	4,4	100,0	876	19,2	68,2	12,6	100,0	377
35-39	12,6	81,4	6,0	100,0	764	20,6	63,2	16,2	100,0	327
40-44	13,2	81,9	4,9	100,0	608	16,0	67,1	16,9	100,0	276
45-49	12,6	82,7	4,8	100,0	395	16,1	69,3	14,6	100,0	251
Religion										
Musulman	13,8	81,0	5,2	100,0	3 845	15,7	67,5	16,8	100,0	2 553
Chrétien	7,5	88,0	4,6	100,0	115	2,6	89,0	8,4	100,0	106
Animiste	(24,2)	(69,3)	(6,5)	100,0	19	*	*	*	100,0	3
Ethnie										
Wolof	1,0	94,2	4,8	100,0	1 586	5,0	76,7	18,2	100,0	1 083
Poular	29,9	64,2	5,9	100,0	1 264	32,9	49,3	17,8	100,0	733
Serer	2,3	93,8	3,9	100,0	572	3,4	84,9	11,7	100,0	355
Mandingue	31,9	64,2	3,9	100,0	211	30,6	48,9	20,6	100,0	162
Diola	15,8	82,2	2,0	100,0	117	11,0	80,8	8,2	100,0	122
Soninké	(34,3)	(63,8)	(1,9)	100,0	21	(23,3)	(55,4)	(21,3)	100,0	35
Autre/non Sénégalais	21,0	67,7	11,3	100,0	208	14,4	74,8	10,8	100,0	173
Résidence										
Urbain	10,1	84,4	5,6	100,0	1 805	12,8	70,5	16,7	100,0	1 536
Rural	16,6	78,4	4,9	100,0	2 174	18,5	65,5	16,1	100,0	1 126
Grande Région										
Nord	27,6	69,7	2,7	100,0	669	28,6	53,4	18,0	100,0	438
Ouest	7,0	86,7	6,3	100,0	1 536	10,8	72,7	16,4	100,0	1 255
Centre	3,3	91,7	5,0	100,0	1 071	5,1	79,9	15,0	100,0	549
Sud	30,7	63,8	5,5	100,0	704	27,2	55,9	16,9	100,0	420
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	16,8	77,7	5,5	100,0	2 510	23,2	57,3	19,6	100,0	941
Primaire	8,5	86,5	4,9	100,0	933	11,1	74,4	14,4	100,0	583
Moyen/secondaire ou plus	7,8	87,9	4,3	100,0	536	10,6	74,4	14,9	100,0	1 138
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	24,2	70,0	5,8	100,0	786	27,2	53,8	19,0	100,0	386
Second	18,0	76,2	5,8	100,0	792	16,7	67,2	16,1	100,0	448
Moyen	12,6	82,7	4,7	100,0	774	15,4	70,0	14,6	100,0	512
Quatrième	8,2	87,6	4,2	100,0	855	12,4	73,7	13,8	100,0	624
Le plus élevé	5,6	88,8	5,6	100,0	773	9,8	71,1	19,0	100,0	693
Ensemble 15-49	13,7	81,1	5,2	100,0	3 979	15,2	68,4	16,5	100,0	2 662
50-59	na	na	na	na	na	15,6	64,4	19,9	100,0	363
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	15,2	67,9	16,9	100,0	3 025

Note : Le statut d'excision des filles est déclaré par les mères. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée
na=Non applicable

Tableau 11.9 Avis des femmes et des hommes sur l'abandon de l'excision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaissent l'excision et qui ont eu une fille née depuis 2000 et pourcentage d'hommes de 15-59 ans connaissant l'excision qui pensent que cette pratique doit continuer ou doit être abandonnée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme					Homme				
Caractéristique sociodémographique	Doit continuer	Doit être abandonnée	Ne se prononce pas clairement	Total	Effectif de femme qui ont eu une fille depuis 2000 et qui connaissent l'excision	Doit continuer	Doit être abandonnée	Ne se prononce pas clairement	Total	Effectif d'hommes qui connaissent l'excision
Excision de la femme										
Excisée	51,6	45,8	2,6	100,0	1 177	na	na	na	na	na
Non excisée	2,5	94,5	3,0	100,0	2 803	na	na	na	na	na
Groupe d'âges										
15-19	27,7	66,3	6,0	100,0	109	10,9	83,2	5,9	100,0	454
20-24	25,4	72,8	1,8	100,0	429	8,2	84,8	7,1	100,0	490
25-29	17,8	79,6	2,7	100,0	798	9,7	80,8	9,5	100,0	487
30-34	15,2	81,8	3,0	100,0	876	15,5	78,2	6,3	100,0	377
35-39	17,6	80,0	2,4	100,0	764	11,8	73,2	15,0	100,0	327
40-44	13,3	83,0	3,7	100,0	608	12,4	75,5	12,1	100,0	276
45-49	12,2	84,8	3,0	100,0	395	11,6	76,8	11,5	100,0	251
Religion										
Musulman	17,2	79,9	2,9	100,0	3 845	11,5	79,2	9,3	100,0	2 553
Chrétien	10,2	88,5	1,3	100,0	115	2,0	91,7	6,3	100,0	106
Animiste	(32,9)	(63,1)	(4,0)	100,0	19	*	*	*	100,0	3
Ethnie										
Wolof	2,0	95,2	2,8	100,0	1 586	3,0	91,2	5,8	100,0	1 083
Poular	36,0	60,6	3,4	100,0	1 264	26,8	58,3	14,9	100,0	733
Serer	2,5	95,6	1,9	100,0	572	1,8	93,1	5,0	100,0	355
Mandingue	42,1	55,5	2,4	100,0	211	19,2	71,2	9,6	100,0	162
Diola	21,3	76,2	2,5	100,0	117	5,9	92,7	1,4	100,0	122
Soninké	(50,1)	(45,8)	(4,1)	100,0	21	(8,4)	(73,3)	(18,3)	100,0	35
Autre/non sénégalais	25,1	71,5	3,4	100,0	208	11,5	71,7	16,8	100,0	173
Résidence										
Urbain	10,3	87,6	2,1	100,0	1 805	7,6	82,7	9,7	100,0	1 536
Rural	22,6	73,8	3,5	100,0	2 174	16,0	75,6	8,4	100,0	1 126
Grande Région										
Nord	29,5	67,9	2,6	100,0	669	27,4	63,1	9,6	100,0	438
Ouest	5,5	92,5	2,0	100,0	1 536	5,5	85,1	9,4	100,0	1 255
Centre	5,9	90,3	3,8	100,0	1 071	3,1	90,3	6,5	100,0	549
Sud	47,4	49,0	3,6	100,0	704	21,5	67,1	11,4	100,0	420
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	20,8	75,7	3,5	100,0	2 510	18,1	69,9	12,0	100,0	941
Primaire	12,0	85,9	2,1	100,0	933	9,1	81,4	9,5	100,0	583
Moyen/secondaire ou plus	7,9	90,7	1,4	100,0	536	6,5	86,9	6,5	100,0	1 138
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	33,8	61,5	4,6	100,0	786	23,9	65,0	11,0	100,0	386
Second	24,2	72,0	3,8	100,0	792	15,3	76,0	8,6	100,0	448
Moyen	15,0	82,0	2,9	100,0	774	12,1	81,3	6,6	100,0	512
Quatrième	8,1	90,7	1,1	100,0	855	5,9	81,4	12,7	100,0	624
Le plus élevé	4,4	93,6	2,0	100,0	773	5,4	87,5	7,0*	100,0	693
Ensemble 15-49	17,0	80,1	2,9	100,0	3 979	11,2	79,7	9,1	100,0	2 662
50-59	na	na	na	na	na	10,7	75,4	13,9	100,0	363
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	11,1	79,2	9,7	100,0	3 025

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.
na=Non applicable

NUPTIALITE 12

Tableau 12.1 État matrimonial actuel

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, EDS-Continue, Sénégal 2016

Groupe d'âges	État matrimonial: Célibataire	Marié	Vivant ensemble	Divorcé	Séparé	Veuf	Total	Pourcentage d'enquêtés actuellement en union	Effectif d'enquêtés
FEMME									
Groupe d'âges									
15-19	75,0	24,0	0,4	0,5	0,1	0,0	100,0	24,4	1 998
20-24	38,0	57,7	1,5	2,2	0,5	0,2	100,0	59,2	1 664
25-29	13,8	80,5	0,1	4,9	0,5	0,2	100,0	80,6	1 524
30-34	9,9	82,8	1,0	5,4	0,2	0,6	100,0	83,8	1 318
35-39	4,9	87,7	1,1	5,0	0,0	1,3	100,0	88,8	998
40-44	2,8	87,0	0,6	7,0	0,6	2,0	100,0	87,6	806
45-49	2,1	87,1	0,3	6,5	1,2	2,9	100,0	87,4	557
Ensemble 15-49	28,8	65,6	0,7	3,8	0,4	0,7	100,0	66,4	8 865
HOMME									
Groupe d'âges									
15-19	99,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,6	760
20-24	92,7	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	7,3	581
25-29	69,3	29,4	0,1	1,1	0,0	0,0	100,0	29,6	521
30-34	36,8	62,7	0,0	0,3	0,0	0,2	100,0	62,7	402
35-39	17,2	81,8	0,2	0,7	0,0	0,0	100,0	82,0	349
40-44	8,9	86,3	0,0	3,9	0,2	0,7	100,0	86,3	285
45-49	5,3	88,3	3,5	1,9	0,0	1,0	100,0	91,8	260
Ensemble 15-49	60,2	38,4	0,3	0,8	0,0	0,2	100,0	38,8	3 158
50-59	2,2	94,7	0,0	2,8	0,0	0,3	100,0	94,7	368
Ensemble 15-59	54,2	44,3	0,3	1,0	0,0	0,2	100,0	44,6	3 526

Tableau 12.2.1 Nombre de coépouses

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, par nombre de coépouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Nombre de coépouses				Total	Effectif de femmes
	0	1	2+	Manquant/ NSP		
Groupe d'âges						
15-19	86,3	12,6	1,0	0,1	100,0	487
20-24	81,9	16,4	1,6	0,0	100,0	985
25-29	76,5	20,9	2,5	0,0	100,0	1 228
30-34	68,7	25,8	5,5	0,0	100,0	1 105
35-39	58,1	32,6	9,2	0,0	100,0	886
40-44	53,8	37,2	9,0	0,0	100,0	706
45-49	49,6	33,4	16,2	0,9	100,0	486
Résidence						
Urbain	74,6	20,2	5,0	0,2	100,0	2 455
Rural	65,1	28,7	6,2	0,0	100,0	3 428
Grande Région						
Nord	71,2	24,9	3,8	0,1	100,0	1 081
Ouest	74,3	20,4	5,1	0,2	100,0	2 089
Centre	64,5	27,6	7,9	0,0	100,0	1 795
Sud	63,6	31,4	5,0	0,0	100,0	918
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	63,8	29,5	6,7	0,0	100,0	3 660
Primaire	76,0	20,2	3,5	0,3	100,0	1 296
Moyen/ secondaire ou plus	80,2	14,8	4,9	0,1	100,0	927
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	63,8	32,2	4,0	0,0	100,0	1 247
Second	65,3	28,7	6,0	0,0	100,0	1 188
Moyen	74,2	20,5	5,3	0,0	100,0	1 117
Quatrième	69,4	23,1	7,1	0,4	100,0	1 199
Le plus riche	73,2	20,5	6,3	0,0	100,0	1 132
Total	69,0	25,1	5,7	0,1	100,0	5 883

Tableau 12.2.2 Nombre d'épouses

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, par nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'épouses			Total	Effectif d'hommes
	1	2+	Manquant/ NSP		
Groupe d'âges					
15-19	*	*	*	100,0	5
20-24	(98,8)	(1,2)	(0,0)	100,0	43
25-29	97,0	3,0	0,0	100,0	154
30-34	94,9	5,1	0,0	100,0	252
35-39	87,8	12,2	0,0	100,0	287
40-44	75,0	25,0	0,0	100,0	246
45-49	84,3	15,7	0,0	100,0	238
Résidence					
Urbain	91,2	8,8	0,0	100,0	624
Rural	83,8	16,2	0,0	100,0	602
Grande Région					
Nord	84,7	15,3	0,0	100,0	212
Ouest	93,4	6,6	0,0	100,0	522
Centre	80,2	19,8	0,0	100,0	276
Sud	85,6	14,4	0,0	100,0	215
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	84,6	15,4	0,0	100,0	657
Primaire	90,8	9,2	0,0	100,0	294
Moyen/secondaire ou plus	91,2	8,8	0,0	100,0	275
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	82,4	17,6	0,0	100,0	271
Second	80,0	20,0	0,0	100,0	211
Moyen	92,3	7,7	0,0	100,0	214
Quatrième	88,8	11,2	0,0	100,0	270

Tableau 12.3 Âge à la première union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans par âge exact à la première union et âge médian à la première union selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2016

Âge actuel	Pourcentage en première union avant d'atteindre l'âge exact : 15	18	20	22	25	Pourcentage de célibataires	Effectif d'enquêtés	Age médian à la première union
				FEMME				
Groupe d'âges								
15-19	6,4	na	na	na	na	75,0	1 998	a
20-24	7,9	31,5	46,4	na	na	38,0	1 664	a
25-29	10,7	33,2	51,6	65,1	78,9	13,8	1 524	19,8
30-34	10,9	35,0	50,4	62,4	74,2	9,9	1 318	19,9
35-39	8,9	33,2	48,3	63,4	78,7	4,9	998	20,2
40-44	9,9	34,6	51,5	62,6	74,8	2,8	806	19,8
45-49	10,4	36,7	55,8	70,8	82,4	2,1	557	19,3
20-49	9,7	33,6	49,9	na	na	15,4	6 867	20,0
25-49	10,3	34,3	51,1	64,3	77,4	8,2	5 203	19,9
				HOMME				
Groupe d'âges								
15-19	0,0	na	na	na	na	99,3	760	a
20-24	0,0	0,6	1,5	na	na	92,7	581	a
25-29	0,0	0,9	2,7	5,8	15,1	69,3	521	a
30-34	0,0	3,1	5,7	11,3	20,7	36,8	402	29,7
35-39	0,0	0,8	5,8	9,3	22,5	17,2	349	29,8
40-44	0,0	1,3	4,1	7,2	20,4	8,9	285	29,4
45-49	0,0	0,1	2,8	5,2	11,7	5,3	260	a
20-49	0,0	1,2	3,5	na	na	47,8	2 399	a
25-49	0,0	1,3	4,2	7,8	18,1	33,5	1 817	a
20-59	0,0	1,1	3,4	na	na	41,8	2 766	a
25-59	0,0	1,2	3,9	7,5	18,1	28,2	2 185	a
30-59	0,0	1,3	4,3	8,0	19,1	15,4	1 664	a

Note: L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.
na = Non applicable pour cause de troncature.
a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur conjoint(e)/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 12.4 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Âge médian à la première union des femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et, des hommes de 20-59 ans et de 25-59 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Âge des femmes 20-49	Âge des femmes 25-49	Âge des hommes 30-59
Résidence			
Urbain	a	21,8	a
Rural	18,4	18,4	28,3
Grande Région			
Nord	18,8	18,8	27,6
Ouest	a	21,8	a
Centre	18,9	18,8	29,0
Sud	18,0	17,8	28,9
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	18,3	18,4	28,6
Primaire	a	21,2	a
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	16,9	16,8	26,3
Second	18,3	18,3	29,0
Moyen	a	20,1	a
Quatrième	a	21,3	a
Le plus riche	a	23,2	a
Total	a	19,9	a

Note: L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier conjoint(e)/partenaire.
a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur conjoit(e)/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 12.5 Âge aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2016

Âge actuel	Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif	Age médian aux premiers rapports sexuels
	15	18	20	22	25			
FEMME								
Groupe d'âges								
15-19	6,4	na	na	na	na	74,4	1 998	a
20-24	8,1	33,2	48,1	na	na	35,1	1 664	a
25-29	11,2	36,3	53,2	66,5	79,2	12,0	1 524	19,6
30-34	10,9	37,0	53,7	66,3	77,4	8,7	1 318	19,5
35-39	9,6	36,0	51,0	66,5	80,1	4,3	998	19,9
40-44	10,4	37,2	55,7	64,8	75,7	2,6	806	19,3
45-49	10,7	37,6	57,8	73,0	83,0	1,0	557	19,2
20-49	10,0	35,8	52,4	na	na	13,9	6 867	19,7
25-49	10,6	36,7	53,8	66,9	78,8	7,0	5 203	19,5
15-24	7,2	na	na	na	na	56,6	3 662	a
HOMME								
Groupe d'âges								
15-19	5,1	na	na	na	na	87,8	760	a
20-24	5,2	11,8	21,6	na	na	69,7	581	a
25-29	2,2	10,9	25,9	34,4	52,9	33,6	521	24,3
30-34	3,3	12,6	24,3	43,5	54,6	13,6	402	23,5
35-39	1,6	7,8	18,2	36,7	58,2	6,3	349	23,8
40-44	2,2	20,1	34,4	45,6	58,9	2,5	285	23,1
45-49	0,7	10,6	28,6	51,2	62,1	0,0	260	21,8
20-49	2,9	12,0	24,8	na	na	27,7	2 399	a
25-49	2,1	12,1	25,8	41,0	56,6	14,3	1 817	23,6
15-24	5,2	na	na	na	na	79,9	1 341	a
20-59	2,7	11,5	25,0	na	na	24,1	2 766	a
25-59	2,0	11,4	25,9	41,0	56,3	12,0	2 185	23,6

na = Non applicable pour cause de troncature.
a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 12.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et des hommes de 20-59 ans et de 25-59 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Âge des femmes		Âge des hommes
	20-49	25-49	25-59
Résidence			
Urbain	a	21,2	23,5
Rural	18,3	18,2	23,8
Grande Région			
Nord	18,9	18,8	20,9
Ouest	a	21,4	24,1
Centre	18,9	18,7	a
Sud	17,3	17,1	22,0
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	18,2	18,3	24,6
Primaire	a	20,6	23,1
Moyen/secondaire ou plus	a	24,7	22,9
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	16,8	16,6	22,6
Second	17,9	17,9	23,9
Moyen	19,8	19,7	a
Quatrième	a	20,8	23,5
Le plus riche	a	22,8	23,4
Total	19,7	19,5	23,6

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 12.7.1 Activité sexuelle récente des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels : Au cours des quatre dernières semaines	Au cours de la dernière année[1]	Il y a un an ou plus	N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif de femmes
Groupe d'âges						
15-19	14,4	9,0	2,2	74,4	100,0	1 998
20-24	37,9	19,2	7,8	35,1	100,0	1 664
25-29	54,3	22,1	11,7	12,0	100,0	1 524
30-34	58,2	20,8	12,3	8,7	100,0	1 318
35-39	61,6	23,0	11,2	4,3	100,0	998
40-44	61,9	19,1	16,4	2,6	100,0	806
45-49	62,2	19,3	17,5	1,0	100,0	557
État matrimonial						
Célibataire	1,0	3,7	2,6	92,6	100,0	2 555
Marié ou vivant ensemble	66,8	23,9	8,1	1,2	100,0	5 883
Divorcé/séparé/veuf	3,8	23,1	72,5	0,6	100,0	426
Durée de l'union[2]						
0-4 ans	63,3	27,1	5,0	4,6	100,0	1 411
5-9 ans	65,3	25,5	8,9	0,2	100,0	1 167
10-14 ans	69,1	22,6	8,3	0,0	100,0	980
15-19 ans	69,3	22,4	8,3	0,0	100,0	696
20-24 ans	67,6	23,0	9,4	0,0	100,0	465
25 ans+	73,6	16,7	9,7	0,0	100,0	418
Marié plus d'une fois	66,0	23,3	10,5	0,1	100,0	747
Résidence						
Urbain	40,5	15,2	9,9	34,4	100,0	4 351
Rural	49,0	20,8	9,4	20,9	100,0	4 514
Grande Région						
Nord	46,6	18,9	8,7	25,9	100,0	1 537
Ouest	43,7	14,9	8,1	33,3	100,0	3 559
Centre	47,7	19,7	8,3	24,3	100,0	2 460
Sud	40,4	22,7	17,3	19,7	100,0	1 309
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	56,9	21,0	11,0	11,1	100,0	4 310
Primaire	45,1	19,1	11,6	24,1	100,0	1 967
Moyen/secondaire ou plus	24,4	12,3	5,8	57,4	100,0	2 588
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	55,8	21,8	9,0	13,4	100,0	1 475
Second	47,6	21,9	10,3	20,2	100,0	1 603
Moyen	44,3	17,1	11,2	27,3	100,0	1 749
Quatrième	42,4	15,8	8,8	33,1	100,0	1 991
Le plus riche	37,5	15,3	9,1	38,2	100,0	2 046
Total	44,8	18,0	9,6	27,5	100,0	8 865

[1] Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines.
[2] Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union.

Tableau 12.7.2 Activité sexuelle récente des hommes

Répartition (en %) des hommes en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels : Au cours des quatre dernières semaines	Au cours de la dernière année[1]	Il y a un an ou plus	Manquant	N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif d'hommes
Groupe d'âges							
15-19	2,3	5,1	4,8	0,0	87,8	100,0	760
20-24	7,7	12,9	9,8	0,0	69,7	100,0	581
25-29	26,4	21,2	18,7	0,0	33,6	100,0	521
30-34	51,6	20,0	14,6	0,2	13,6	100,0	402
35-39	59,1	27,6	7,0	0,0	6,3	100,0	350
40-44	69,4	18,3	9,7	0,0	2,5	100,0	285
45-49	76,2	19,7	4,1	0,0	0,0	100,0	260
État matrimonial							
Célibataire	4,0	12,8	13,6	0,0	69,7	100,0	1 903
Marié ou vivant ensemble	75,9	20,5	3,2	0,0	0,4	100,0	1 225
Divorcé/séparé/veuf	(15,2)	(32,7)	(49,8)	(2,3)	(0,0)	100,0	32
Durée de l'union[2]							
0-4 ans	73,1	21,4	4,4	0,0	1,1	100,0	392
5-9 ans	71,5	23,8	4,6	0,0	0,0	100,0	233
10-14 ans	78,1	20,1	1,8	0,0	0,0	100,0	214
15-19 ans	80,5	19,5	0,0	0,0	0,0	100,0	112
20-24 ans	(60,6)	(39,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	27
25 ans+	*	*	*	*	*	100,0	6
Marié plus d'une fois	81,9	15,4	2,5	0,0	0,2	100,0	242
Résidence							
Urbain	29,7	18,3	12,3	0,0	39,7	100,0	1 696
Rural	34,6	13,3	7,1	0,0	45,0	100,0	1 464
Grande Région							
Nord	40,2	14,9	10,8	0,0	34,1	100,0	486
Ouest	29,3	15,6	12,2	0,0	42,8	100,0	1 405
Centre	32,0	12,1	6,5	0,0	49,4	100,0	725
Sud	31,5	23,0	7,7	0,1	37,7	100,0	543
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	45,0	17,0	8,8	0,0	29,2	100,0	1 149
Primaire	33,4	17,2	10,6	0,0	38,8	100,0	704
Moyen/secondaire ou plus	19,7	14,4	10,5	0,1	55,3	100,0	1 306
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	40,5	15,8	5,6	0,0	38,0	100,0	535
Second	32,2	14,3	6,5	0,0	47,0	100,0	581
Moyen	30,0	16,8	11,5	0,0	41,7	100,0	583
Quatrième	31,6	15,9	12,1	0,1	40,3	100,0	700
Le plus riche	27,5	16,9	12,3	0,0	43,3	100,0	759
Ensemble 15-49	32,0	16,0	9,9	0,0	42,1	100,0	3 159
50-59	70,8	22,6	5,6	0,0	1,0	100,0	368
Ensemble 15-59	36,0	16,7	9,4	0,0	37,8	100,0	3 527

Note : Note: Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
[1] Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines.
[2] Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union.

CONNAISSANCE, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS VIS-À-VIS DU VIH/SIDA — 13

Tableau 13.1 Connaissance du sida

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant entendu parler du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme		Homme	
Caractéristique sociodémographique	A entendu parler du sida	Effectif d'enquêtés	A entendu parler du sida	Effectif d'enquêtés
Groupe d'âges				
15-24	90,7	3 662	94,8	1 341
15-19	88,6	1 998	92,4	760
20-24	93,2	1 664	97,9	581
25-29	95,3	1 524	98,4	521
30-39	95,0	2 316	99,0	752
40-49	95,6	1 362	99,6	545
État matrimonial				
Célibataire	93,3	2 555	96,1	1 903
A déjà eu des rapports sexuels	91,2	188	99,3	576
N'a jamais eu de rapports sexuels	93,5	2 367	94,8	1 326
En union	93,2	5 883	98,9	1 225
En rupture d'union	95,6	426	(98,1)	32
Résidence				
Urbain	97,7	4 351	99,6	1 696
Rural	89,2	4 514	94,5	1 464
Grande Région				
Nord	91,3	1 537	98,0	486
Ouest	98,4	3 559	99,5	1 405
Centre	93,6	2 460	95,2	725
Sud	81,8	1 309	93,2	543
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	90,0	4 310	94,6	1 149
Primaire	94,4	1 967	96,9	704
Moyen/secondaire ou plus	98,2	2 588	99,7	1 306
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	81,8	1 475	90,5	535
Second	90,1	1 603	96,1	581
Moyen	96,0	1 749	98,0	583
Quatrième	97,7	1 991	99,7	700
Le plus riche	97,7	2 046	99,9	759
Ensemble 15-49	93,4	8 865	97,2	3 159
50-59	na	na	99,3	368
Ensemble 15-59	na	na	97,4	3 527

na = Non applicable

Tableau 13.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, ont déclaré que l'on pouvait réduire les risques de contracter le virus du sida en utilisant des condoms à chaque rapport sexuel, et en se limitant à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a pas d'autres partenaires selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Femme				Homme			
	Utilisant des condoms[1]	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté[2]	Utilisant des condoms et limitant les rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté[1,2]	Effectif de femmes	Utilisant des condoms[1]	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté[2]	Utilisant des condoms et limitant les rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté[1,2]	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-24	55,7	77,6	52,2	3 662	72,7	83,3	68,7	1 341
15-19	48,8	74,2	45,5	1 998	63,4	77,6	59,8	760
20-24	64,0	81,6	60,1	1 664	84,8	90,7	80,4	581
25-29	63,6	84,8	61,5	1 524	85,4	94,0	83,1	521
30-39	67,3	86,5	65,0	2 316	85,6	93,4	82,8	752
40-49	70,0	87,5	68,5	1 362	87,1	95,9	84,7	545
État matrimonial								
Célibataire	60,6	82,2	57,5	2 555	78,9	86,6	75,4	1 903
A déjà eu des rapports sexuels	73,2	83,9	68,3	188	91,4	95,1	89,9	576
N'a jamais eu de rapports sexuels	59,6	82,0	56,6	2 367	73,4	82,9	69,0	1 326
En union	62,1	82,3	59,5	5 883	82,8	94,0	80,2	1 225
En rupture d'union	75,0	90,8	74,0	426	(74,2)	(98,1)	(74,2)	32
Résidence								
Urbain	76,7	91,5	74,2	4 351	88,6	92,9	85,3	1 696
Rural	48,4	74,2	45,6	4 514	70,8	85,8	67,8	1 464
Grande Région								
Nord	35,3	63,7	31,1	1 537	74,1	96,0	73,3	486
Ouest	80,7	95,2	79,1	3 559	90,0	94,0	86,8	1 405
Centre	56,5	81,3	53,7	2 460	71,2	85,9	67,3	725
Sud	54,8	73,4	51,4	1 309	73,2	77,6	69,1	543
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	49,9	75,9	47,6	4 310	69,8	87,5	67,5	1 149
Primaire	70,3	86,9	67,9	1 967	82,2	88,1	78,9	704
Moyen/secondaire ou plus	76,7	90,7	73,4	2 588	88,7	92,3	84,8	1 306
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	39,5	66,7	37,3	1 475	59,9	79,6	56,8	535
Second	52,5	76,3	49,2	1 603	72,9	85,6	69,4	581
Moyen	63,3	85,4	60,8	1 749	82,3	91,7	79,8	583
Quatrième	70,6	88,4	67,6	1 991	88,7	94,8	86,7	700
Le plus riche	77,4	91,3	75,2	2 046	91,3	93,4	86,9	759
Ensemble 15-49	62,3	82,7	59,6	8 865	80,3	89,6	77,2	3 159
50-59	na	na	na	na	76,1	95,4	74,9	368
Ensemble 15-59	na	na	na	na	79,9	90,2	77,0	3 527

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
na = Non applicable
[1] En utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel.
[2] Un partenaire qui n'a pas d'autre partenaire.

Tableau 13.3.1 Connaissance approfondie du sida : Femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant déclaré qu'une personne paraissant en bonne santé pouvait avoir le virus du sida et qui, en réponse à des questions déterminées, rejettent, de manière correcte, les idées locales erronées sur la transmission ou la prévention du virus du sida et pourcentage ayant une connaissance considérée comme approfondie du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enquêtés qui déclarent que : Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Le virus du sida ne peut être transmis par les piqûres de moustiques	Le virus sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'une personne qui a sida	Pourcentage sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida et rejetant les deux idées locales erronées les plus courantes[1]	Pourcentage ayant une connaissance "approfondie" du sida[2]	Effectif de femmes
Groupe d'âges							
15-24	62,2	51,3	81,4	71,0	33,8	25,7	3 662
15-19	57,7	48,6	77,8	66,3	30,4	21,7	1 998
20-24	67,6	54,6	85,8	76,7	37,8	30,5	1 664
25-29	67,1	50,0	87,4	76,4	35,1	28,8	1 524
30-39	70,1	53,4	88,6	79,0	39,2	32,7	2 316
40-49	71,9	50,8	89,2	79,0	37,0	30,7	1 362
État matrimonial							
Célibataire	67,0	60,4	86,3	79,2	42,5	33,6	2 555
A déjà eu des rapports sexuels	56,5	67,0	83,6	73,1	39,5	32,7	188
N'a jamais eu de rapports sexuels	67,8	59,8	86,5	79,7	42,7	33,7	2 367
En union	65,8	47,6	85,0	73,0	32,6	26,1	5 883
En rupture d'union	74,8	53,1	88,6	82,9	42,0	37,3	426
Résidence							
Urbain	79,3	61,3	93,8	87,5	49,1	41,9	4 351
Rural	54,3	42,2	77,6	63,4	23,2	16,2	4 514
Grande Région							
Nord	45,2	44,3	83,7	68,5	22,5	12,7	1 537
Ouest	85,2	58,9	95,2	88,7	50,5	44,5	3 559
Centre	64,3	48,7	83,7	73,5	31,7	23,5	2 460
Sud	45,4	45,5	64,9	50,0	19,9	15,0	1 309
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	57,8	38,1	78,9	64,7	22,7	16,3	4 310
Primaire	70,2	55,8	89,0	80,1	39,0	32,4	1 967
Moyen/secondaire ou plus	78,4	70,7	93,8	89,1	55,7	46,9	2 588
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	44,4	32,2	63,7	43,1	12,9	8,5	1 475
Second	55,6	42,4	78,3	63,3	23,1	16,2	1 603
Moyen	67,8	52,4	90,4	81,1	34,7	26,6	1 749
Quatrième	75,8	57,5	93,4	87,3	44,4	36,4	1 991
Le plus riche	81,2	66,2	95,1	91,1	55,4	47,8	2 046
Ensemble 15-49	66,6	51,6	85,5	75,2	35,9	28,8	8 865

[1] Les deux idées erronées les plus fréquemment citées : le virus du sida peut être transmis par des piqûres de moustique et en partageant ses repas avec une personne ayant le sida.
[2] Sont considérées comme ayant une connaissance "approfondie", les femmes qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le virus du sida, celles qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du sida et celles qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du virus du sida.

Tableau 13.3.2 Connaissance approfondie du sida : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant déclaré qu'une personne paraissant en bonne santé pouvait avoir le virus du sida et qui, en réponse à des questions déterminées, rejettent, de manière correcte, les idées locales erronées sur la transmission ou la prévention du virus du sida et pourcentage ayant une connaissance considérée comme approfondie du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage d'enquêtés qui déclarent que :						
Caractéristique sociodémographique	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Le virus du sida ne peut être transmis par les piqûres de moustiques	Le virus sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'une personne qui a sida	Pourcentage sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida et rejetant les deux idées locales erronées les plus courantes[1]	Pourcentage ayant une connaissance "approfondie" du sida[2]	Effectif d'hommes
Groupe d'âges							
15-24	69,1	53,1	84,0	67,6	36,1	32,4	1 341
15-19	62,8	48,4	78,9	58,7	28,2	24,9	760
20-24	77,3	59,2	90,7	79,3	46,3	42,2	581
25-29	82,5	55,9	91,3	72,8	44,7	42,3	521
30-39	78,2	49,2	89,0	71,3	37,7	34,8	752
40-49	80,6	56,2	91,2	79,3	46,6	41,3	545
État matrimonial							
Célibataire	74,0	56,4	86,6	72,1	41,7	38,5	1 903
A déjà eu des rapports sexuels	85,7	56,6	93,4	76,8	45,8	43,8	576
N'a jamais eu de rapports sexuels	68,9	56,3	83,6	70,0	39,9	36,2	1 326
En union	77,5	48,1	89,1	69,8	36,3	32,6	1 225
En rupture d'union	(86,3)	(52,9)	(91,4)	(88,5)	(50,6)	(30,5)	32
Résidence							
Urbain	83,2	63,6	92,7	80,5	50,1	46,1	1 696
Rural	66,6	41,1	81,8	60,7	27,6	24,6	1 464
Grande Région							
Nord	80,2	43,5	92,0	60,8	34,1	30,8	486
Ouest	84,8	62,8	93,7	78,8	49,5	45,4	1 405
Centre	67,4	42,6	79,6	63,3	27,9	24,5	725
Sud	57,9	51,1	78,6	72,3	34,9	32,4	543
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	64,1	27,0	78,7	52,6	16,8	14,8	1 149
Primaire	74,5	50,7	87,3	71,9	36,2	33,7	704
Moyen/secondaire ou plus	86,0	77,6	95,6	87,6	61,7	56,2	1 306
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	51,6	29,5	71,2	44,9	13,6	12,2	535
Second	68,3	41,0	83,5	63,0	27,1	23,4	581
Moyen	77,4	54,1	90,1	76,1	41,3	38,5	583
Quatrième	84,4	58,2	91,4	79,4	45,7	42,8	700
Le plus riche	88,0	73,9	97,0	85,3	61,0	54,9	759
Ensemble 15-49	75,5	53,2	87,6	71,4	39,7	36,1	3 159
50-59	76,9	41,5	87,5	68,5	32,6	30,6	368
Ensemble 15-59	75,6	52,0	87,6	71,1	39,0	35,6	3 527

Note: Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
[1] Les deux idées erronées les plus fréquemment citées: le virus du sida peut être transmis par des piqûres de moustique et en partageant ses repas avec une personne ayant le sida.
[2] Sont considérés comme ayant une connaissance "approfondie", les hommes qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le virus du sida, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du sida et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du virus du sida.

Tableau 13.4 Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant par l'allaitement et que le risque de transmission maternelle du VIH à l'enfant peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère durant la grossesse, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme				Homme			
Caractéristique sociodémographique	Le VIH peut être transmis en allaitant	Le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère pendant la grossesse	Le VIH peut être transmis en allaitant et le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère pendant la grossesse	Effectif de femmes	Le VIH peut être transmis en allaitant	Le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère pendant la grossesse	Le VIH peut être transmis en allaitant et le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère pendant la grossesse	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-24	41,8	38,3	27,7	3 662	53,0	42,0	30,5	1 341
15-19	43,3	35,9	26,6	1 998	53,2	36,4	28,8	760
20-24	40,0	41,0	29,0	1 664	52,9	49,3	32,7	581
25-29	42,2	42,3	30,2	1 524	50,3	45,9	32,2	521
30-39	40,3	42,6	28,9	2 316	47,4	42,0	28,7	752
40-49	39,5	40,2	26,4	1 362	49,7	50,8	30,4	545
État matrimonial								
Célibataire	39,0	39,8	27,2	2 555	52,2	43,0	30,2	1 903
A déjà eu des rapports sexuels	49,2	43,2	38,2	188	55,5	51,2	36,1	576
N'a jamais eu de rapports sexuels	38,2	39,5	26,3	2 367	50,8	39,5	27,6	1 326
En union	42,5	40,7	29,3	5 883	48,3	45,5	30,2	1 225
En rupture d'union	34,0	39,8	20,6	426	(49,8)	(58,2)	(40,5)	32
Actuellement enceinte								
Enceinte	49,4	44,6	34,0	786	na	na	na	na
Non enceinte ou pas sûre	40,3	40,0	27,7	8 079	na	na	na	na
Résidence								
Urbain	38,2	42,9	28,7	4 351	49,2	44,4	27,8	1 696
Rural	43,9	38,0	27,8	4 514	52,3	43,8	33,2	1 464
Grande Région								
Nord	40,0	31,6	22,2	1 537	54,2	57,3	39,1	486
Ouest	37,4	43,0	28,0	3 559	50,5	40,1	24,4	1 405
Centre	41,2	41,8	28,9	2 460	49,2	40,9	29,0	725
Sud	52,3	41,0	34,7	1 309	49,8	47,1	39,4	543
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	41,6	36,2	25,8	4 310	46,6	33,9	25,1	1 149
Primaire	38,3	39,1	27,7	1 967	53,9	42,8	30,5	704
Moyen/secondaire ou plus	42,4	48,3	32,8	2 588	52,5	53,9	34,8	1 306
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	49,0	32,8	26,5	1 475	49,2	35,1	30,2	535
Second	46,5	40,7	31,7	1 603	53,8	43,8	34,1	581
Moyen	40,5	42,3	28,1	1 749	55,1	51,1	35,1	583
Quatrième	37,1	41,4	27,4	1 991	49,9	48,0	29,2	700
Le plus riche	35,6	43,0	27,8	2 046	46,6	41,9	24,9	759
Ensemble 15-49	41,1	40,4	28,3	8 865	50,7	44,2	30,3	3 159
50-59	na	na	na	na	56,0	43,9	31,6	368
Ensemble 15-59	na	na	na	na	51,2	44,1	30,4	3 527

Note: Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
na = Non applicable

Tableau 13.5.1 Attitudes de tolérance à l'égard des personnes vivant avec le VIH/sida : Femmes

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant entendu parler du sida, pourcentage exprimant, dans des situations déterminées, des attitudes de tolérance à l'égard des personnes vivant avec le VIH/sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage d'enquêtés qui :					
Caractéristique sociodémographique	Seraient prêtes à s'occuper à la maison d'un parent ayant le sida	Achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le virus du sida	Pensent qu'une enseignante vivant avec le virus du sida mais qui n'est pas malade devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Pensent qu'il n'est pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la famille ayant le virus du sida	Pourcentage exprimant les quatre attitudes de tolérance	Effectif d'enquêtés ayant entendu parler du sida
Groupe d'âges						
15-24	78,4	46,2	57,1	9,6	1,1	3 322
15-19	77,3	41,6	52,3	10,2	1,0	1 771
20-24	79,6	51,4	62,6	8,9	1,3	1 551
25-29	77,3	48,7	55,4	9,0	0,4	1 452
30-39	78,3	47,1	56,5	9,0	0,6	2 201
40-49	78,5	47,4	60,6	9,1	0,7	1 302
État matrimonial						
Célibataire	85,9	56,9	65,8	7,6	1,4	2 384
A déjà eu des rapports sexuels	85,6	58,4	71,3	9,9	1,0	171
N'a jamais eu de rapports sexuels	85,9	56,7	65,4	7,5	1,4	2 213
En union	74,4	41,7	52,3	10,3	0,6	5 485
En rupture d'union	84,5	61,4	71,4	5,4	0,5	408
Résidence						
Urbain	88,6	60,5	70,4	4,9	1,0	4 249
Rural	67,3	32,9	43,2	13,8	0,5	4 028
Grande Région						
Nord	51,4	33,1	40,9	12,9	1,0	1 404
Ouest	92,9	62,4	72,1	2,4	0,7	3 501
Centre	75,4	39,2	49,8	8,9	0,4	2 302
Sud	71,1	32,0	45,5	27,8	1,8	1 070
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	67,8	30,8	43,0	13,2	0,4	3 878
Primaire	84,4	55,1	63,1	5,1	0,5	1 857
Moyen/secondaire ou plus	89,6	66,1	74,5	6,3	1,7	2 543
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	56,9	16,8	26,2	24,3	0,3	1 207
Second	70,3	31,6	41,6	13,6	0,6	1 444
Moyen	79,5	46,2	58,3	6,5	0,5	1 680
Quatrième	83,6	57,5	68,1	5,4	1,0	1 946
Le plus riche	90,4	67,1	75,4	3,2	1,3	1 999
Ensemble 15-49	78,2	47,1	57,2	9,3	0,8	8 277

Tableau 13.5.2 Attitudes de tolérance à l'égard des personnes vivant avec le VIH/sida: Hommes

Parmi les hommes de 15-49 ans ayant entendu parler du sida, pourcentage exprimant des attitudes de tolérance, dans des situations déterminées, à l'égard des personnes vivant avec le VIH/sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage d'enquêtés qui :					
Caractéristique sociodémographique	Seraient prêtes à s'occuper à la maison d'un parent ayant le sida	Achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le virus du sida	Pensent qu'une enseignante vivant avec le virus du sida mais qui n'est pas malade devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Pensent qu'il n'est pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la famille ayant le virus du sida	Pourcentage exprimant les quatre attitudes de tolérance	Effectif d'enquêtés ayant entendu parler du sida
Groupe d'âges						
15-24	89,7	37,1	48,5	16,8	1,7	1 271
15-19	87,1	29,0	41,5	20,0	1,4	702
20-24	93,0	47,0	57,0	13,0	2,0	569
25-29	94,7	50,6	61,2	20,4	7,4	513
30-39	93,5	46,6	53,8	20,1	2,7	744
40-49	92,5	48,5	60,4	17,4	5,8	543
État matrimonial						
Célibataire	92,6	43,3	54,4	15,9	2,7	1 829
A déjà eu des rapports sexuels	95,7	48,1	58,6	18,0	3,5	572
N'a jamais eu de rapports sexuels	91,2	41,1	52,5	14,9	2,4	1 257
En union	91,0	44,4	53,2	22,1	5,0	1 212
En rupture d'union	(95,2)	(38,2)	(59,5)	(14,0)	(0,0)	31
Résidence						
Urbain	97,2	55,1	65,4	15,2	5,0	1 688
Rural	85,5	29,8	40,1	22,1	1,9	1 383
Grande Région						
Nord	73,6	38,7	43,1	30,3	2,2	477
Ouest	99,1	55,0	68,5	16,2	5,5	1 398
Centre	91,9	34,2	45,4	15,9	2,1	690
Sud	89,5	29,8	35,9	16,3	1,7	506
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	85,7	25,2	33,6	24,5	1,5	1 087
Primaire	91,9	38,6	48,7	16,4	1,6	682
Moyen/secondaire ou plus	97,2	61,7	73,8	14,2	6,4	1 302
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	77,9	14,8	23,2	28,9	1,2	484
Second	89,9	26,4	37,9	20,5	1,6	559
Moyen	93,4	45,9	52,6	16,6	3,2	571
Quatrième	94,9	55,3	62,8	16,1	3,2	699
Le plus riche	98,7	62,4	78,4	13,4	7,3	759
Ensemble 15-49	92,0	43,7	54,0	18,3	3,6	3 071
50-59	90,5	32,8	53,6	18,5	1,9	365
Ensemble 15-59	91,8	42,5	54,0	18,3	3,4	3 436

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées entre 25-49 cas non pondérés.

Tableau 13.6 Opinion sur la négociation de rapports sexuels protégés avec le conjoint

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes et pourcentage qui pensent qu'il est justifié qu'une femme qui sait que son conjoint a une infection sexuellement transmissible (IST) demande à utiliser un condom au cours des rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme			Homme		
Caractéristique sociodémographique	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes	Demande à son conjoint d'utiliser un condom au cours des rapports sexuels si elle sait qu'il a une IST	Effectif de femmes	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes	Demande à son conjoint d'utiliser un condom au cours des rapports sexuels si elle sait qu'il a une IST	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-24	44,1	66,4	3 662	58,8	67,2	1 341
15-19	40,3	60,2	1 998	57,0	57,7	760
20-24	48,5	73,7	1 664	61,3	79,7	581
25-29	44,0	76,0	1 524	53,9	86,2	521
30-39	45,9	79,2	2 316	60,8	89,2	752
40-49	44,2	81,3	1 362	57,4	91,8	545
État matrimonial						
Célibataire	44,6	68,1	2 555	57,6	74,2	1 903
A déjà eu des rapports sexuels	43,5	78,1	188	58,5	91,4	576
N'a jamais eu de rapports sexuels	44,7	67,3	2 367	57,2	66,8	1 326
En union	44,4	75,2	5 883	59,2	88,3	1 225
En rupture d'union	46,2	85,0	426	(59,0)	(90,1)	32
Résidence						
Urbain	48,1	83,7	4 351	61,8	88,3	1 696
Rural	41,1	63,9	4 514	54,1	70,0	1 464
Grande Région						
Nord	42,9	57,4	1 537	80,8	82,9	486
Ouest	46,6	87,5	3 559	65,2	90,5	1 405
Centre	43,0	68,7	2 460	50,0	69,0	725
Sud	43,8	64,5	1 309	31,2	64,0	543
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	41,2	65,7	4 310	56,8	72,1	1 149
Primaire	42,6	77,3	1 967	56,3	80,1	704
Moyen/secondaire ou plus	51,7	84,1	2 588	60,6	86,4	1 306
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	39,2	54,1	1 475	52,2	61,6	535
Second	40,0	66,1	1 603	48,6	67,5	581
Moyen	44,8	74,4	1 749	57,7	81,6	583
Quatrième	44,7	80,8	1 991	60,0	90,3	700
Le plus riche	51,7	86,0	2 046	68,7	91,0	759
Ensemble 15-49	44,6	73,7	8 865	58,2	79,8	3 159
50-59	na	na	na	57,2	86,4	368
Ensemble 15-59	na	na	na	58,1	80,5	3 527

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées entre 25-49 cas non pondérés.
na = Non applicable

Tableau 13.7 Adultes favorables à l'enseignement de l'utilisation du condom en tant que moyen de prévention du sida

Pourcentage de femmes et d'hommes de 18-49 ans qui pensent que l'on devrait enseigner aux jeunes de 12-14 ans l'utilisation du condom comme moyen de prévention du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme		Homme	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage favorable	Effectif	Pourcentage favorable	Effectif
Groupe d'âges				
18-24	31,7	2 493	32,4	853
18-19	29,5	829	28,5	271
20-24	32,8	1 664	34,3	581
25-29	34,4	1 524	36,3	521
30-39	32,2	2 316	33,4	752
40-49	35,0	1 362	30,9	545
État matrimonial				
Célibataire	35,5	1 567	36,4	1 414
Marié ou vivant ensemble	31,7	5 706	29,1	1 225
Divorcé/séparé/veuf	40,2	422	(47,6)	32
Résidence				
Urbain	36,4	3 814	35,7	1 497
Rural	29,6	3 882	29,9	1 173
Grande Région				
Nord	24,0	1 326	25,3	400
Ouest	35,4	3 151	35,4	1 241
Centre	33,3	2 098	32,6	581
Sud	36,1	1 121	34,7	449
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	29,5	3 993	21,9	1 033
Primaire	33,2	1 720	28,3	605
Moyen/secondaire ou plus	39,8	1 982	47,3	1 033
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	26,5	1 264	27,1	432
Second	33,1	1 373	29,1	470
Moyen	34,3	1 518	32,0	485
Quatrième	34,0	1 734	31,6	618
Le plus riche	35,2	1 806	42,2	665
Ensemble 18-49	33,0	7 695	33,2	2 671
50-59	na	na	24,5	368
Ensemble 18-59	na	na	32,1	3 038

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées entre 25-49 cas non pondérés.
na = Non applicable

Tableau 13.8 Partenaires sexuelles multiples : Homme

Parmi tous les hommes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois; parmi ces hommes, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie pour les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi tous les hommes		Parmi les hommes ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois		Parmi les hommes qui ont déjà eu des rapports sexuels[1] :	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé durant les derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-24	1,2	1 341	(58,2)	17	3,0	268
15-19	0,6	760	*	5	3,9	92
20-24	2,0	581	*	12	2,6	176
25-29	4,0	521	*	21	3,7	343
30-39	8,2	752	6,8	62	7,0	657
40-49	18,7	545	0,0	102	9,0	520
État matrimonial						
Célibataire	1,7	1 903	(65,6)	31	7,6	572
Marié ou vivant ensemble	13,6	1 225	1,4	166	5,6	1 186
Divorcé/séparé/veuf	(9,8)	32	*	3	(12,4)	30
Type d'union						
Union polygame	93,8	152	0,0	143	5,9	150
Union non polygame	2,2	1 073	(10,0)	24	5,6	1 036
Non actuellement en union	1,8	1 934	(61,3)	35	7,9	602
Résidence						
Urbain	4,9	1 696	17,6	83	8,3	997
Rural	8,1	1 464	7,6	118	3,9	792
Grande Région						
Nord	11,8	486	11,6	57	4,7	320
Ouest	3,2	1 405	*	45	9,4	795
Centre	8,7	725	8,5	63	4,2	356
Sud	6,7	543	14,1	36	2,9	319
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	9,6	1 149	1,7	110	3,9	797
Primaire	5,1	704	(9,0)	36	6,7	424
Moyen/secondaire ou plus	4,2	1 306	33,4	55	9,6	567
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	9,4	535	4,0	50	3,4	324
Second	8,1	581	3,7	47	4,1	300
Moyen	5,7	583	(22,5)	33	5,5	332
Quatrième	5,9	700	(14,5)	41	6,7	415
Le plus riche	3,8	759	*	29	10,7	418
Ensemble 15-49	6,4	3 159	11,7	201	6,4	1 789
50-59	29,6	368	0,0	109	8,0	352
Ensemble 15-59	8,8	3 527	7,6	310	6,6	2 141

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés
et qu'elle a été supprimée.
[1] Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont donné des réponses non numériques.

Tableau 13.9.1 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent où se rendre pour effectuer un test du VIH ; répartition (en %) des femmes de 15-49 ans selon qu'elles ont effectué, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test ; pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant déjà effectué un test du VIH et pourcentage de celles ayant effectué un test au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage sachant où se rendre pour effectuer un test du VIH	Répartition (en %) des femmes selon qu'elles ont effectué, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test				Pourcentage ayant déjà effectué un test	Pourcentage ayant effectué un test au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif de femmes
		A effectué un test et a reçu le résultat	A effectué un test mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais effectué de test[1]	Total			
Groupe d'âges								
15-24	71,6	26,0	2,3	71,7	100,0	28,3	8,3	3 662
15-19	65,9	15,4	1,7	82,9	100,0	17,1	6,5	1 998
20-24	78,3	38,7	3,1	58,2	100,0	41,8	10,6	1 664
25-29	83,5	50,6	3,1	46,3	100,0	53,7	15,5	1 524
30-39	82,6	51,6	2,3	46,1	100,0	53,9	13,1	2 316
40-49	81,8	44,6	1,2	54,3	100,0	45,7	7,4	1 362
État matrimonial								
Célibataire	74,6	19,4	1,5	79,1	100,0	20,9	5,3	2 555
A déjà eu des rapports sexuels	87,0	57,2	3,6	39,2	100,0	60,8	13,3	188
N'a jamais eu de rapports sexuels	73,7	16,4	1,3	82,3	100,0	17,7	4,7	2 367
En union	79,1	47,9	2,6	49,4	100,0	50,6	13,2	5 883
En rupture d'union	84,4	48,9	2,1	48,9	100,0	51,1	8,2	426
Résidence								
Urbain	86,7	47,3	1,9	50,8	100,0	49,2	12,3	4 351
Rural	69,8	32,5	2,6	64,9	100,0	35,1	9,1	4 514
Grande Région								
Nord	63,6	21,2	3,4	75,4	100,0	24,6	6,5	1 537
Ouest	88,8	48,6	1,7	49,8	100,0	50,2	11,9	3 559
Centre	75,7	38,5	2,6	58,9	100,0	41,1	11,0	2 460
Sud	70,5	40,0	2,1	57,9	100,0	42,1	11,5	1 309
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	70,4	35,1	2,0	62,8	100,0	37,2	8,4	4 310
Primaire	81,2	45,6	2,2	52,1	100,0	47,9	12,2	1 967
Moyen/secondaire ou plus	88,4	43,0	2,7	54,3	100,0	45,7	13,2	2 588
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	59,1	25,6	2,8	71,6	100,0	28,4	7,8	1 475
Second	72,4	36,8	2,8	60,4	100,0	39,6	9,6	1 603
Moyen	81,9	42,9	2,7	54,4	100,0	45,6	12,8	1 749
Quatrième	84,1	44,0	1,7	54,4	100,0	45,6	10,7	1 991
Le plus riche	86,9	45,5	1,7	52,8	100,0	47,2	11,8	2 046
Ensemble 15-49	78,1	39,8	2,3	58,0	100,0	42,0	10,7	8 865

[1] Y compris : Ne sait pas/Manquant.

Tableau 13.9.2 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui savent où se rendre pour effectuer un test du VIH ; répartition (en %) des hommes de 15-49 ans selon qu'ils ont effectué, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test ; pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant déjà effectué un test du VIH et pourcentage de ceux ayant effectué un test au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage sachant où se rendre pour effectuer un test du VIH	Répartition (en %) des femmes selon qu'elles ont effectué, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test			Total	Pourcentage ayant déjà effectué un test	Pourcentage ayant effectué un test au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif d'hommes
		A effectué un test et a reçu le résultat	A effectué un test mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais effectué de test[1]				
Groupe d'âges								
15-24	40,2	13,3	1,4	85,3	100,0	14,7	4,2	1 341
15-19	30,6	8,1	1,1	90,7	100,0	9,3	2,3	760
20-24	52,7	20,0	1,8	78,1	100,0	21,9	6,6	581
25-29	61,4	29,3	1,0	69,7	100,0	30,3	8,1	521
30-39	54,1	18,1	0,9	80,9	100,0	19,1	5,7	752
40-49	61,9	29,3	1,5	69,2	100,0	30,8	9,4	545
État matrimonial								
Célibataire	49,0	17,7	1,2	81,2	100,0	18,8	5,2	1 903
A déjà eu des rapports sexuels	65,9	26,0	0,9	73,1	100,0	26,9	8,1	576
N'a jamais eu de rapports sexuels	41,7	14,1	1,3	84,6	100,0	15,4	4,0	1 326
En union	53,0	22,9	1,4	75,7	100,0	24,3	7,5	1 225
En rupture d'union	(65,2)	(33,8)	(0,0)	(66,2)	100,0	(33,8)	(1,5)	32
Résidence								
Urbain	59,6	25,1	0,9	74,0	100,0	26,0	8,1	1 696
Rural	40,4	13,8	1,7	84,5	100,0	15,5	3,7	1 464
Grande Région								
Nord	48,7	18,4	1,2	80,4	100,0	19,6	6,0	486
Ouest	55,4	22,7	0,4	76,9	100,0	23,1	6,8	1 405
Centre	46,6	15,9	2,1	82,0	100,0	18,0	4,3	725
Sud	46,1	18,9	2,5	78,6	100,0	21,4	6,7	543
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	31,9	10,1	1,5	88,3	100,0	11,7	3,1	1 149
Primaire	47,9	17,1	0,6	82,3	100,0	17,7	5,2	704
Moyen/secondaire ou plus	68,9	29,9	1,4	68,7	100,0	31,3	9,2	1 306
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	25,1	8,2	1,8	90,0	100,0	10,0	3,2	535
Second	41,5	14,2	1,4	84,3	100,0	15,7	3,9	581
Moyen	55,2	23,0	1,7	75,3	100,0	24,7	6,2	583
Quatrième	59,0	26,4	1,4	72,2	100,0	27,8	7,3	700
Le plus riche	64,8	24,0	0,2	75,8	100,0	24,2	8,6	759
Ensemble 15-49	50,7	19,9	1,3	78,9	100,0	21,1	6,1	3 159
50-59	50,3	18,2	0,8	81,0	100,0	19,0	3,2	368
Ensemble 15-59	50,7	19,7	1,2	79,1	100,0	20,9	5,8	3 527

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées entre 25-49 cas non pondérés.
[1] Y compris : Ne sait pas/Manquant.

Tableau 13.10 Femmes enceintes conseillées et ayant effectué un test du VIH

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des deux années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH avant le test, pourcentage ayant effectué un test du VIH pendant une visite prénatale pour la naissance la plus récente selon qu'elles ont reçu ou non le résultat du test et qu'elles ont reçu ou non des conseils après le test; pourcentage ayant effectué un test du VIH au cours d'une visite prénatale ou au moment de l'accouchement pour la naissance la plus récente selon qu'elles ont reçu ou non le résultat du test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH au cours d'une visite prénatale[1]	Pourcentage ayant effectué un test du VIH durant une visite prénatale et qui :			Pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH, ayant effectué un test du VIH au cours d'une visite prénatale et ayant reçu le résultat	Pourcentage ayant effectué un test du VIH au cours d'une visite prénatale ou au moment de l'accouchement et qui :[2]		Effectif de femmes ayant eu une naissance au cours des deux dernières années[3]
		Ont reçu le résultat et des conseils après le test	Ont reçu le résultat et n'ont pas reçu des conseils après le test	N'ont pas reçu le résultat du test		A reçu les résultats	N'a pas reçu les résultats	
Groupe d'âges								
15-24	23,9	35,0	12,1	2,1	20,1	47,2	2,1	753
15-19	20,6	27,8	11,2	2,9	15,8	39,5	2,9	204
20-24	25,2	37,6	12,4	1,8	21,7	50,0	1,8	548
25-29	29,4	41,4	12,6	2,2	24,3	54,1	2,2	643
30-39	29,8	44,4	9,2	1,5	24,2	53,6	1,5	773
40-49	36,0	50,1	6,6	1,1	33,6	57,1	1,1	147
État matrimonial								
Célibataire	24,4	62,1	4,9	0,5	21,4	69,1	0,5	43
Marié ou vivant ensemble	28,5	40,7	10,8	1,9	23,8	51,7	1,9	2 225
Divorcé/séparé/veuf	(18,8)	(26,3)	(20,0)	(1,2)	(11,8)	(46,3)	(1,2)	48
Résidence								
Urbain	28,5	52,8	17,2	0,9	25,1	70,1	0,9	779
Rural	28,0	34,8	7,7	2,4	22,7	42,6	2,4	1 537
Grande Région								
Nord	24,3	14,2	7,6	2,1	17,3	21,8	2,1	431
Ouest	23,3	59,0	15,5	0,4	19,8	74,5	0,4	667
Centre	35,1	41,2	10,8	2,7	29,2	52,1	2,7	792
Sud	27,1	38,8	7,2	2,4	24,7	46,4	2,4	426
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	25,3	33,7	9,0	2,0	20,9	42,8	2,0	1 480
Primaire	34,9	49,3	12,8	2,1	29,0	62,3	2,1	470
Moyen/secondaire ou plus	31,2	58,7	16,5	1,1	27,0	75,2	1,1	367
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	20,5	25,8	6,6	2,7	16,5	32,7	2,7	602
Second	29,0	40,1	6,7	2,4	24,0	46,9	2,4	573
Moyen	36,3	48,3	10,4	1,9	29,3	58,9	1,9	400
Quatrième	32,7	44,3	18,2	1,1	27,2	62,4	1,1	372
Le plus riche	26,1	54,9	17,7	0,4	24,0	72,7	0,4	369
Ensemble 15-49	28,2	40,8	10,9	1,9	23,5	51,9	1,9	2 316

[1] Des conseils sur le VIH avant le test signifie ici que quelqu'un a parlé à l'enquêtée des trois sujets suivants: 1) la transmission du virus du sida de la mère au bébé, 2) la prévention du virus et 3) effectuer un test du VIH.
[2] La question sur le test au moment de l'accouchement n'est posée qu'aux femmes qui n'ont pas effectué de test pendant une visite prénatale.
[3] Sont incluses dans le dénominateur les femmes qui n'ont pas reçu de soins prénatals pour leur dernière naissance ayant eu lieu au cours des deux dernières années.

Tableau 13.11 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, pourcentage ayant déclaré avoir eu une IST et/ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage d'femmes ayant déclaré avoir eu, au cours des 12 derniers mois :					Pourcentage d'hommes ayant déclaré avoir eu, au cours des 12 derniers mois :				
Caractéristique sociodémographique	Une IST	Pertes vaginales anormales et malodo-rantes	Plaie/ ulcère génital	IST/ pertes/ plaie ou ulcère	Effectif de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels	Une IST	Ecoule-ment de penis	Plaie/ ulcère génital	IST/ ecoule-ment/ plaie ou ulcère	Effectif de hommes ayant déjà eu des rapports sexuels
Groupe d'âges										
15-24	3,4	18,1	9,4	21,5	1 590	2,1	1,3	0,5	3,1	269
15-19	2,9	14,6	9,5	17,8	511	1,1	1,1	0,8	1,3	93
20-24	3,7	19,7	9,4	23,3	1 079	2,6	1,4	0,4	4,1	176
25-29	4,0	20,0	9,3	23,0	1 342	0,0	0,8	0,0	0,8	346
30-39	4,0	16,0	8,1	19,8	2 159	0,1	0,5	0,5	0,9	675
40-49	3,4	12,6	6,3	15,1	1 335	0,3	0,1	0,0	0,5	538
État matrimonial										
Célibataire	4,1	13,0	8,7	16,4	188	0,9	0,6	0,3	1,6	576
A déjà eu des rapports sexuels	4,1	13,0	8,7	16,4	188	0,9	0,6	0,3	1,6	576
En union	3,7	17,2	8,6	20,7	5 814	0,2	0,6	0,3	0,9	1 221
En rupture d'union	3,8	10,6	4,1	11,5	424	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	32
Circoncision										
Ne sait pas/ manquant	na	na	na	na	na	0,4	0,6	0,3	1,1	1 828
Résidence										
Urbain	4,7	17,4	10,0	21,0	2 855	0,6	0,3	0,1	1,0	1 023
Rural	3,0	16,1	7,0	19,0	3 572	0,2	0,9	0,5	1,1	805
Grande Région										
Nord	3,1	20,4	4,8	22,8	1 139	0,7	1,6	0,4	2,0	320
Ouest	4,3	17,7	11,6	21,3	2 374	0,7	0,2	0,0	0,9	803
Centre	3,8	17,7	7,6	20,9	1 861	0,1	0,8	0,7	1,4	367
Sud	3,1	8,3	5,8	12,0	1 051	0,0	0,2	0,3	0,3	338
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	2,9	16,3	8,0	19,7	3 832	0,3	0,9	0,2	1,0	814
Primaire	3,5	16,9	8,2	19,4	1 492	0,2	0,6	0,1	0,8	430
Moyen/secondaire ou plus	6,8	17,6	9,4	21,4	1 102	0,8	0,1	0,4	1,3	584
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	2,7	15,1	6,4	18,0	1 278	0,1	1,0	0,4	1,0	332
Second	4,3	14,2	6,9	17,7	1 280	0,3	0,9	0,2	0,9	308
Moyen	3,6	16,6	9,5	20,2	1 271	0,1	0,8	0,8	1,7	340
Quatrième	1,7	17,4	9,4	20,7	1 333	0,3	0,0	0,0	0,3	418
Le plus riche	6,4	19,8	9,1	23,2	1 264	1,1	0,4	0,0	1,5	430
Ensemble 15-49	3,7	16,6	8,3	19,9	6 426	0,4	0,6	0,3	1,1	1 828
50-59	na	na	na	na	na	1,5	1,8	0,0	3,3	364
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	0,6	0,8	0,2	1,4	2 192

na = Non applicable

Tableau 13.12 Prévalence des injections médicales

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont reçu, au moins, une injection médicale au cours des 12 derniers mois, nombre moyen d'injections médicales par personne au cours des 12 derniers mois et parmi ceux et celles qui ont reçu une injection médicale, pourcentage des dernières injections médicales pour lesquelles la seringue et l'aiguille provenaient d'un emballage neuf non ouvert, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme				
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu une injection médicale au cours des 12 derniers mois	Nombre moyen d'injections médicales par personne au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enquêtés	La dernière fois, la seringue et l'aiguille provenaient d'un emballage neuf, non ouvert	Effectif d'enquêtés ayant reçu une injection médicale au cours des 12 derniers mois
Groupe d'âges					
15-24	19,7	0,4	3 662	1,0	721
15-19	24,6	0,5	1 998	1,0	493
20-24	13,7	0,3	1 664	1,2	228
25-29	13,9	0,3	1 524	2,4	211
30-39	10,1	0,2	2 316	0,6	234
40-49	6,8	0,1	1 362	0,6	93
État matrimonial					
Célibataire	18,0	0,3	2 555	1,0	460
A déjà eu des rapports sexuels	3,6	0,1	188	*	7
N'a jamais eu de rapports sexuels	19,1	0,4	2 367	1,0	453
En union	12,9	0,2	5 883	1,3	759
En rupture d'union	9,4	0,2	426	(0,0)	40
Résidence					
Urbain	8,7	0,2	4 351	2,2	380
Rural	19,5	0,4	4 514	0,7	879
Grande Région					
Nord	21,9	0,4	1 537	0,7	336
Ouest	8,5	0,2	3 559	1,5	303
Centre	22,8	0,4	2 460	0,1	561
Sud	4,4	0,1	1 309	11,7	58
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	17,6	0,3	4 310	0,6	758
Primaire	11,5	0,2	1 967	2,6	226
Moyen/secondaire ou plus	10,6	0,2	2 588	1,6	275
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	18,8	0,4	1 475	1,2	277
Second	18,8	0,4	1 603	1,2	302
Moyen	15,0	0,3	1 749	0,4	262
Quatrième	11,7	0,2	1 991	2,6	233
Le plus riche	9,0	0,2	2 046	0,4	184
Ensemble 15-49	14,2	0,3	8 865	1,1	1 258

Note : Les injections médicales sont celles données par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un dentiste ou n'importe quel autre personnel de santé. Les valeurs entre parenthèses sont basées entre 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non applicable

Tableau 13.13 Connaissance approfondie du VIH/sida et connaissance d'un endroit où se procurer des condoms parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans ayant une connaissance approfondie du sida et pourcentage connaissant un endroit où se procurer des condoms, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme			Homme		
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant une connaissance " approfondie " du sida[1]	Pourcentage connaissant un endroit où se procurer des condoms[2]	Effectif d'enquêtés	Pourcentage ayant une connaissance " approfondie " du sida[1]	Pourcentage connaissant un endroit où se procurer des condoms[2]	Effectif d'enquêtés
Groupe d'âges						
15-19	21,7	32,3	1 998	24,9	37,8	760
15-17	18,8	27,8	1 170	22,2	29,9	489
18-19	25,7	38,7	829	29,7	52,1	271
20-24	30,5	51,4	1 664	42,2	69,4	581
20-22	27,9	50,7	1 058	42,9	72,0	380
23-24	35,0	52,6	606	40,9	64,5	201
État matrimonial						
Célibataire	30,0	44,5	2 131	32,7	51,6	1 294
A déjà eu des rapports sexuels	25,8	62,6	113	36,6	88,0	222
N'a jamais eu de rapports sexuels	30,2	43,5	2 018	31,9	44,1	1 071
Marié	19,7	36,1	1 531	24,5	49,1	48
Résidence						
Urbain	37,9	58,3	1 743	42,5	64,6	638
Rural	14,6	25,3	1 920	23,2	39,7	703
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	11,5	17,5	1 243	5,9	23,1	329
Primaire	19,1	34,8	731	19,6	46,6	263
Moyen/secondaire ou plus	38,9	61,0	1 689	48,5	65,8	749
Total	25,7	41,0	3 662	32,4	51,5	1 341

[1] Sont considérés comme ayant une connaissance "approfondie", les femmes et les hommes qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le virus du sida, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du sida et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du virus du sida. Les éléments de la connaissance complète sont présentés aux tableaux 13.2, 13.3.1 et 13.3.2.
[2] Dans ce tableau, les réponses telles que "amis", "famille" et "maison" n'ont pas été prises en compte comme source d'approvisionnement du condom.

Tableau 13.14 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 18-24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme				Homme			
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant d'atteindre 15 ans exacts	Effectif d'enquêtés (15-24 ans)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant d'atteindre 18 ans exacts	Effectif d'enquêtés (18-24 ans)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant d'atteindre 15 ans exacts	Effectif d'enquêtés (15-24 ans)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant d'atteindre 18 ans exacts	Effectif d'enquêtés (18-24 ans)
Groupe d'âges								
15-19	6,4	1 998	na	na	5,1	760	na	na
15-17	5,0	1 170	na	na	4,1	489	na	na
18-19	8,3	829	30,4	829	7,0	271	14,3	271
20-24	8,1	1 664	33,2	1 664	5,2	581	11,8	581
20-22	8,6	1 058	33,7	1 058	6,4	380	13,9	380
23-24	7,3	606	32,2	606	3,0	201	7,9	201
État matrimonial								
Célibataire	0,8	2 131	4,2	1 143	5,2	1 294	11,6	805
Marié	16,1	1 531	56,0	1 350	4,2	48	29,5	47
Connaît une source de condom[1]								
Oui	4,0	1 501	23,0	1 176	7,7	691	15,7	545
Non	9,4	2 161	40,5	1 317	2,5	650	7,1	308
Résidence								
Urbain	2,8	1 743	18,9	1 206	4,8	638	9,9	440
Rural	11,1	1 920	44,7	1 287	5,5	703	15,5	413
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	14,5	1 243	51,3	926	6,3	329	13,3	213
Primaire	6,2	731	37,0	484	5,4	263	13,5	165
Moyen/secondaire ou plus	2,2	1 689	13,8	1 083	4,6	749	12,0	476
Total	7,2	3 662	32,3	2 493	5,2	1 341	12,6	853

na = Non applicable
[1] Dans ce tableau, les réponses telles que "amis", "famille" et "maison" n'ont pas été prises en compte comme source d'approvisionnement du condom.

Tableau 13.15 Rapports sexuels prénuptiaux et utilisation du condom au cours des rapports sexuels prénuptiaux parmi les jeunes

Parmi les femmes et les hommes célibataires de 15-24 ans, pourcentage qui n'ont jamais eu de rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et, parmi ceux qui ont eu des rapports sexuels prénuptiaux au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femme					Homme				
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enquêtés célibataires	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'enquêtés	Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enquêtés célibataires	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'enquêtés
Groupe d'âges										
15-19	97,2	2,1	1 499	(62,1)	31	88,3	6,9	755	48,4	52
15-17	98,5	1,2	989	*	12	91,6	5,0	488	(27,9)	24
18-19	94,9	3,7	511	*	19	82,2	10,4	267	(66,2)	28
20-24	88,6	7,7	632	30,2	49	75,1	14,6	539	72,9	79
20-22	90,9	5,7	450	(32,0)	26	73,5	15,3	359	75,1	55
23-24	82,8	12,6	182	*	23	78,3	13,1	180	(67,6)	24
Connaît une source de condom[1]										
Oui	92,5	5,0	949	41,5	48	70,7	17,5	668	68,2	117
Non	96,4	2,7	1 182	(44,4)	32	95,7	2,1	626	*	13
Résidence										
Urbain	94,8	3,8	1 259	(38,4)	48	82,3	9,5	626	69,0	59
Rural	94,6	3,6	872	49,1	31	83,2	10,6	668	58,3	71
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	96,6	1,5	365	*	5	84,8	7,7	295	(28,5)	23
Primaire	92,9	5,4	401	*	22	84,6	8,9	252	(63,0)	23
Moyen/secondaire ou plus	94,7	3,9	1 365	47,0	53	81,4	11,4	747	72,4	85
Total	94,7	3,7	2 131	42,6	80	82,8	10,1	1 294	63,1	130

[1] Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.Dans ce tableau, les réponses telles que "amis", "famille" et "maison" n'ont pas été prises en compte comme source d'approvisionnement du condom.

Tableau 13.16.1 Partenaires sexuels multiples au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme

Parmi l'ensemble des jeunes femmes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Femmes de 15-24 ans	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-19	0,1	1 998
15-17	0,0	1 170
18-19	0,1	829
20-24	0,1	1 664
20-22	0,1	1 058
23-24	0,1	606
État matrimonial		
Célibataire	0,0	2 131
Marié	0,2	1 531
Connaît une source de condom[1]		
Oui	0,2	1 501
Non	0,1	2 161
Résidence		
Urbain	0,0	1 743
Rural	0,2	1 920
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	0,1	1 243
Primaire	0,3	731
Moyen/secondaire ou plus	0,0	1 689
Ensemble 15-24	0,1	3 662

[1] Dans ce tableau, les réponses telles que "amis", "famille" et "maison" n'ont pas été prises en compte comme source d'approvisionnement du condom.

Tableau 13.16.2 Partenaires sexuelles multiples au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme

Parmi l'ensemble des jeunes hommes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois; xuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Hommes de 15-24 ans	
	Pourcentage ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes
Groupe d'âges		
15-19	0,6	760
15-17	0,6	489
18-19	0,6	271
20-24	2,0	581
20-22	1,8	380
23-24	2,6	201
État matrimonial		
Célibataire	1,2	1 294
Marié	2,3	48
Connaît une source de condom[1]		
Oui	1,8	691
Non	0,6	650
Résidence		
Urbain	0,7	638
Rural	1,7	703
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	1,3	329
Primaire	1,2	263
Moyen/secondaire ou plus	1,2	749
Ensemble 15-24	1,2	1 341

[1] Dans ce tableau, les réponses telles que "amis", "famille" et "maison" n'ont pas été prises en compte comme source d'approvisionnement du condom.

Tableau 13.17 Disparité d'âges entre partenaires sexuels parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans

Parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire qui était plus âgé qu'eux d'au moins 10 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Femmes de 15-19 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	
	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins dix ans	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-17	41,1	172
18-19	43,6	295
État matrimonial		
Célibataire	(10,1)	31
Marié	45,0	436
Connaît une source de condom[1]		
Oui	39,9	111
Non	43,5	356
Résidence		
Urbain	44,0	108
Rural	42,3	359
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	44,5	280
Primaire	47,8	98
Moyen/secondaire ou plus	31,3	89
Total	42,7	467

[1] Dans ce tableau, les réponses telles que "amis", "famille" et "maison" n'ont pas été prises en compte comme source d'approvisionnement du condom.

Tableau 13.18 Test du VIH récent parmi les jeunes

Parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant effectué un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois :		Hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois :	
	Pourcentage ayant effectué un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif de femmes	Pourcentage ayant effectué un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif d'hommes
Groupe d'âges				
15-19	15,0	467	3,0	57
15-17	12,2	172	(0,0)	25
18-19	16,7	295	(5,3)	32
20-24	15,0	950	7,4	119
20-22	13,3	554	6,0	75
23-24	17,4	396	9,7	44
État matrimonial				
Célibataire	15,1	80	5,6	130
Marié	15,0	1 337	7,1	45
Connaît une source de condom[1]				
Oui	21,5	535	7,5	139
Non	11,0	882	0,0	37
Résidence				
Urbain	22,6	474	5,3	72
Rural	11,2	942	6,4	104
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	9,6	771	4,4	54
Primaire	18,8	313	(2,9)	34
Moyen/secondaire ou plus	23,9	332	8,1	88
Total	15,0	1 417	6,0	176

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.
[1] Dans ce tableau, les réponses telles que "amis", "famille" et "maison" n'ont pas été prises en compte comme source d'approvisionnement du condom.

STATUT DE LA FEMME 14

Tableau 14.1 Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant travaillé à n'importe quel moment, au cours des 12 derniers mois, par type de rémunération, selon l'âge, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Parmi les enquêtés actuellement en union :		Répartition (en %) des enquêtés actuellement en union et ayant travaillé au cours des 12 derniers mois, par type de rémunération						
Groupe d'âges	Pourcentage ayant travaillé au dernier 12 moins	Effectif d'enquêtés	Argent uniquement	Argent et nature	En nature seulement	Non rémunéré	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif de femmes
				FEMME					
Groupe d'âges									
15-19	36,8	487	42,3	8,3	0,0	49,4	0,0	100,0	180
20-24	37,1	985	51,7	10,3	0,5	37,4	0,0	100,0	365
25-29	53,3	1 228	64,3	8,9	0,4	26,3	0,0	100,0	655
30-34	59,3	1 105	70,2	11,1	0,5	18,2	0,0	100,0	655
35-39	68,3	886	73,1	11,2	0,6	15,1	0,0	100,0	605
40-44	73,0	706	76,3	9,4	0,7	13,7	0,0	100,0	515
45-49	74,2	486	77,6	12,7	1,0	8,6	0,0	100,0	361
Ensemble 15-49	56,7	5 883	67,8	10,4	0,6	21,3	0,0	100,0	3 337
				HOMME					
Groupe d'âges									
15-19	*	5	*	*	*	*	*	*	5
20-24	(98,1)	43	(67,9)	(0,0)	(0,0)	(32,1)	(0,0)	(100,0)	42
25-29	99,7	154	80,6	5,7	0,8	12,8	0,0	100,0	154
30-34	99,8	252	82,9	7,9	0,0	9,2	0,0	100,0	252
35-39	99,8	287	89,9	6,0	0,2	3,8	0,0	100,0	286
40-44	98,5	246	88,0	8,2	0,6	3,2	0,0	100,0	243
45-49	98,6	238	84,9	13,7	0,0	1,4	0,0	100,0	235
Ensemble 15-49	99,2	1 225	85,0	8,1	0,3	6,7	0,0	100,0	1 216
50-59	96,0	348	80,2	16,4	0,2	3,1	0,0	100,0	334
Ensemble 15-59	98,5	1 574	83,9	9,9	0,3	5,9	0,0	100,0	1 550

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 14.2.1 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par le conjoint

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont gagné de l'argent pour leur travail au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction de la personne qui décide de l'utilisation de leurs gains et répartition (en %) en fonction du fait qu'elles gagnent plus ou moins que leur conjoint, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Personne qui décide de l'utilisation des gains de la femme :					Gains de la femme par rapport à ceux du conjoint :						
Caractéristique sociodémographique	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Plus que le conjoint	Moins que le conjoint	A peu près la même chose	Le conjoint ne gagne pas d'argent ou n'apas travaillé	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif de femmes
Groupe d'âges												
15-19	78,7	7,0	9,6	4,7	100,0	0,4	97,1	0,0	0,5	2,1	100,0	91
20-24	78,4	8,8	3,6	9,2	100,0	0,0	96,7	0,6	1,6	1,1	100,0	227
25-29	77,6	10,1	6,3	5,9	100,0	3,5	90,5	3,1	1,1	1,8	100,0	480
30-34	79,8	13,7	3,8	2,7	100,0	4,0	87,0	4,9	0,6	3,5	100,0	532
35-39	82,5	13,7	2,0	1,9	100,0	5,4	84,7	3,3	1,8	4,8	100,0	510
40-44	82,8	12,4	3,8	1,0	100,0	8,3	73,8	8,0	5,6	4,4	100,0	441
45-49	87,7	7,7	4,5	0,1	100,0	3,7	85,4	1,6	3,2	6,1	100,0	326
Nombre d'enfants vivants												
0	83,7	3,7	4,1	8,6	100,0	1,3	90,7	1,4	1,3	5,3	100,0	276
1-2	78,3	12,9	4,2	4,6	100,0	5,8	85,8	4,1	1,7	2,5	100,0	734
3-4	80,5	12,8	4,1	2,6	100,0	2,7	85,4	5,5	2,5	3,9	100,0	768
5+	83,7	11,3	4,3	0,6	100,0	5,7	85,0	2,8	2,7	3,8	100,0	829
Résidence												
Urbain	78,6	13,5	2,8	5,1	100,0	5,5	81,7	5,1	2,3	5,4	100,0	1 335
Rural	84,0	9,2	5,6	1,2	100,0	3,2	90,4	2,5	2,0	1,8	100,0	1 272
Grande Région												
Nord	94,0	0,6	4,7	0,7	100,0	2,5	88,6	2,6	5,3	1,0	100,0	278
Ouest	76,9	15,1	2,1	5,8	100,0	5,9	80,6	6,0	1,5	6,1	100,0	1 200
Centre	85,4	9,3	3,9	1,4	100,0	3,0	92,0	1,8	2,4	0,9	100,0	789
Sud	76,4	12,0	11,6	0,0	100,0	4,0	88,9	2,0	1,6	3,6	100,0	342
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	84,2	9,2	4,5	2,1	100,0	5,2	85,8	3,4	2,4	3,3	100,0	1 574
Primaire	76,8	14,2	4,9	4,1	100,0	1,6	87,2	4,3	2,2	4,7	100,0	636
Moyen/secondaire ou plus	76,5	15,8	1,6	6,1	100,0	5,6	84,8	4,8	1,4	3,4	100,0	397
Quintiles de bien-être économique												
Le plus pauvre	81,6	7,4	10,0	1,0	100,0	2,0	92,5	1,6	1,7	2,2	100,0	373
Second	78,6	12,5	6,6	2,3	100,0	4,2	89,9	2,3	2,2	1,4	100,0	456
Moyen	83,1	11,1	3,5	2,3	100,0	4,8	85,7	3,9	1,9	3,6	100,0	528
Quatrième	83,9	11,0	1,2	3,9	100,0	7,6	79,4	4,4	2,7	5,9	100,0	640
Le plus riche	78,7	13,6	2,5	5,1	100,0	2,3	86,1	5,6	2,1	3,8	100,0	611
Total	81,3	11,4	4,2	3,2	100,0	4,4	86,0	3,8	2,2	3,6	100,0	2 607

Tableau 14.2.2 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont gagné de l'argent pour leur travail et répartition (en%) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le conjoint a gagné de l'argent pour son travail en fonction de la personne qui décide de l'utilisation de l'argent gagné par l'homme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Homme							Femme					
Caractéristique sociodémographique	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Manquant	Total	Effectif	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Effectif
Groupe d'âges													
15-19	*	*	*	*	*	100,0	1	1,3	7,5	88,4	2,7	100,0	476
20-24	(0,0)	(26,0)	(74,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	28	1,6	10,9	86,2	1,4	100,0	967
25-29	0,5	16,3	79,9	3,3	0,0	100,0	133	2,0	11,6	85,2	1,2	100,0	1 219
30-34	0,3	12,2	86,7	0,9	0,0	100,0	228	2,1	16,7	80,8	0,5	100,0	1 098
35-39	1,8	19,1	78,8	0,3	0,0	100,0	275	1,9	15,5	82,4	0,2	100,0	876
40-44	0,0	16,1	83,3	0,6	0,0	100,0	233	3,3	16,2	80,2	0,2	100,0	674
45-49	0,0	21,2	78,6	0,2	0,0	100,0	232	1,8	12,3	85,6	0,3	100,0	474
Nombre d'enfants vivants													
0	0,0	14,4	83,3	2,3	0,0	100,0	153	2,5	11,4	84,0	2,0	100,0	775
1-2	0,5	14,0	85,1	0,4	0,0	100,0	397	2,0	13,7	83,4	0,9	100,0	1 918
3-4	0,0	19,8	79,2	1,0	0,0	100,0	314	1,9	14,6	82,5	1,0	100,0	1 614
5+	1,6	21,4	76,9	0,2	0,0	100,0	267	1,9	12,4	85,7	0,1	100,0	1 477
Résidence													
Urbain	0,8	16,3	82,7	0,2	0,0	100,0	609	2,3	15,4	81,8	0,5	100,0	2 411
Rural	0,2	18,6	79,6	1,5	0,0	100,0	522	1,8	11,8	85,3	1,2	100,0	3 373
Grande Région													
Nord	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	180	2,1	14,6	81,7	1,6	100,0	1 041
Ouest	0,8	16,6	82,1	0,6	0,0	100,0	509	1,9	14,7	82,8	0,6	100,0	2 066
Centre	0,9	20,8	76,0	2,4	0,0	100,0	251	2,2	11,3	85,3	1,1	100,0	1 770
Sud	0,0	31,5	68,5	0,0	0,0	100,0	191	1,8	12,4	85,6	0,1	100,0	907
Niveau d'instruction													
Pas d'instruction	0,4	18,5	80,7	0,4	0,0	100,0	585	2,1	11,7	85,1	1,1	100,0	3 593
Primaire	1,5	9,6	87,2	1,7	0,0	100,0	279	2,1	16,1	81,5	0,3	100,0	1 275
Moyen/secondaire ou plus	0,0	23,1	76,4	0,5	0,0	100,0	267	1,7	15,5	82,1	0,7	100,0	916
Quintiles de bien-être économique													
Le plus pauvre	0,3	27,0	72,1	0,7	0,0	100,0	216	1,7	9,5	88,0	0,9	100,0	1 228
Second	0,0	17,2	80,7	2,1	0,0	100,0	193	1,9	12,3	84,7	1,1	100,0	1 165
Moyen	0,8	9,6	89,0	0,6	0,0	100,0	201	2,6	15,1	81,5	0,9	100,0	1 101
Quatrième	1,6	19,5	78,2	0,8	0,0	100,0	267	2,8	14,6	82,2	0,5	100,0	1 177
Le plus riche	0,0	13,3	86,7	0,0	0,0	100,0	254	1,2	15,4	82,4	1,0	100,0	1 113
Ensemble 15-49	0,6	17,4	81,3	0,8	0,0	100,0	1 131	2,0	13,3	83,8	0,9	100,0	5 784
50-59	1,0	16,3	82,7	0,0	0,0	100,0	323	na	na	na	na	na	na
Ensemble 15-59	0,7	17,1	81,6	0,6	0,0	100,0	1 454	na	na	na	na	na	na

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non Applicable

Tableau 14.3 Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains du conjoint

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union qui ont gagné de l'argent, au cours des 12 derniers mois en fonction de la personne qui décide de l'utilisation de leurs gains et répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le conjoint a gagné de l'argent en fonction de la personne qui décide de l'utilisation de l'argent gagné par l'homme, selon les gains en argent de la femme par rapport à ceux du conjoint, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Personne qui décide de l'utilisation des gains de la femme :						Personne qui décide de l'utilisation des gains du conjoint :					
Gains de la femme par rapport à ceux du conjoint	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Effectif	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Effectif de femmes
Plus que le conjoint	69,4	22,5	3,6	4,6	100,0	115	14,0	23,6	62,4	0,0	100,0	115
Moins que le conjoint	81,6	10,6	4,6	3,1	100,0	2 241	2,4	16,6	80,6	0,3	100,0	2 241
A peu près la même chose	69,5	23,0	1,2	6,3	100,0	100	5,2	35,5	59,3	0,0	100,0	100
Le conjoint ne gagne pas d'argent ou n'a pas travaillé	91,7	8,3	0,0	0,0	100,0	57	na	na	na	na	na	0
La femme a travaillé mais n'a pas gagné d'argent	na	na	na	na	na	0	2,0	11,6	85,3	1,2	100,0	719
La femme n'a pas travaillé	na	na	na	na	na	0	1,1	9,5	88,0	1,4	100,0	2 514
Ne sait pas/manquant	92,5	6,2	0,0	1,4	100,0	95	0,0	12,1	87,9	0,0	100,0	95
Total	81,3	11,4	4,2	3,2	100,0	2 607	2,0	13,3	83,8	0,9	100,0	5 784

na = Non Applicable
[1] Y compris les cas où la femme ne sait pas si elle a gagné plus ou moins que son conjoint.

Tableau 14.4.1 Possession de biens par la femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage possédant une maison :					Pourcentage possédant des terres :					
Caractéristique sociodémographique	Seule	Avec quelqu'un d'autre	Seule et avec quelqu'un d'autre	Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Seule	Avec quelqu'un d'autre	Seule et avec quelqu'un d'autre	Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Effectif
Groupe d'âges											
15-19	0,2	8,8	0,7	90,4	100,0	0,8	4,1	0,4	94,7	100,0	1 998
20-24	0,2	9,0	1,1	89,7	100,0	1,9	3,3	0,4	94,4	100,0	1 664
25-29	0,5	7,8	0,5	91,1	100,0	3,0	2,4	0,2	94,3	100,0	1 524
30-34	0,7	9,2	1,3	88,9	100,0	4,1	3,5	0,9	91,5	100,0	1 318
35-39	2,0	9,4	2,8	85,8	100,0	4,5	3,8	1,4	90,2	100,0	998
40-44	2,9	12,5	1,2	83,4	100,0	6,5	3,1	2,9	87,6	100,0	806
45-49	2,1	15,2	1,5	81,2	100,0	10,8	3,4	0,5	85,3	100,0	557
Résidence											
Urbain	1,1	9,1	1,8	88,0	100,0	3,0	3,0	0,9	93,2	100,0	4 351
Rural	0,6	10,0	0,5	88,9	100,0	3,9	3,8	0,7	91,6	100,0	4 514
Grande Région											
Nord	0,7	1,6	0,0	97,7	100,0	0,7	1,2	0,2	97,9	100,0	1 537
Ouest	1,2	7,0	1,9	89,8	100,0	2,9	2,5	1,2	93,3	100,0	3 559
Centre	0,5	8,3	0,3	91,0	100,0	4,3	2,8	0,5	92,3	100,0	2 460
Sud	0,9	28,1	1,9	69,2	100,0	6,4	9,4	0,9	83,3	100,0	1 309
Niveau d'instruction											
Pas d'instruction	1,0	9,2	0,5	89,2	100,0	4,0	3,3	0,5	92,1	100,0	4 310
Primaire	0,5	9,5	1,5	88,5	100,0	2,4	2,9	1,0	93,7	100,0	1 967
Moyen/secondaire ou plus	0,9	10,0	1,9	87,2	100,0	3,3	3,9	1,0	91,7	100,0	2 588
Quintiles de bien-être économique											
Le plus pauvre	0,5	13,1	0,3	86,1	100,0	7,1	5,0	0,3	87,6	100,0	1 475
Second	0,9	13,3	1,2	84,5	100,0	3,1	4,8	1,0	91,1	100,0	1 603
Moyen	0,9	8,8	1,1	89,1	100,0	1,6	2,8	0,9	94,8	100,0	1 749
Quatrième	1,2	7,1	1,2	90,5	100,0	2,2	3,1	1,1	93,6	100,0	1 991
Le plus riche	0,8	6,9	1,7	90,6	100,0	4,0	2,0	0,5	93,5	100,0	2 046
Total	0,9	9,5	1,1	88,4	100,0	3,4	3,4	0,8	92,4	100,0	8 865

na = Non Applicable

Tableau 14.4.2 Possession de biens par les hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Pourcentage possédant une maison :					Pourcentage possédant des terres :					
Caractéristique sociodémographique	Seule	Avec quelqu'un d'autre	Seule et avec quelqu'un d'autre	Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Seule	Avec quelqu'un d'autre	Seule et avec quelqu'un d'autre	Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Effectif
Groupe d'âges											
15-19	0,0	0,1	0,1	99,8	100,0	0,8	0,2	0,1	98,2	99,4	760
20-24	0,3	0,6	0,3	98,9	100,0	3,0	0,0	0,4	95,7	99,2	581
25-29	1,7	2,6	0,9	94,8	100,0	7,6	1,9	0,8	86,0	96,3	521
30-34	6,6	7,9	3,2	82,4	100,0	15,9	0,7	2,0	79,1	97,6	402
35-39	15,4	10,6	2,3	71,8	100,0	19,1	2,4	1,7	75,4	98,6	350
40-44	25,2	10,6	0,9	63,2	100,0	34,0	4,1	0,5	58,0	96,7	285
45-49	25,2	5,9	3,0	65,9	100,0	29,9	3,3	1,3	65,5	100,0	260
Résidence											
Urbain	3,1	2,8	0,2	93,9	100,0	5,9	0,9	0,2	90,0	96,9	1 696
Rural	12,0	5,8	2,4	79,9	100,0	18,4	1,9	1,6	78,1	100,0	1 464
Grande Région											
Nord	11,6	18,1	0,1	70,1	100,0	19,8	5,0	0,2	74,9	100,0	486
Ouest	3,1	1,3	0,2	95,5	100,0	3,9	0,3	0,0	92,0	96,3	1 405
Centre	10,1	3,3	2,6	84,0	100,0	18,6	1,1	2,5	77,8	100,0	725
Sud	10,2	0,3	3,1	86,5	100,0	15,2	1,1	1,3	82,3	100,0	543
Niveau d'instruction											
Pas d'instruction	13,7	7,0	2,7	76,6	100,0	19,9	2,0	1,9	74,9	98,8	1 149
Primaire	5,0	4,7	0,4	89,9	100,0	8,5	1,2	0,5	88,4	98,6	704
Moyen/secondaire ou plus	2,7	1,4	0,4	95,5	100,0	6,1	0,9	0,1	90,8	97,8	1 306
Quintiles de bien-être économique											
Le plus pauvre	14,3	5,5	4,3	75,9	100,0	24,5	1,9	2,4	71,2	100,0	535
Second	11,2	4,8	1,2	82,7	100,0	14,8	2,0	1,6	81,6	100,0	581
Moyen	6,5	8,0	0,7	84,9	100,0	12,9	1,9	0,4	83,9	99,2	583
Quatrième	5,3	3,1	0,5	91,2	100,0	6,9	0,5	0,2	91,7	99,3	700
Le plus riche	1,5	0,8	0,1	97,6	100,0	3,8	0,9	0,0	89,7	94,3	759
Ensemble 15-49	7,2	4,2	1,2	87,4	100,0	11,7	1,4	0,8	84,5	98,3	3 159
50-59	45,0	6,7	2,1	46,1	100,0	40,9	2,6	0,6	56,0	100,0	368
Ensemble 15-59	11,2	4,4	1,3	83,1	100,0	14,7	1,5	0,8	81,5	98,5	3 527

na = Non Applicable

Tableau 14.5 Participation dans la prise de décision

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, en fonction de la personne qui prend habituellement les décisions, selon certains types de décisions, EDS-Continue, Sénégal 2016

Décision	Principalement la femme	La femme et le conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Quelqu'un d'autre	Autre	Total	Effectif de femmes
			FEMME				
Soins de santé de la femme	6,3	9,7	80,3	3,4	0,3	100,0	5 883
Achats importants pour le ménage	4,2	11,3	66,5	13,3	4,8	100,0	5 883
Visites à la famille ou aux parents de la femme	2,6	7,2	82,8	5,6	1,8	100,0	5 883
			HOMME				
Soins de santé de la femme	1,3	23,1	73,1	2,3	0,1	100,0	1 225
Achats importants pour le ménage	0,6	27,9	43,7	24,8	3,0	100,0	1 225
Visites à la famille ou aux parents de la femme	-	-	-	-	-	0,0	0

Tableau 14.6.1 Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certains types de décisions, soit seules, soit ensemble avec leur conjoint, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Type de décision					
	Soins de santé de la femme	Achats importants pour le ménage	Visites à la famille ou aux parents de la femme	Tous aux trois décisions	Aucune des trois décisions	Effectif de femmes
Groupe d'âges						
15-19	8,2	3,3	5,8	1,9	89,2	487
20-24	8,4	6,8	7,4	4,3	88,7	985
25-29	11,5	10,3	8,5	4,9	83,4	1 228
30-34	15,7	16,0	10,1	7,4	78,3	1 105
35-39	19,0	20,9	13,9	9,8	72,9	886
40-44	28,8	27,6	12,5	9,1	64,4	706
45-49	26,3	29,3	10,3	5,7	61,0	486
Emploi (12 derniers mois)						
N'a pas travaillé	5,5	4,8	4,8	2,9	92,0	2 546
A travaillé et a été rémunéré en argent	25,6	26,4	12,8	8,4	64,5	2 607
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	17,7	13,5	17,0	10,9	78,3	729
Nombre d'enfants vivants						
0	11,6	9,9	8,6	5,3	83,4	787
1-2	14,2	12,5	9,4	5,3	80,5	1 944
3-4	14,7	15,1	9,4	6,6	79,4	1 643
5+	21,7	22,5	11,5	7,9	70,8	1 509
Résidence						
Urbain	18,4	19,2	10,2	6,9	74,0	2 455
Rural	14,1	12,7	9,6	5,9	81,0	3 428
Grande Région						
Nord	11,0	11,9	7,2	5,4	84,7	1 081
Ouest	16,7	19,6	6,2	4,3	75,6	2 089
Centre	13,7	11,6	9,7	5,5	81,0	1 795
Sud	24,3	17,6	21,6	13,6	70,5	918
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	16,2	16,0	9,8	6,4	78,1	3 660
Primaire	12,6	11,0	8,4	4,9	82,3	1 296
Moyen/secondaire ou plus	19,7	19,5	12,2	8,1	72,3	927
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	15,8	11,7	13,3	8,2	79,9	1 247
Second	17,6	13,6	10,5	6,9	79,1	1 188
Moyen	15,0	16,4	7,7	5,5	78,6	1 117
Quatrième	16,6	19,0	9,1	6,2	76,3	1 199
Le plus riche	14,4	16,7	8,2	4,7	76,4	1 132
Total	15,9	15,4	9,8	6,3	78,1	5 883

Tableaux 14.6.2 Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certains types de décisions, soit seuls, soit ensemble avec leur conjoint, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Type de décision				
Caractéristique sociodémographique	Soins de santé de l'homme	Achats importants pour le ménage	Les deux décisions	Aucune des deux décisions	Effectif d'hommes
Groupe d'âges					
15-19	*	*	*	*	5
20-24	(89,3)	(51,1)	(51,1)	(10,7)	43
25-29	91,7	51,6	51,6	8,3	154
30-34	95,8	64,8	64,1	3,6	252
35-39	97,6	73,2	73,0	2,2	287
40-44	99,1	81,3	81,3	0,9	246
45-49	96,9	84,6	82,6	1,1	238
Emploi (12 derniers mois)					
N'a pas travaillé	*	*	*	*	10
A travaillé et a été rémunéré en argent	98,4	73,4	72,8	1,0	1 131
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	71,5	52,4	52,4	28,5	85
Nombre d'enfants vivants					
0	91,8	52,4	52,4	8,2	181
1-2	96,0	62,4	61,9	3,6	428
3-4	97,2	79,3	77,9	1,4	338
5+	98,3	89,0	89,0	1,7	279
Résidence					
Urbain	97,5	73,1	72,3	1,8	624
Rural	94,9	70,1	69,8	4,7	602
Grande Région					
Nord	96,2	61,6	61,6	3,8	212
Ouest	96,3	73,7	72,4	2,4	522
Centre	95,0	72,7	72,5	4,8	276
Sud	97,5	75,2	75,2	2,5	215
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	96,4	73,7	73,4	3,3	657
Primaire	94,8	65,5	65,5	5,2	294
Moyen/secondaire ou plus	97,2	73,2	71,5	1,1	275
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	94,3	74,8	74,6	5,5	271
Second	96,1	71,2	71,2	3,9	211
Moyen	97,2	71,1	71,1	2,8	214
Quatrième	97,2	79,9	79,3	2,2	270
Le plus riche	96,5	60,5	58,6	1,7	259
Ensemble 15-49	96,2	71,6	71,1	3,2	1 225
50-59	98,4	86,8	86,3	1,1	348
Ensemble 15-59	96,7	75,0	74,4	2,8	1 574

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 14.7.1 Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

Caractéristique sociodémographique	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle : Brûle la nourriture	Argumente avec lui	Sort sans lui dire	Néglige les enfants	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	Pourcentage d'accord avec, au moins, une des raisons citées	Effectif
Groupe d'âges							
15-19	21,0	40,6	38,1	37,5	35,4	51,4	1 998
20-24	16,3	35,5	34,2	34,6	34,6	45,6	1 664
25-29	18,9	40,9	35,9	39,5	39,4	49,5	1 524
30-34	18,3	37,5	35,4	36,8	36,3	46,1	1 318
35-39	18,9	40,3	39,7	40,0	40,6	49,4	998
40-44	17,1	38,3	36,8	38,6	39,9	50,4	806
45-49	19,4	38,9	35,9	36,5	39,4	46,5	557
Emploi (12 derniers mois)							
N'a pas travaillé	18,4	36,5	34,4	35,3	34,8	46,2	4 253
A travaillé et a été rémunéré en argent	16,7	37,7	35,7	36,4	37,1	47,5	3 490
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	25,8	51,5	47,2	49,0	47,4	60,6	1 122
Nombre d'enfants vivants							
0	15,2	32,4	31,0	31,1	28,2	43,6	3 310
1-2	17,2	36,4	33,8	36,3	36,3	45,7	2 237
3-4	21,3	42,5	38,6	39,3	42,6	49,5	1 757
5+	25,2	52,1	49,8	50,8	52,0	62,1	1 562
État matrimonial							
Célibataire	14,1	29,2	28,8	29,0	25,0	40,9	2 555
Marié ou vivant ensemble	21,0	43,7	40,6	41,9	43,1	52,6	5 883
Divorcé/séparé/veuf	13,7	30,4	26,3	28,6	31,1	38,6	426
Résidence							
Urbain	11,9	28,9	27,5	28,0	26,5	39,2	4 351
Rural	25,2	48,6	45,2	46,7	47,7	57,6	4 514
Grande Région							
Nord	16,5	35,6	30,8	33,6	35,1	40,8	1 537
Ouest	10,5	28,9	26,7	27,2	27,1	40,0	3 559
Centre	23,1	46,8	43,1	45,1	45,4	56,6	2 460
Sud	35,1	55,0	57,5	55,8	52,4	66,1	1 309
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	25,7	49,8	47,2	47,0	50,7	58,7	4 310
Primaire	14,0	34,1	30,7	32,7	29,9	43,3	1 967
Moyen/secondaire ou plus	10,6	24,4	23,1	25,2	20,7	35,7	2 588
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	38,0	65,1	62,9	63,2	63,1	74,0	1 475
Second	26,4	50,7	48,0	49,1	49,6	60,5	1 603
Moyen	17,9	39,2	36,2	38,3	38,6	49,8	1 749
Quatrième	11,2	30,6	28,7	28,1	29,1	41,0	1 991
Le plus riche	6,6	18,5	16,3	18,4	16,0	27,2	2 046
Total	18,7	38,9	36,5	37,5	37,3	48,6	8 865

Tableau 14.7.2 Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme: Hommes

Pourcentage de tous les hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2016

	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle :						
Caractéristique sociodémographique	Brûle la nourriture	Argumente avec lui	Sort sans lui dire	Néglige les enfants	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	Pourcentage d'accord avec, au moins, une des raisons citées	Effectif
Groupe d'âges							
15-19	16,4	31,1	24,6	29,4	20,0	43,2	760
20-24	7,6	19,9	16,5	20,0	12,7	29,1	581
25-29	7,9	16,7	11,5	15,5	11,2	23,4	521
30-34	6,8	14,7	12,2	14,9	9,9	20,6	402
35-39	6,6	11,8	10,7	14,3	9,1	16,6	350
40-44	5,0	13,0	10,4	14,9	11,1	19,5	285
45-49	4,3	10,3	9,1	10,5	7,3	14,6	260
Emploi (12 derniers mois)							
N'a pas travaillé	10,6	17,1	10,0	15,3	10,3	25,3	363
A travaillé et a été rémunéré en argent	7,0	14,1	11,6	14,7	10,7	21,1	1 920
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	12,9	31,0	25,5	30,0	18,7	40,8	877
Nombre d'enfants vivants							
0	10,7	21,9	16,8	21,1	14,0	30,8	2 059
1-2	5,5	13,2	10,8	13,8	9,4	18,6	478
3-4	5,3	13,2	11,4	12,5	9,5	16,9	343
5+	7,6	15,6	16,1	19,9	14,6	25,9	280
État matrimonial							
Célibataire	10,6	21,9	16,7	20,9	14,1	31,1	1 903
Marié ou vivant ensemble	6,8	14,9	13,3	16,3	11,0	20,9	1 225
Divorcé/séparé/veuf	(3,1)	(11,7)	(8,2)	(9,2)	(12,1)	(20,6)	32
Résidence							
Urbain	5,9	11,2	8,1	10,4	7,0	17,0	1 696
Rural	12,7	28,3	23,6	29,0	19,7	38,7	1 464
Grande Région							
Nord	14,5	39,6	32,3	39,7	27,0	47,9	486
Ouest	6,1	8,7	5,7	6,7	5,8	13,3	1 405
Centre	9,8	21,0	17,9	22,7	16,1	33,1	725
Sud	10,8	25,0	21,1	27,2	14,2	35,8	543
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	10,5	24,3	20,8	25,0	17,3	32,7	1 149
Primaire	8,4	17,7	14,0	17,4	12,1	23,9	704
Moyen/secondaire ou plus	8,1	15,3	11,1	14,5	9,4	23,7	1 306
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	16,0	34,3	30,7	36,5	23,6	45,6	535
Second	12,7	26,8	21,0	26,5	17,9	37,2	581
Moyen	7,6	19,0	14,0	18,7	13,5	27,4	583
Quatrième	7,7	14,2	11,7	13,9	8,2	20,8	700
Le plus riche	3,8	7,1	4,3	5,7	5,3	11,7	759
Ensemble 15-49	9,1	19,1	15,3	19,0	12,9	27,0	3 159
50-59	3,4	12,5	10,9	11,4	9,0	15,6	368
Ensemble 15-59	8,5	18,4	14,8	18,2	12,5	25,9	3 527

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 14.8 Indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui participent à toutes les prises de décision et pourcentage de femmes qui ne sont d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari batte sa femme, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDS-Continue, Sénégal 2016

Indicateur du pouvoir d'action	Pourcentage participant à la prise de toutes les décisions	Pourcentage qui ne sont d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari batte sa femme	Effectif de femmes
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé[1]			
0	na	47,7	4 595
1-2	na	47,4	915
3	na	43,8	373
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme[2]			
0	5,9	na	2 789
1-2	7,1	na	737
3-4	5,5	na	1 329
5	8,2	na	1 029

na = Non Applicable
[1] Se reporter au Tableau 14.5 pour la liste des décisions.
[2] Se reporter au Tableau 14.6.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.9 Utilisation actuelle de la contraception selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée selon certains, indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDS-Continue, Sénégal 2016

Indicateur du pouvoir d'action des femmes	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Méthodes modernes: Stérilisation féminine	Méthodes modernes: Méthodes modernes temporaires féminines[1]	Méthodes modernes: Condom masculin	Une méthode traditionnelle	N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé[1]									
0	23,8	22,0	0,6	20,9	0,5	1,9	76,2	100,0	4 595
1-2	30,9	27,9	1,8	25,9	0,3	3,0	69,1	100,0	915
3	26,8	24,7	0,5	22,0	2,2	2,1	73,2	100,0	373
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme[2]									
0	27,8	25,3	0,9	23,6	0,8	2,4	72,2	100,0	2 789
1-2	24,3	22,9	0,9	20,9	1,0	1,3	75,7	100,0	737
3-4	24,3	21,8	0,8	20,7	0,3	2,5	75,7	100,0	1 329
5	19,8	18,7	0,1	18,5	0,2	1,0	80,2	100,0	1 029
Total	25,1	23,1	0,7	21,7	0,6	2,1	74,9	100,0	5 883

Note: Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace a été prise en compte dans ce tableau.
[1] Pilule, DIU, injectables, implants, condom féminin, diaphragme, Mousse/gelée et Méthode de l'Allaitement Maternel, de l'Aménorrhée (MAMA), et Collier.
[2] Se reporter au Tableau 14.6.1 pour la liste des décisions.
[3] Se reporter au Tableau 14.7.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.10 Nombre idéal d'enfant et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes,

Nombre idéal moyen d'enfant des femmes de 15-49 ans et pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDS-Continue, Sénégal 2016

Indicateurs du pouvoir d'action	Nombre idéal moyen d'enfants[1]	Effectif de femmes	Pourcentage de femmes actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale[2]			Effectif de femmes
			Pour espacer	Pour limiter	Total	
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé[1]						
0	5,6	3 624	18,1	5,6	23,8	4 595
1-2	5,4	704	13,4	9,3	22,7	915
3	5,6	320	16,8	7,2	24,0	373
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme[2]						
0	4,9	3 766	16,6	6,9	23,4	2 789
1-2	5,1	982	19,8	5,0	24,8	737
3-4	5,7	1 452	17,8	6,4	24,2	1 329
5	5,9	994	16,9	5,6	22,6	1 029
Total	5,2	7 195	17,3	6,3	23,6	5 883

[1] Non compris les femmes qui ont donné des réponses non numériques.
[1] Sont exclues dans le calcul de la moyenne les femmes qui ont donné des réponses non numériques.
[2] Se reporter au Chapitre 7 du Rapport EDS-2016 pour la définition des besoins non satisfaits en matière de planification familiale.
[3] Limité aux seules femmes actuellement en union. Se reporter au Tableau 14.6.1 pour la liste des décisions.
[4] Se reporter au Tableau 14.7.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.11 Soins de santé maternelle selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des cinq années ayant précédé l'enquête qui ont reçu des soins prénatals et postnatals par un prestataire de santé formé et dont l'accouchement a été assisté par du personnel de santé formé, pour la naissance la plus récente, selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDS-Continue, Sénégal 2016

Indicateur du pouvoir d'action	Pourcentage ayant bénéficié de soins prénatals par un prestataire formé[1]	Accouchement assisté par un prestataire formé[1]	Pourcentage ayant bénéficié de soins postnatals, dans les deux jours suivant l'accouchement[2]	Effectif de femmes ayant eu un enfant au cours des cinq dernières années
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé[3]				
0	96,0	59,8	76,3	3 247
1-2	95,5	59,0	73,9	487
3	94,3	60,0	69,4	261
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme[4]				
0	97,8	67,3	80,8	1 968
1-2	97,3	67,0	76,1	500
3-4	95,5	53,6	73,4	972
5	90,9	47,5	66,4	799
Total	95,9	60,4	75,8	4 238

[1] Sont considérées ici comme prestataires formés, les médecins, les infirmières, les sages-femmes ou les infirmières auxiliaires.
[2] Y compris les femmes qui ont bénéficié de soins prénatals de la part d'un médecin, infirmière, sage-femme, agent de santé communautaire ou accoucheuse traditionnelle dans les deux jours suivant l'accouchement. Y compris les femmes qui ont accouché en établissement de santé et celles qui n'ont pas accouché en établissement de santé.
[3] Limité aux seules femmes actuellement en union. Se reporter au Tableau 14.5 pour la liste des décisions.
[4] Se reporter au Tableau 14.7.1 pour la liste des raisons.